Beplantingsplan locatie Hoevenstraat 2 te Beringe

In het kader van

Het wijzigen van de bestemming



Datum; 25-07-2021

Zaaknummer; 1894/2021/2410953

Document; 1894/2021/2421981

Aanvrager:

[redacted]

Hoevenstraat 2

5986 ND BERINGE

Inleiding

[redacted] is gestopt met de intensieve veehouderij in het kader van de Stoppersregeling 2020. En is daarom voornemens [redacted] woning met de huidige "bestemming Agrarisch – Intensieve veehouderij te laten wijzigen naar de bestemming Wonen met opslag (voor eigen materieel) en caravanstalling.


Collegestandpunt

Uit analyse is gebleken dat in principe medewerking kan worden verleend aan de wijziging naar de bestemming 'Wonen met een aanduiding voor caravanstalling', onder voorwaarden dat:
- De locatie landschappelijk wordt ingepast conform het Kwaliteitskader Buitengebied;
- Het perceel dient landschappelijk ingepast te worden (10% van de oppervlakte van het bouwvlak Wonen dient ingepast te worden.



De oppervlakte van het bouwvlak bedraagt 4324 m²

Dit komt neer op 432 m² aan landschappelijke inpassing, waarbij het reeds aanwezige landschappelijk groen mag worden meegenomen.



Dit is een afdruk uit NedBrowser. Aan dit document kunnen geen betrouwbare maten en/of rechten worden ontleend.

gemeente Peel en Maas

Kadastrale situatie
Hoevenstraat 2
5986ND Beringe

REFERENTIE ege

A4 SCHAAL 1:750
DATUM 23-07-2021


Nieuw aan te leggen beplantingsplan.

Breed 9 meter en een lengte van 48 meter
met in totaal 6
Hoogstamfruitbomen En op de bodem een kruidenrijke berm

Hoogstam Fruitbomen


2 x Appel (sterappel)





1 x Peer (concorde)





1 x pruim (opal)





2x Kers (Prunus Avium / spekkers)





Het jaarlijks onderhoud van hoogstam fruitbomen komt neer op bemesten, snoeien en plukken en tussentijds controleren op aantastingen. Daarnaast heeft ook de fruitweide zelf verzorging nodig. Vaak wordt voor bemesting gebruik gemaakt van dierlijke mest.

Kruidenrijke berm

Bloemrijk bermmengsel 100% kruiden

Eenvoudig, maar breed inzetbaar bloemrijke bermmengsel voor alle gronden. Dit bloemrijk bermmengsel heeft een ingetogen karakter, echter door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke vegetatie ontwikkelen. Het mengsel bereikt een hoogte van +1-80 cm en is daardoor geschikt voor toeppassing bij wegen en in bermen.

Grondsoort: Alle grondsoorten
Zaaitijd: Bij voorkeur in het voor- en/of najaar.
Zaaiadvies: 10-15 Kg/ha (1 tot 1.5 gram/m2)
Aantal soorten: 22

Samenstelling:

Avondkoekoeksbloem	Silene latifolia subsp. alba	Wit
Duizendblad	Achillea millefolium	Wit
Echte kamille	Matricaria chamomilla	Geel/wit
Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi	Roze
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	Wit
Gewone margriet	Chrysanthemum Ieucanthemum	Wit
Grasklokje	Campanula rotundifolia	Blauw
Herderstasje	Capsella bursa-pastoris	Wit
Incarnaatklaver	Trifolium incarnatum	Rood
Klaproos	Papaver rhoeas	Rood
Korenbloem	Centaurea cyanus	Blauw
Luzerne	Medicago sativa	Paars
Pastinaak	Pastinaca sativa	Geel
peen	Daucus carota	Wit
Rode klaver	Trifolium pratense	Rood
Rolklaver	Lotus corniculatus	Geel
Sint Janskruid	Hypericum perforatum	Geel
Smalle weegbree	Plantago lanceolata	Zwart/grijs
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	Geel
Veldzuring	Rumex acetosa	Rood
Vlasbekje	Linaria vulgaris	Geel
Witte klaver	Trifolium repens	Wit

INZAAI EN ONDERHOUD NATUURMENGSELS

BODEMGESTELDHEID EN ZAAIBEDBEREIDING

Arme, schralere grond (met zo min mogelijk organische stof) heeft de voorkeur. Start met een schone grond; voorkom en bestrijd ongewenst groen door middel van bijvoorbeeld een vals zaaibed te maken. Een fijnkorrelig zaaibed geeft een vlotte kieming.

BEMESTING

Het is aan te bevelen geen stikstofbemesting (N) te geven. Hoe armer de grond, des te rijker de kruidenvegetatie. Regelmatig maaien en afvoeren verschraalt de bodem.

ZAAIZAADHOEVEELHEID

Niet afwijken van de aanbevolen zaaizaadhoeveelheid! Hogere zaaidichtheden verstoren de balans van de afzonderlijke soorten.

ZAAIPERIODE

Eenjarige mengsels van maart t/m juni en meerjarige mengsels maart t/m mei en september en oktober.

MAAIEN EN AFVOEREN

Voor meerjarige mengsels geldt afhankelijk van de groei een of twee keer per jaar maaien; indien u twee keer maait, doe dit dan bij voorkeur rond eind juni en in het late najaar. Gebruik een vingerbalk of een cirkelmaaier (maaihoogte 10 of 15 centimeter). Tekort maaien geeft beschadiging van de rozetten, wat een goede hergroei verslechtert. Laat het maaisel enkele dagen narijpen; dit bevordert een goede verspreiding van de zaden. Regelmatig maaien en afvoeren verschraalt de bodem.

ZAAITECHNIEK

Zaai als er voldoende vocht in de grond zit en de bodemtemperatuur niet te laag is. Niet dieper zaaien dan de dikte van de zaden. Na het zaaien licht inwerken of harken en aandrukken.
Aanrollen bij een droge periode bevorderd de kieming.
Tip: Meng het zaad met scherpzand of gemalen zemelen of vulstof: hiermee vergroot u het volume van het zaaigemak.

Tip: Bijzaaien is de eerste jaren noodzakelijk voor een blijvende bloemenweide



[redacted]

Beringe 25-7-2021

Gewijzigd 3-10-2021