Rondvraag bloemrijk bermenbeleid cDEB 4 sept. 2024


VRAAG Joep Derksen (Partij voor Teylingen):

Is het echter niet veel beter voor het draagvlak van het bloemrijke bermenbeleid, dat de kleurrijke kwaliteit van de bermen door het jaar heen sterk stijgt? Zodat de inwoners ook kunnen genieten van de kleurrijke bermen en er niet de overheersende mening is, dat het sterk verminderd maaien van de bermen niet veel meer is dan een verkapte bezuiniging? Kortom: gaat het college zich ervoor inzetten, dat het toekomstige bloemrijke bermenbeleid ook zal zorgen voor langdurigere kleurrijke bermen, bij voorkeur vanaf het begin van de lente tot aan het eind van het najaar?

ANTWOORD van college:

De verwachting is dat de kleurrijke variatie per jaar zal stijgen, en hiermee draagvlak wordt gecreëerd voor de methode van ecologisch bermbeheer. Door verschraling zal het aantal inheemse planten toenemen, dit is wel mede afhankelijk van klimaatverandering. Door klimaatverandering wordt de vorstperiode korter en minder koud. Dit heeft een effect op de duur van de bloeiperiode: die wordt verlengd. Het is niet vreemd dat in het late najaar nog planten kunnen bloeien. Het beeld van een continu bloeiende berm moet wel worden bijgesteld. Een bloeicurve van inheemse planten in de Bollenstreek kan ik u toesturen. De curve geeft aan dat in de herfst-/ wintermaanden vrijwel geen bloeiende planten zijn, dit is een normaal natuurlijk proces.

De verwachting van beeldkwaliteit o.a. in de wijken geeft: gemiddeld minder hoge grassoorten, meer (vaste) planten (zowel voor eenjarigen, tweejarigen en meerjarigen plantensoorten) en structuur variatie. De omschakeling van traditioneel naar ecologisch maaibeheer draagt bij aan een kleurrijke omgeving, en kost ongeveer financieel hetzelfde. Het monitoren van de resultaten (meten van de biodiversiteit) van de bermen en oevers door een externe ecoloog is een extra inspanning, wat het iets duurder maakt dat de traditionele manier van beheer.


Bloeipieken en -dalen van inheemse bloemen in de Bollenstreek (Volledig)
Aantal bloeiende soorten
0
5
10
15
20
25
30
35
1-14 Januari
15-31 Januari
1-14 Februari
15-28 Februari
1-14 Maart
15-31 Maart
1-14 April
15-30 April
1-14 Mei
15-31 Mei
1-14 Juni
15-30 Juni
1-14 Juli
15-31 Juli
1-14 Augustus
15-31 Augustus
1-14 September
15-30 September
1-14 Oktober
15-31 Oktober
1-14 November
15-30 November
1-14 December
15-31 December
Periode