

Meer dan 13.000 jongvolwassenen van 16 t/m 27 jaar uit Brabant en Limburg vulden tussen september en december 2024 een online vragenlijst in, verspreid via brieven door gemeenten, sociale media en lokale netwerken.

Belangrijkste verschillen ten opzichte van monitor 2021

Veranderingen in normalisering van drugsgebruik:

- Lachgas wordt minder vaak als normaal gezien.
- Designer drugs (met name door poes/miauw) worden juist vaker als normaal beschouwd.
- Deze trend is ook zichtbaar in de dimensies experimenteren, recent gebruik en sociale accommodatie.

Realistischer beeld van leeftijdsgenoten:


- Jongvolwassenen overschatten het drugsgebruik van hun leeftijdsgenoten minder dan in 2021.
- Ze denken ook minder vaak dat hun vrienden drugsgebruik oké vinden.

Om inzicht te krijgen in normalisering van drugsgebruik wordt er gekeken naar de verschillende dimensies van normalisering (Parker, 2002), de mate van subjectieve normalisering en naar een gedifferentieerde normalisering.

Dimensies van normalisering


Culturele accommodatie

Ervaren acceptatie in samenleving.




Sociale accommodatie

'Nooit-gebruikers' vinden gebruik oké.




Beschikbaarheid

Ervaren toegankelijkheid.




Experimenteren

Ooit drugs gebruikt.



Recent gebruik

Laatste maand drugs gebruikt.




Beschikbaarheid

Culturele accommodatie

Experimenteren

Sociale accommodatie


Recent gebruik




● Cannabis
● Xtc
● Lachgas
● Cocaïne
● Ketamine

Mate van subjectieve normalisering


Hoeveel jongvolwassenen vinden het normaal als iemand drugs gebruikt?



Hoeveel **nooit-gebruikers** vinden het normaal als iemand drugs gebruikt?



Is drugsgebruik genormaliseerd onder jongvolwassenen?



Cannabis is sterk en universeel genormaliseerd. Ook veel niet-gebruikers vinden het normaal. Bij jongeren jonger dan 18 jaar is dit minder het geval.

XTC is redelijk genormaliseerd, en is het sterkst genormaliseerd onder gebruikers, uitgaanders, studentenhuisbewoners en alleenwonenden.

Tripmiddelen en **poes/miauw** zijn niet universeel genormaliseerd, maar wel redelijk genormaliseerd onder uitgaanders, studentenhuisbewoners en alleenwonenden.

Lachgas, ketamine, cocaïne, amfetamine en **designer drugs** zijn niet genormaliseerd. Slechts een kleine minderheid beschouwt deze drugs als normaal.

Aanbevelingen voor preventie

- Gebruik het normalisatie-gradatie model als uitgangspunt voor **preventiebeleid**.
- Focus op **risicogroepen** en **locaties** waar drugsgebruik vaker voorkomt.
- Stimuleer **georganiseerde vrijetijdsbesteding** om drugsgebruik te voorkomen.
- Richt preventie op het **versterken van de bestaande keuze** van niet-gebruikers, zonder twijfel of nieuwsgierigheid te wekken.
- Behoud en versterk de **negatieve houding** van niet-gebruikers tegen drugs.
- Moedig **ouders en vrienden** aan om zich uit te spreken als zij negatief staan tegenover het gebruik, dit kan een ontmoedigende werking hebben.
- **Corrigeer de overschatting** van drugsgebruik onder leeftijdsgenoten door de juiste norm te communiceren.
- Het gebruik van designer drugs, met name **poes/miauw** neemt toe; zet daarom in op preventie en verminder de beschikbaarheid om verdere stijging te voorkomen.

Gedifferentieerde normalisering

Welke jongvolwassenen vinden het gebruik van drugs normaal?



Ooit drugs gebruikt



Genderdivers of man



18 jaar en ouder



Woont in een studentenhuis



Volgt HBO of universiteit



Gaat vaak op stap



Hangt op straat



Veel tijd met vrienden



Gamet regelmatig

De infographic vat de resultaten van de SKIP-monitor 2024 kort samen. Voor een gedetailleerd beeld, alle cijfers, bronnen en uitgebreide toelichting: zie het volledige rapport en tabellenboek op www.skipdietrip.nl/monitor