


Veenweidepact



Krimpenerwaard

Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard

InrichtingsMER natuuropgave Krimpenerwaard



Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard

InrichtingsMER natuuropgave Krimpenerwaard

referentie	projectcode	status
GV774-5/nija4/016	GV774-5	definitief
projectleider	projectdirecteur	datum
dr.ir. R.L.J. Nieuwkamer	drs. D.J.F. Bel	2 september 2010

autorisatie	naam	paraaf
goedgekeurd	dr.ir. R.L.J. Nieuwkamer	

INHOUDSOPGAVE	blz.
SAMENVATTING	1
1. INLEIDING	1
1.1. Aanleiding	1
1.2. Initiatiefnemer en bevoegd gezag	1
1.3. Doel	1
1.4. Begrenzing plangebied	2
1.5. Procedure MER	4
2. VISIE EN BEOORDELINGSKADER	5
2.1. Probleemanalyse en visieontwikkeling	5
2.2. Natuurdoelstellingen Krimpenerwaard	6
2.3. Visie op plangebied	7
2.4. Formele planvorming Krimpenerwaard en plangebied	8
2.5. Reikwijdte en detailniveau	11
2.6. Toetsingskader	12
3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN	16
3.1. Inleiding	16
3.2. Ecohydrologische systeemanalyse	17
3.3. Veranderingen in ligging natuurdoelen	20
3.4. Nulalternatief	21
3.4.1. Beleidsuitgangspunten	21
3.4.2. Kenmerken	21
3.4.3. Uitvoering	24
3.4.4. Kabels en leidingen	27
3.5. Alternatief 'Grutto en Otter', de voorgenomen activiteit	27
3.5.1. Kenmerken	29
3.5.2. Uitvoering	30
3.6. Alternatief 'Groeierend Veen'	32
3.6.1. Kenmerken	32
3.6.2. Uitvoering	35
3.7. Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)	35
3.8. Relatie tussen voorgenomen activiteit en voorkeursalternatief	35
4. EFFECTEN OP LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE	36
4.1. Inleiding	36
4.2. Verkavelings- en slotenpatroon	36
4.3. Cultuurhistorische landschapselementen en gebouwde monumenten	39
4.4. Openheid	44
5. EFFECTEN OP BODEM EN WATER	48
5.1. Inleiding	48
5.2. Tegengaan bodemdaling	48
5.3. Realisering robuust watersysteem	57
5.4. Waterkwaliteit	61
5.5. Conclusie bodem en water	68
6. EFFECTEN OP NATUUR	70
6.1. Natuurkwaliteit	70
6.2. Realisatie Groene Ruggengraat	76

6.3.	Optimaliseren ontwikkelingsbeheer	79
7.	EFFECTEN OP RECREATIE	83
7.1.	Natuur- en recreatieve beleving	83
7.2.	Uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen	87
8.	NEVENEFFECTEN	92
8.1.	Archeologie	92
8.2.	Bodem	97
8.3.	Infrastructuur	103
8.4.	Kosten	107
8.5.	Landbouw	109
8.6.	Muggen en knutten	115
8.7.	Wateroverlast voor lintbebouwing	118
8.8.	Vernieuwend ondernemerschap	119
8.9.	Bedrijventerrein Veerstalblok	120
8.10.	Milieu	122
8.10.1.	Externe veiligheid	122
8.10.2.	Geluid en licht	124
8.10.3.	Atmosferische depositie	126
8.10.4.	Lucht	126
8.11.	Natuur	129
8.11.1.	Aantasting actuele natuurwaarden	129
8.11.2.	Invloed op Vogel- en habitatrictlijngebieden ten noorden en zuiden van de Krimpenervaard	132
8.11.3.	Overlast door exoten	133
8.11.4.	Verstoring door recreanten en verkeer	136
8.12.	Uitvoeringsaspecten	138
8.13.	Water	139
9.	VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN	142
9.1.	Overzicht hoofddoelen	142
9.2.	Analyse beoordeling hoofddoelen	143
9.3.	Overzicht nevendoelen c.q. neveneffecten	145
9.4.	Voorkeursalternatief	148
9.5.	Meest Milieuvriendelijk alternatief	148
9.6.	Leemten in kennis en evaluatieprogramma	149

SAMENVATTING

aanleiding

In 2005 is het Veenweidepact ondertekend, waarin 15 partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap en maatschappelijke organisaties) met elkaar afspraken hebben gemaakt om het waardevolle agrarisch cultuurlandschap in de Krimpenerwaard met bijbehorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. In het Veenweidepact Krimpenerwaard wordt gewerkt aan vijf doelen: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur, extra kansen voor toerisme en recreatie en het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap.

Daarvoor is het noodzakelijk te komen tot een herinrichting van (een deel van) het gebied. De begrenzing van natuur en landbouw is op 23 april 2008 door Provinciale Staten vastgelegd in de partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost voor de Krimpenerwaard met een totale natuuropgave van 2.450 hectare. Gekoppeld aan dit Streekplan is een planMER (Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd waarin de milieueffecten van de verschillende alternatieven voor begrenzing van natuur en landbouw zijn onderzocht.

De volgende stap is dat de begrenzing van de natuurgebieden nu vastgelegd gaat worden in de bestemmingsplannen van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist. Deze bestemmingsplannen hebben alleen betrekking op de natuurgebieden en worden gecoördineerd, dus in samenhang, opgesteld. Deze voorgenomen functiewijziging binnen deze bestemmingsplannen van circa 2.450 hectare landbouwgrond naar natuur is MER-plichtig omdat er sprake is van een grootschalige functiewijziging van meer dan 250 hectare.

Deze milieueffectrapportage heeft dus alleen betrekking op het gebied dat in het Streekplan is begrensd voor natuur (het plangebied). Tevens is gekeken naar de milieueffecten van de inrichting van de natuurgebieden op de (directe) omgeving.

Het doel van deze milieueffectrapportage is het zorgvuldig afwegen van alle milieubelangen voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen voor de begrensde natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Daarvoor zijn verschillende alternatieven ontwikkeld en getoetst aan een beoordelingskader en zijn beschrijvingen gegeven van de milieueffecten van deze alternatieven.

autonome ontwikkeling (nulalternatief)

De (sub)alternatieven worden binnen een milieueffectrapportage vergeleken met het nulalternatief. Het nulalternatief is de huidige situatie plus de meest waarschijnlijke, realistische autonome ontwikkelingen. In het nulalternatief zal het areaal natuur binnen het plangebied in de komende 25 jaar alleen toenemen op percelen die nu al in eigendom zijn van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Bureau Beheer Landbouwgronden. Het betreft circa 35 % van het plangebied. Het areaal natuur binnen het plangebied zal verspreid gelegen zijn en niet één groot aaneengesloten gebied vormen. Het is dus ook onwaarschijnlijk dat de Groene Ruggengraat wordt gerealiseerd.

alternatieven

Voor de inrichting van de 2.450 hectare natuur zijn twee alternatieven beschouwd: het alternatief 'Grutto en Otter' (met 3 subalternatieven) en het alternatief 'Groeiend Veen'. Deze alternatieven zijn ontwikkeld in de 'Visie op de natuurgebieden in de Krimpenerwaard' en zijn in het kader van dit inrichtings-MER en het opstellen van het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard op onderdelen aangepast. Daarnaast is een nulalternatief (de autonome ontwikkeling) opgenomen. De twee projectalternatieven zijn ontstaan als uitwerking van twee hoofddoelen voor het plangebied uit het Veenweidepact Krimpenerwaard: het tegengaan van bodemdaling en het realiseren van de natuurdoelstellingen.

In het alternatief 'Grutto en Otter' is hierbij gezocht naar een optimalisatie van de realisatie van de natuurdoelstellingen binnen het plangebied. Het alternatief 'Groeiend Veen' is gericht op het maximaal tegengaan van bodemdaling. De twee projectalternatieven worden hieronder toegelicht.

- 'Grutto en Otter' (afbeelding 1), met drie subalternatieven die verschillen in de wijze waarop het waterpeil wordt aangepast. Het waterbeheer dat hieronder per subalternatief beschreven staat, wordt pas gestart nadat alle natuurgebieden zijn verworven of onder particulier natuurbeheer gebracht én zijn ingericht.
 1. subalternatief 1: 'directe realisatie met peilfixatie':

In dit subalternatief wordt het waterpeil direct verhoogd naar de gewenste drooglegging. Dit peil wordt vervolgens gefixeerd. Als gevolg van de (ten opzichte van de autonome situatie geringere) maaiveldddaling zal de drooglegging daardoor steeds kleiner worden en zal op termijn het waterpeil (op een aantal plekken) aan het maaiveld komen te liggen.
 2. subalternatief 2: 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt':

In dit subalternatief wordt het waterpeil direct verhoogd naar de gewenste drooglegging. Het winterpeil zal vervolgens de (ten opzichte van de autonome situatie geringere) maaiveldddaling blijven volgen waardoor de drooglegging in de jaren daarna gelijk blijft. Doordat de drooglegging gelijk blijft, blijven dus ook belangrijke hydrologische randvoorwaarden voor de gewenste natuurdoelen gehandhaafd.
 3. subalternatief 3: 'ingroeimodel':

In dit subalternatief blijft het zomerpeil in principe gelijk en het winterpeil wordt bij de inrichting beperkt verhoogd (flexibel peilbeheer). Daarmee is nog niet de gewenste drooglegging verkregen. Gedurende een aantal jaren zal dit peil gehandhaafd blijven, totdat het maaiveld gedaald is tot de gewenste drooglegging. We noemen dit ook wel ingroeien en vandaar de term 'ingroeimodel'. Nadat de gewenste eindsituatie (drooglegging) bereikt is, zal het peil de maaiveldddaling gaan volgen. Op de langere termijn zal dit subalternatief steeds meer gaan lijken op het subalternatief 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt'.

In alle drie de subalternatieven van 'Grutto en Otter' zal voor de ontwikkeling van botanisch grasland en natte natuur in een deel van het plangebied (circa 600 hectare) de met nutriënten verzadigde bovenlaag worden afgeplagd.
- 'Groeiend Veen' (afbeelding 2):

Dit inrichtingsalternatief is volledig gericht op het snel en maximaal tegengaan van bodemdaling. Uiteraard heeft dit alternatief ook het doel om de natuurdoelstellingen te realiseren, maar dat is volgend op de doelstelling om de bodemdaling tegen te gaan. Voor het tegengaan van bodemdaling worden de slootpeilen zo hoog mogelijk en de drooglegging zo klein mogelijk gehouden. Voor het stimuleren van veenaangroei en het openhouden van het gebied is een toegespitst beheer van belang. Zowel in de rietlanden (moerasnatuur) als de graslanden zal beperkt gemaaid worden zonder afvoer van het maaisel. Er zal niet geplagd worden in de natuurgebieden omdat dit ook bodemdaling tot gevolg heeft.

Eén van de doelen van een milieueffectrapportage is het zoeken naar die combinatie van inrichtingsmaatregelen die de gestelde projectdoelen realiseert en tevens de grootste milieuwinst heeft. Daarom is het verplicht om in de milieueffectrapportage ook een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) op te nemen.

toetsingskader

De bovenstaande alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van een uitgebreid toetsingskader, dat is gebaseerd op de Richtlijnen voor het MER zoals die door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Het toetsingskader bestaat uit twee delen, namelijk hoofddoelen en neveneffecten. De hoofddoelen voor de begrensde natuurgebieden zijn:

- behoud van het cultuurhistorisch waardevolle veenweidelandschap (thema landschap en cultuurhistorie);

- waterbeheer gericht op het tegengaan van bodemdaling, de realisatie van een robuust watersysteem en de verbetering van de waterkwaliteit (thema bodem en water);
- realisatie van de natuurdoelstellingen en natuurkwaliteit en de realisatie van de Groene Ruggraat (thema natuur);
- verbetering van de recreatieve beleving en voorzieningen (thema recreatie).

In dit InrichtingsMER zijn daarnaast de neveneffecten op archeologie, bodem, infrastructuur, kosten, landbouw, lintbebouwing, plattelandsontwikkeling, milieu, overige natuuraspecten, uitvoeringsaspecten en overige wateraspecten beschreven.

Alternatief "Grutto en Otter"

Veenweidepact Krimpenerwaard

Datum: januari 2010

Schaal: 1:52.000

Legenda


- plangebiedbegrenzing
- grasland: hoge botanische waarden
- grasland: kruidenrijk
- grasland: weidevogels
- groene ruggengraat:
- water: 25%
- natte ruigte/moeras: 35% (10/25)
- grasland (schraal en bloemrijk): 25%
- droge ruigte: 10 %
- struweel/bos: 5 %
- bestaande natuur en recreatie

DLG Regio West


DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!

dienst landelijk gebied
voor ontwikkeling en beheer

Kaartnr: 20091221RS01



Topografie: Copyright © 2008 Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, Apeldoorn



ecohydrologische systeemanalyse

Als onderdeel van het MER is een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd (bijlage 4). In deze analyse is beschreven hoe de Krimpenerwaard als systeem functioneert. Dit inzicht is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken voor de inrichting van het natuurgebied en het te voeren peilbeheer en dus voor de inrichting van de alternatieven. Feitelijk is dit een second opinion op de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de beschouwde alternatieven. In de ecohydrologische systeemanalyse wordt geconcludeerd dat de gehanteerde systematiek voor ruimtelijke verdeling van de natuurdoeltypen over het plangebied en de uitgangspunten voor de locatie van natuurdoeltypen juist zijn.

Uit deze ecohydrologische systeemanalyse komt duidelijk naar voren dat het peilbeheer een belangrijke sturende factor is voor de bodemdaling. Want hoe hoger het waterpeil ten opzichte van het maaiveld (drooglegging), hoe langzamer de bodemdaling gaat. De drooglegging is daarnaast bepalend voor het type natuur dat gerealiseerd kan worden: hoe kleiner de drooglegging, hoe natter het gebied. Een tweede belangrijke factor in de Krimpenerwaard is de voedselrijkdom (nutriënten) van het gebied. Door het jarenlange gebruik als intensieve landbouwgrond is de bodem zeer voedselrijk geworden door de bemesting. De voedselrijkdom is ongunstig voor natuurontwikkeling, omdat naar natuurdoelen wordt gestreefd die oorspronkelijk aanwezig waren in het agrarisch cultuurlandschap van begin twintigste eeuw. De omstandigheden waren in die periode niet zo voedselrijk. Een effectieve maatregel is het afplaggen van de bouwvoor (de bovenste 30 cm van de bodem). Alternatieven met afplaggen scoren daarom op het punt natuurkwaliteit en waterkwaliteit beter dan alternatieven zonder afplaggen.

realisatie van de hoofddoelen

Er zijn enkele duidelijk verschillen tussen de alternatieven naar voren gekomen ten aanzien van de hoofddoelen.

landschap en cultuurhistorie

Behoud en ontwikkeling van het cultuurhistorisch waardevolle landschap scoort het beste in de autonome ontwikkeling (nulalternatief). In het alternatief 'Groeierend Veen' en in mindere mate in het alternatief 'Grutto en Otter' gaat moerasontwikkeling enigszins ten koste van het cultuurhistorisch waardevolle verkavelings- en slotenpatroon en de openheid.

bodem en water

'Groeierend Veen' beperkt de bodemdaling het meeste, gevolgd door 'Grutto en Otter' en het nulalternatief. Voor dit aspect zijn er ook relatief grote verschillen tussen de subalternatieven van 'Grutto en Otter'. Bij de conclusie wordt hier nader op ingegaan. Daarnaast bestaan er verschillen met betrekking tot het effect op de waterkwaliteit. Het afplaggen van de voedselrijke toplaag en het instellen van natuurlijke peilen (hoog in de winter, lager in de zomer) in 'Grutto en Otter' zorgt voor een sterke vermindering van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater, met positieve gevolgen voor de waterkwaliteit en aquatische ecologie. In 'Groeierend Veen' blijven deze gunstige ingrepen achterwege. Wel stopt ook in dit alternatief de mestgift, waardoor de nutriënten belasting toch licht zal afnemen.

natuur

Ten aanzien van het hoofddoel natuur scoort het alternatief 'Grutto en Otter' het beste op het bereiken van de natuurdoelen voor de weidevogelgraslanden, de botanische graslanden en de natte graslanden. 'Groeierend Veen' scoort minder dan 'Grutto en Otter', omdat er in dit alternatief voor de moerasontwikkeling niet wordt afgeplagd, waardoor de voedselrijkdom in de percelen een knelpunt is. Het nulalternatief scoort als gevolg van de autonome ontwikkeling, waarin in circa 30 % van het plangebied natuurontwikkeling plaatsvindt, licht positief maar veel minder dan de alternatieven 'Groeierend Veen' en 'Grutto en Otter'. In deze alternatieven is het areaal waar natuurontwikkeling plaatsvindt veel groter.

recreatie

Ten aanzien van het vierde hoofddoel, recreatie en toerisme, zijn er in het alternatief 'Groeidend Veen' de beste mogelijkheden voor uitbreiding van recreatieve routes en voorzieningen. Dit komt omdat in dit alternatief minder verstoringgevoelige natuur (met name weidevogelgraslanden) aanwezig is die een beperking uitoefent op de uitbreiding van routes en voorzieningen. De natuur- en recreatieve beleving is het grootst in het alternatief 'Grutto en Otter', omdat de natuurdoelen in dit alternatief het best kunnen worden gerealiseerd en dit positief gewaardeerd zal worden door bezoekende recreanten. Echter, de mogelijkheden voor realisatie van recreatieve voorzieningen zijn in dit alternatief beperkter vanwege de meer verstoringgevoelige natuur.

tabel 1. Effectentabel hoofddoelen

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	nulalternatief	voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			subalter- natief 1 'directe realisatie en peil- fixatie'	subalter- natief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld- daling'	subal- ternatief 3 'in- groei- model'	
landschap en cultuurhistorie						
behoud en ontwikkeling van ka- rakteristiek verkavelings- en slo- tenpatroon	0 zeer kenmerkend redelijk zeldzaam gaaf redelijk vervang- baar	0	-	0/-	0/-	-
behoud en ontwikkeling van cul- tuurhistorische landschapsele- menten en gebouwde monu- menten	0 zeer kenmerkend niet zeldzaam gaaf redelijk vervang- baar	0/+	-	0/+	0/-	-
behoud van openheid	0 zeer kenmerkend zeldzaam gaaf redelijk vervang- baar	0/-	-/--	0/-	0/-	-/--
water en bodem						
bodemdaling na 25 jaar in cm en reductie in % ten opzichte van het nulalternatief	n.v.t.	13,4	4,7 (65 %)	5,2 (61 %)	7,6 (43 %)	0,9 (93 %)
bodemdalingsnelheid na 25 jaar in cm/jaar en reductie in % ten opzichte van het nulalternatief	n.v.t.	0,6	0,1 (83 %)	0,3 (50 %)	0,5 (17 %)	0,03 (95 %)
beoordeling robuustheid water- systeem	0	-	++	++	++	+
terugdringen vermesting	0	0	+	+	+	0/+
bereiken van KRW doelen	0	0/+	+	+	+	0/+

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	nulalternatief	voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			subalter- natief 1 'directe realisatie en peil- fixatie'	subalter- natief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld- daling'	subal- ternatief 3 'in- groei- model'	
natuur						
totaal oordeel natuurkwaliteit:	0	0/+	+/++	++	+/++	+
realisering robuuste Groene Ruggengraat c.q. het opheffen van knelpunten	0	0/+	+/++	++	+/++	+
optimaliseren ontwikkelingsbeheer	0	0	+/++	++	+/++	0/+
recreatie						
natuur- en recreatieve beleving	0	0/+	+	+	+	+
kansen voor uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen	0	0/+	+	+	+	++

neveneffecten

Voor de neveneffecten komen uit de analyse slechts kleine verschillen tussen de alternatieven naar voren. Deze kleine verschillen zijn niet doorslaggevend voor de keuze van het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief. Een aantal belangrijke neveneffecten worden hieronder samengevat.

De landbouw scoort het best in de huidige situatie. De landbouw scoort het slechtst in de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeidend Veen'. In deze alternatieven wordt het gehele plangebied omgezet in natuur en worden de peilen verhoogd ten behoeve van natuurontwikkeling en het voorkomen van bodemdaling. Hierbij zijn er nog wel mogelijkheden voor particulier natuurbeheer, met name in het alternatief 'Grutto en Otter'.

De kans op een toename van het aantal muggen en knutten zal in de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeidend Veen' door vernatting van de percelen toenemen ten opzichte van de nulmeting. Of dit ook leidt tot overlast voor bewoners en recreanten is afhankelijk van de (detail)inrichting. Toename van overlast treedt namelijk voornamelijk op wanneer een voor muggen geschikte leefomgeving (zoals ondiep stilstaand water) in de nabijheid van bebouwing liggen (in ieder geval bij minder dan 60 meter). Onder mitigerende maatregelen wordt hier op teruggekomen.

De overlast door exoten, zoals de muskusrat, neemt in de autonome ontwikkeling (nulalternatief) mogelijk toe.

De ontwikkeling van natuurlijke oevers vraagt om meer inzet voor de controle en bestrijding van grote waternavel en muskusratten. De alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeidend Veen' scoren negatiever dan de nulmeting door met name een verslechterde toegankelijkheid van de watergangen en het ontstaan van een gunstigere leefomgeving voor de muskusrat. Ook de mogelijke intrek van de otter of bever en de daarmee gepaard gaande wijziging van de vangstmethode zorgt voor extra overlast. Overlast door de grote waternavel kan met name op korte termijn worden verwacht doordat het systeem verstoord wordt bij de inrichting. Op de langere termijn zal deze overlast afnemen als gevolg van de verbetering van de waterkwaliteit.

Ten aanzien van de kosten is er een groot verschil tussen het nulalternatief enerzijds en de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeiend Veen' anderzijds: de kosten voor inrichting en aanpassing van infrastructuur van 'Grutto en Otter' en 'Groeiend Veen' zijn bij benadering twee keer zo hoog als de kosten die in het nulalternatief moeten worden gemaakt. Bij de ontwikkeling van de subalternatieven binnen 'Grutto en Otter' was de verwachting dat het subalternatief 3 'ingroeimodel' substantieel lagere kosten zou geven dan de andere subalternatieven van 'Grutto en Otter'. Uit de kostenberekeningen blijkt dat de kostenverschillen klein zijn, nog onzeker omdat op dat moment een uitgewerkt inrichtingsplan ontbrak en dus waren deze niet onderscheidend voor de keuze van een voorkeursalternatief. In het kader van het Watergebiedsplan en het integraal inrichtingsplan zijn de benodigde maatregelen en de daarbij behorende kosten verder uitgewerkt.

mitigerende maatregelen

Negatieve effecten kunnen verminderd worden door het nemen van aanvullende mitigerende maatregelen. Voor de inrichting van het natuurgebied in de Krimpenerwaard zijn met name mitigerende maatregelen op inrichtingsniveau relevant, zoals:

- het inpassen van natuurontwikkeling in de huidige kavelstructuur en het slotenpatroon (ontwerpopgave)
- aangepast slotenbeheer (maaïen, baggeren) om verlanding tegen te gaan om het slotenpatroon zichtbaar te houden in het landschap;
- bij het ontwerp op detailniveau rekening houden met cultuurhistorische landschapselementen;
- bij het ontwerp op detailniveau rekening houden met afstanden van een geschikte leefomgeving voor muggen en knutten tot de bebouwing;
- zonering van recreatie in relatie tot verstoringgevoelige natuur.

Deze mitigerende maatregelen moeten in het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard worden opgenomen en uitgewerkt.

conclusie

Voor de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard zijn het peilbeheer en de nutriëntenhuishouding de belangrijkste sturende factoren. Bij het peilbeheer is de keuze tussen enerzijds de drooglegging constant houden door de maaiveldddaling te volgen door middel van regelmatige peilaanpassingen of anderzijds het in de loop van de tijd vasthouden van het ingestelde peil (peilfixatie) cruciaal voor de ontwikkeling van het natuurgebied. Door regelmatig het waterpeil aan de bodemdaling aan te passen, wordt de gewenste drooglegging gehandhaafd en daarmee worden de omstandigheden voor de gewenste natuurontwikkeling gehandhaafd. Bij peilfixatie neemt de drooglegging op termijn af, omdat er de bodemdaling langzaam door blijft gaan. Het natuurontwikkelingsgebied wordt dan op termijn steeds natter. Dit beperkt tevens de mogelijkheden voor medegebruik door particulieren en agrariërs.

Ten aanzien van de nutriëntenhuishouding is het belangrijk de in het natuurgebied aanwezige nutriënten te verlagen door bijvoorbeeld afplaggen en het afvoeren van maaisel. Deze maatregelen zijn vooral belangrijk voor de natte natuur en de botanische graslanden. De uitvoering van deze maatregelen zal in het integrale inrichtingsplan verder uitgewerkt worden.

Aangezien de neveneffecten niet doorslaggevend zijn voor de keuze van het voorkeursalternatief, is de belangrijkste afweging die tussen de natuurdoelstellingen enerzijds en het tegengaan van bodemdaling anderzijds. Om de bodemdaling zoveel mogelijk te remmen zou gekozen moeten worden voor peilfixatie. Het gebied en de daarbij horende natuur worden dan nat (veel moerasnatuur). Om de natuurwaarden van het historische cultuurlandschap te behouden, zou een zekere drooglegging gehandhaafd moeten worden. Omdat de bodemdaling dan in beperkte mate doorgaat, zijn regelmatige peilaanpassingen noodzakelijk. Overigens wordt de bodemdaling in het alternatief 'Grutto en Otter' belangrijk verminderd ten opzichte van het nulalternatief.

Op grond van de gekozen natuurdoelstellingen, wordt geadviseerd om alternatief 'Grutto en Otter', waarbij na het realiseren van de gewenste drooglegging, de maaiveldddaling wordt gevolgd, aan te wijzen als voorkeursalternatief. Hiermee wordt namelijk de hoogste natuurwaarde gerealiseerd vanuit het voor de Krimpenerwaard gekozen cultuurhistorische perspectief op natuur en er wordt ook een substantiële vermindering van de bodemdaling behaald. Daarnaast worden de beste omstandigheden gerealiseerd voor particulier natuurbeheer en medegebruik door agrariërs op gronden van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Binnen het voorkeursalternatief moet nog gekozen worden tussen de subalternatieven 2 ('directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt') en 3 ('ingroeimodel'). In subalternatief 2 worden de natuurdoelstellingen eerder in de tijd gerealiseerd en wordt de bodemdaling in de eerste periode sterker geremd dan in subalternatief 3. De kosten zijn in subalternatief 2 echter ook hoger, met name vanwege maatregelen die genomen moeten worden voor ophogen van wegen en bruggen en waterstaatkundig isoleren van bebouwing. Deze kosten variëren per peilvak. De keuze tussen de subalternatieven kan dus ook per peilvak verschillend zijn.

Voor het bestemmingsplan, waaraan dit MER gekoppeld is, is er geen verschil tussen de subalternatieven 2 en 3, omdat er geen verschil is in ruimtelijk eindbeeld, alleen in de wijze waarop dit gerealiseerd wordt en de tijdstermijn waarbinnen de doelstellingen voor natuur en het remmen van de bodemdaling bereikt worden. Daarom is de keuze tussen de subalternatieven 2 en 3 per peilvak gemaakt in het kader van het watergebiedsplan voor de Krimpenerwaard en worden deze keuzes per peilvak overgenomen in het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard.

Doordat het waterpeil in het voorkeursalternatief de bodemdaling blijft volgen, wordt de bodemdaling niet gestopt. Dit brengt ons automatisch op de keuze van subalternatief 1 van 'Grutto en Otter' als het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Binnen dit subalternatief wordt op lange termijn een hoge natuurwaarde gerealiseerd met een hoge natuurlijkheid, maar minder passend binnen het cultuurhistorisch landschap van de Krimpenerwaard. Dit wordt gecombineerd met een grotere afname van de bodemdaling, omdat het peil gefixeerd wordt. Bovendien scoort dit subalternatief 1 beter dan 'Groeiend Veen' ten aanzien van de nutriëntenhuishouding, omdat er afgeplagd wordt en maaisel wordt afgevoerd. Tevens komt hierdoor ten opzichte van het alternatief 'Groeiend Veen' veel meer grond vrij die benut kan worden voor de sanering van slootdempingen; een belangrijk milieuprobleem in de Krimpenerwaard.

Tenslotte wordt opgemerkt dat een keuze voor de Autonome Ontwikkeling (het nulalternatief) niet past binnen het nationale (natuur)beleid. De keuze voor het nulalternatief betekent namelijk dat de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de Groene Ruggengraat niet gerealiseerd zullen worden in de Krimpenerwaard en dat de bodemdaling in elk geval minder zal worden geremd dan in de andere alternatieven.

1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

In de jaren '80 van de vorige eeuw is men gestart met de herinrichting van het landelijk gebied in de Krimpenerwaard. Deze was in eerste instantie bedoeld voor de verbetering van de landbouwkundige situatie van het gebied. Als gevolg van het Natuurbeleidsplan (1990) kwam daar later een substantiële natuuropgave (2.450 ha) bij. In het kader van de landinrichting is toen het Raamplan opgesteld dat in 1999 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De uitvoering van het Raamplan stagneerde als gevolg van afnemend draagvlak en problemen bij de uitvoerbaarheid. De waterhuishouding zou namelijk te complex worden en de kosten te hoog. Nieuw Rijks- en provinciaal beleid, in het bijzonder water- en natuurbeleid, deden het besef groeien dat er een andere koers moest worden ingeslagen. Daarom is het Veenweidepact opgesteld dat in 2005 is ondertekend. In het pact hebben 15 partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap en maatschappelijke partijen) met elkaar afspraken gemaakt om het waardevolle cultuurhistorische landschap in de Krimpenerwaard met bijbehorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Daarvoor is het noodzakelijk om te komen tot een herinrichting van het gebied. Het doel van de herinrichting is om een robuust waterbeheer te ontwikkelen en de bodemdaling zo veel mogelijk te beperken en dit te combineren met de geplande natuurontwikkeling. Tegelijkertijd worden de omstandigheden voor de agrariërs verbeterd, komt er meer natuur en komen er meer fietspaden, wandelpaden en andere voorzieningen voor recreatie. In het Slotadvies voor de herbegrenzing van natuur en landbouw [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] is de begrenzing van landbouw en natuur vastgelegd, met een totale natuuropgave van 2.450 ha. Deze begrenzing van natuur en landbouw is op 23 april 2008 door Provinciale Staten vastgelegd in de partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost voor de Krimpenerwaard. Gekoppeld aan de Streekplanherziening is een planMER uitgevoerd. De begrenzing van de natuurgebieden zal nu vastgelegd gaan worden in de bestemmingsplannen van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist. Deze bestemmingsplannen hebben betrekking op de begrensde natuurgebieden en worden gecoördineerd opgesteld. De voorgenomen functiewijziging binnen deze bestemmingsplannen van circa 2.450 ha landbouwgrond naar natuur is MER-plichtig aangezien er sprake is van een grootschalige functiewijziging van meer dan 250 ha.

Op 1 juli 2010 is de wetgeving met betrekking tot de milieueffectrapportage gewijzigd. m.e.r.-procedures waarvan de richtlijnen voor de m.e.r. voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld, vallen nog binnen de oude wetgeving. De richtlijnen voor deze m.e.r. zijn in de periode maart tot en met juni 2008 vastgesteld en dus valt deze m.e.r. nog binnen de wetgeving van voor 1 juli 2010.

1.2. Initiatiefnemer en bevoegd gezag

De Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard is initiatiefnemer voor deze milieueffectrapportage. In deze strategiegroep zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de voorzitter van de Adviesgroep Uitvoering (als adviseur voor de uitvoering). Deze milieueffectrapportage is opgesteld door Witteveen+Bos. Aangezien de milieueffectrapportage gekoppeld is aan de bestemmingsplannen voor de natuurgebieden van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist, treden de gemeenteraden van deze gemeenten op als bevoegd gezag voor dit MER. De gemeente Nederlek zal optreden als coördinerend bevoegd gezag.


1.3. Doel

Het doel van deze milieueffectrapportage is het zorgvuldig afwegen van alle milieubelangen in de besluitvorming over de inrichting van de begrensde natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Hiertoe worden de alternatieven van hoofdstuk 3 geoptimaliseerd op basis van een ecohydrologische systeemanalyse en getoetst aan het beoordelingskader van hoofdstuk 2 op basis van effectbeschrijvingen. Vervolgens worden de alternatieven met elkaar vergeleken waarna aanbevelingen worden gedaan. De resultaten van dit inrichtingsMER worden gebruikt voor de uitwerking in de bestemmingsplannen, het watergebiedsplan, het natuurbeheerplan en het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard.

1.4. Begrenzing plangebied

In december 2006 heeft de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard het 'Slotadvies voor de herbegrenzing van natuur- en landbouwfuncties in de Krimpenerwaard' vastgesteld. Het Slotadvies is door de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist vastgesteld. De herbegrenzing heeft de basis gevormd voor de partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost voor de Krimpenerwaard [provincie Zuid-Holland, 2008b] en de daaraan gekoppelde planMER. In het planMER is een beschrijving gegeven van de alternatieven voor de herbegrenzing van landbouw en natuur. Vervolgens zijn de milieueffecten beoordeeld. Op basis van een integrale beoordeling bleek het alternatief, zoals geformuleerd in het Slotadvies, het beste te scoren. Het voorkeursalternatief uit het planMER is vastgelegd in de partiële streekplanherziening en is daarmee het uitgangspunt voor de begrenzing van het natuurgebied. In dit inrichtingsMER zal daarom niet meer ingegaan worden op de milieugevolgen van de herbegrenzing tussen landbouw en natuur in de gehele Krimpenerwaard, dit is immers al gedaan in het planMER. Dit inrichtingsMER gaat in op de milieugevolgen van verschillende inrichtingsmogelijkheden binnen de vastgestelde begrenzing (zie afbeelding 1.1).

afbeelding 1.1. Begrenzing plangebied uit het Slotadvies [bron: Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006]



Alhoewel de natuurbegrenzing en de begrenzing van het plangebied dus niet meer ter discussie staan, zal uiteraard wel onderzocht worden welke invloed de functieverandering van landbouw naar natuur heeft op de omliggende landbouwgronden en lintbebouwing.

1.5. Procedure MER

startnotitie en richtlijnen

Op 30 oktober 2007 heeft de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, de initiatiefnemer voor dit MER, de startnotitie voor het MER ingediend bij de coördinerende gemeente, Nederlek. De vier gemeenten, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist, hebben vervolgens de startnotitie van 7 november 2007 tot en met 19 december 2007 ter inzage gelegd. De startnotitie en de ingediende zienswijzen zijn voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. en op 23 januari 2008 heeft de Commissie voor de m.e.r. haar advies voor de richtlijnen uitgebracht en aan de naar de coördinerende gemeente, Nederlek, gestuurd. Op 26 maart 2008 hebben de gemeenteraden van Nederlek en Vlist gelijklopende richtlijnen vastgesteld. Op 6 mei 2008 heeft de gemeenteraad van Bergambacht dezelfde richtlijnen vastgesteld. Op 12 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Ouderkerk deze richtlijnen alsmede een aanvulling daarop vastgesteld. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Ouderkerk op 10 juli 2008 de medewerking aan de uitvoering van het Veenweidepact, en dus ook aan het gecoördineerde bestemmingsplan 'Natuurgebieden Veenweidepact' waaraan dit MER gekoppeld is, opgeschort. Vanwege de onduidelijkheid over de medewerking van de gemeenteraad van Ouderkerk aan het gecoördineerde bestemmingsplan 'Natuurgebieden Veenweidepact' en het MER, zijn de richtlijnen op dat moment niet gepubliceerd. Alle indieners van een zienswijze zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Op 8 april 2010 heeft de gemeenteraad van Ouderkerk ingestemd met een bemiddelingsvoorstel in het kader van het Veenweidepact Krimpenerwaard. Op 22 april 2010 heeft de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard ook ingestemd met dit bemiddelingsvoorstel en vervolgens zijn de afspraken in het bemiddelingsvoorstel geconcretiseerd in een overleg tussen het College van B&W van Ouderkerk en de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard. Hierna is de bestemmingsplan- en m.e.r.-procedure weer hervat.

onderzoek MER en aanvaardbaarheidverklaring

Het milieuonderzoek is met de publicatie van onderliggend milieueffectrapport (MER) afgerond. Dit MER wordt door de initiatiefnemer, de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, ingediend bij het bevoegd gezag (de gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist). De gemeenteraden zullen vervolgens besluiten of zij het MER wel of niet aanvaardbaar achten.

overleg en inspraak

Wanneer de 4 gemeenteraden het MER aanvaardbaar hebben verklaard, zal het MER worden toegezonden aan de Commissie voor m.e.r. en deze wordt om advies gevraagd. Betrokken overheden, zoals het waterschap, worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het MER bij het bevoegd gezag in te dienen. Tevens wordt het MER ter inzage gelegd in verband met de inspraak. Een ieder kan daarover zienswijzen indienen bij het bevoegd gezag. Na afloop van de termijn van tervisielegging brengt de commissie voor de m.e.r. een toetsingsadvies uit over het MER. Zij betreft daarbij de ingediende zienswijzen. De formele m.e.r.-procedure is daarmee beëindigd. Het MER en de ingebrachte adviezen en opmerkingen worden bij de verdere planvorming en besluitvorming betrokken.

evaluatie

Bij de evaluatie van het MER worden de in het MER voorspelde effecten vergeleken met de werkelijk optredende effecten. Hiervoor zal in het kader van het besluit over het bestemmingsplan een evaluatieprogramma worden opgenomen, waar de te evalueren onderwerpen en de termijn waarbinnen de evaluatie moet worden uitgevoerd worden vastgelegd. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor deze evaluatie.

2. VISIE EN BEOORDELINGSKADER

2.1. Probleemanalyse en visieontwikkeling

In deze paragraaf zijn beleidsdocumenten beschreven die een duidelijke visie geven op de ontwikkeling van het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. Er is voor gekozen om deze documenten in chronologische volgorde te beschrijven.

Veenweidepact Krimpenerwaard

Het Veenweidepact Krimpenerwaard is op 22 december 2005 ondertekend door 15 partijen. Het Veenweidepact Krimpenerwaard werkt aan vijf doelen: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur, extra kansen voor toerisme en recreatie en het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap. In het pact werken overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de toekomst van de Krimpenerwaard. Het Veenweidepact is bovendien gericht op behoud en ontwikkeling van het waardevolle agrarische cultuurlandschap van de Krimpenerwaard en de daarbij behorende natuurwaarden. Het Veenweidepact heeft betrekking op het gehele landelijk gebied in de Krimpenerwaard.

De Krimpenerwaard wordt beschouwd als één van de speerpunten en toonaangevende projecten binnen het Groene Hartbeleid waarbij invulling wordt gegeven aan een duurzame inrichting en beheer van het Nationaal Landschap Groene Hart. Het Veenweidepact biedt daarvoor de basis.

In het Veenweidepact is geconstateerd dat het oude landinrichtingsplan (het zogenaamde Raamplan) onvoldoende was gericht op een duurzame inrichting van de Krimpenerwaard. Daarom is afgesproken dat een herbegrenzing van natuur- en landbouwgebieden in de Krimpenerwaard zou worden uitgevoerd.

slotadvies voor de herbegrenzing van landbouw en natuur

De herbegrenzing van landbouw en natuur is op 13 oktober 2006 vastgelegd door de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard in het 'Slotadvies Strategiegroep Veenweidepact: herbegrenzing natuur en landbouw Krimpenerwaard' (hierna te noemen: Slotadvies). De herbegrenzing heeft als doel een robuuste agrarische structuur, een duurzaam waterbeheer en een robuuste ecologische structuur mogelijk te maken. Om bodemdaling te beperken is ervoor gekozen om de geplande natuurgebieden te verschuiven naar het laaggelegen en snel zakkende noordelijke deel van de Krimpenerwaard. In deze gebieden zal dus grootschalige natuurontwikkeling plaatsvinden. In de overige delen van de Krimpenerwaard zal de agrarische bestemming behouden blijven en zal ingezet worden op agrarische structuurversterking. Voor de gehele Krimpenerwaard geldt dat met deze herbegrenzing een robuuster watersysteem wordt gerealiseerd dan in de begrenzing van natuur en landbouw zoals deze was opgenomen in het Raamplan [provincie Zuid-Holland, 1999]. Deze begrenzing (zie afbeelding 1.1) van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Krimpenerwaard vervangt dus de oude EHS-begrenzing van het Raamplan. Hierdoor is circa 500 ha van de 2.450 ha verschoven. Bijna 2.000 ha die in het kader van het Slotadvies begrensd is voor natuur, was dat ook al in het Raamplan). De belangrijkste verschillen zijn:

- in de begrenzing van het Slotadvies is meer natuur gesitueerd in de noordrand van de Krimpenerwaard, omdat deze delen lager gelegen zijn en de bodem hier sneller daalt;
- het grootste deel van de natuurgebieden liggen als een aaneengesloten zone van noord naar zuid door de Krimpenerwaard. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de Groene Rugengraat in de Krimpenerwaard.

In het Slotadvies is tevens opgenomen dat binnen het natuurgebied de volgende natuurdoelen gerealiseerd zullen worden: natte natuur, natte graslanden (botanisch grasland) en weidevogelgraslanden. In het Slotadvies is uitgegaan van een gelijke verdeling van deze natuurdoelen.

Daarbij is wel opgenomen dat indien uit nog te verrichten inrichtingsstudies zou blijken dat een andere verhouding wenselijk is, deze aan de Strategiegroep zal worden voorgelegd. De Natuurvisie [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a] kan als zo'n inrichtingsstudie beschouwd worden evenals dit MER.

Structuurvisie K5

In de vergadering van de Krimpenerwaardraad van 2 juli 2009 is de Structuurvisie K5 vastgesteld [RBOI, 2009]. De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de Krimpenerwaard tot 2020 met een doorkijk naar de lange termijn (2030). Er wordt voortgebouwd op de beleidsnota's die in K5-verband zijn opgesteld en op de afzonderlijke gemeentelijke ruimtelijke visies van de K5-gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist). Ook de doelstellingen uit het Veenweidepact en het Slotadvies [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] zijn integraal overgenomen in de Structuurvisie. De centrale opgave voor de Krimpenerwaard is het voeren van een evenwichtige koers in het spanningsveld tussen behoud van de grote omgevingskwaliteiten van de Krimpenerwaard en het waarborgen van een vitale en leefbare regio. Voor de ontwikkeling van de nieuwe natuurgebieden in het kader van het Veenweidepact worden de volgende kernpunten benoemd:

- het waarborgen van het natuur- en landschapskarakteristiek;
- het waarborgen van de openheid, het kavel- en slotenpatroon en geen grootschalige moerasvorming of bebossing;
- het toegankelijk en beleefbaar maken van de natuurgebieden voor recreanten door middel van fiets- en wandelpaden.

2.2. Natuurdoelstellingen Krimpenerwaard

nationaal niveau

Er zijn door de tijd heen meerdere beleidsdocumenten vastgesteld op nationaal niveau die van invloed zijn op het natuurbeleid in de Krimpenerwaard. Een aantal hiervan hebben vooral betrekking op instandhouding van bestaande natuur, zoals de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Deze komen elders in dit MER aan de orde. Het nationaal beleid dat invloed heeft op de toekomstige natuurdoelstellingen in de Krimpenerwaard, komt samen in de Nota Ruimte. Daarom is in deze paragraaf alleen op de Nota Ruimte ingegaan. In de Nota Ruimte [VROM, 2006] zijn de doelstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uit het Natuurbeleidsplan (1990) overgenomen. Bovendien is een aantal uitwerkingen van ruimtelijke afwegingskaders voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangekondigd. De EHS beoogt de realisatie van een samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingzones. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten. In de Nota Ruimte is tevens de Rijksopdracht opgenomen voor de realisatie van een Robuuste Verbinding die als ecologische as moet gaan functioneren tussen de Biesbosch en het IJsselmeer (Natte As).

Het ministerie van LNV heeft een handboek samengesteld, waarin uitgangspunten en richtlijnen worden gegeven waaraan de robuuste verbinding zou moeten voldoen om optimaal te functioneren. Daarin zijn voor de verschillende trajecten van de Natte As door Nederland ambitieniveaus vastgesteld. Het ambitieniveau geeft aan welke ecologische doelen binnen de robuuste verbinding worden nagestreefd. Het ambitieniveau van de Natte As tussen de Loosdrechtse plassen en Wijngaarden (het traject waartoe ook de Natte As door de Krimpenerwaard behoort) is vastgesteld op het hoogste ambitieniveau (B3) met als ecosysteemtypen 'water, riet/moeras, nat schraalland en moerasbos' en 'grasland met klein water' [Alterra, 2005]. Deze uitgangspunten zijn vervolgens gebiedsgericht vertaald naar de specifieke omstandigheden en kenmerken van het westelijke deel van Nederland. Hierbij zijn diverse overheden en maatschappelijke organisaties betrokken geweest. Inmiddels wordt de Natte As in het Groene Hart ook wel de Groene Ruggengraat genoemd. Vandaar dat in het vervolg van dit MER gesproken zal worden over de Groene Ruggengraat.

provinciaal niveau

Het nationaal natuurbeleid uit de Nota Ruimte laat nog de nodige ruimte voor invulling op provinciaal niveau. In de provincie Zuid-Holland werden de natuurdoelstellingen voor gebieden vastgelegd in de natuurgebiedsplannen en inmiddels zijn deze vervangen door het provinciale natuurbeheerplan. In het natuurbeheerplan zijn de inhoudelijke natuurdoelstellingen uit het Natuurgebiedsplan voor de Krimpenerwaard [provincie Zuid-Holland, 2008] integraal overgenomen. In het natuurgebiedsplan voor de Krimpenerwaard is uitgegaan van het alternatief 'Grutto en Otter' dat in dit MER als de voorgenomen activiteit is opgenomen.

natuurdoelstellingen plangebied

Op basis van nationaal en provinciaal beleid zijn de volgende natuurdoelstellingen als uitgangspunt gehanteerd voor de inrichting van het plangebied:

- in hoofdzaak drie natuurdoelen: natte natuur, natte graslanden (botanisch grasland) en weidevogelgraslanden met ongeveer een gelijke verdeling van hectares;
- realisatie van de Groene Ruggengraat in de Krimpenerwaard op het hoogste ambitieniveau (B3) met als ecosysteemtypen 'water, riet/moeras, nat schraalland en moerasbos' en 'grasland met klein water' waarbij zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten van het Handboek voor de Natte As [Alterra, 2005].

2.3. Visie op plangebied

visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard

De 'Visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard. Verkenning naar de inrichting van de natuur in de Krimpenerwaard' (natuurvisie) is in 2007 opgesteld door de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard (2007a). Deze visie heeft alleen betrekking op de natuurgebieden zoals begrensd in het Slotadvies voor de herbegrenzing van natuur en landbouw [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] en dus op het plangebied van dit MER. Hierin wordt de visie voor de inrichting van het natuurgebied en de te ontwikkelen natuurdoelen beschreven binnen de vastgestelde natuurbegrenzing. Uitgangspunt daarvoor zijn de natuurdoelen zoals geformuleerd in de vorige paragraaf. Het doel is het behoud en de verdere ontwikkeling van het waardevolle cultuurhistorische landschap van de Krimpenerwaard met de bijbehorende natuurwaarden. In de natuurvisie worden twee alternatieven beschreven: 'Grutto en Otter' en 'Groeidend veen'. Deze alternatieven vormen de basis voor dit inrichtingsMER en worden in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt.

Startnotitie milieueffectrapportage (inrichtingsMER) Natuuropgave Krimpenerwaard

Op 3 oktober 2007 is de Startnotitie milieueffectrapportage (inrichtingsMER) Natuuropgave Krimpenerwaard vastgesteld door de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard (2007). Deze is vervolgens ingediend bij de coördinerende gemeente, Nederlek. In de Startnotitie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de formele procedure voor milieueffectrapportage waarvan de startnotitie het begin vormt;
- dat naast de autonome ontwikkeling (nulalternatief), de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeidend Veen', die voorkomen uit de natuurvisie, zullen worden onderzocht;
- een beschrijving van de alternatieven;
- dat het alternatief 'Grutto en Otter' wordt aangemerkt als de voorgenomen activiteit en dat daarin drie subalternatieven worden onderscheiden;
- welke hoofddoelen met de voorgenomen ontwikkeling moeten worden gerealiseerd;
- welke milieueffecten moeten worden onderzocht.

richtlijnen voor milieueffectrapportage (inrichtingsMER) Natuuropgave Krimpenerwaard

De startnotitie is ter inzage gelegd en samen met de ingediende zienswijzen naar de landelijke Commissie voor de m.e.r. gestuurd. De Commissie voor de m.e.r. heeft in januari 2008 een advies uitgebracht voor de richtlijnen voor het MER [Commissie m.e.r., 2008].

De belangrijkste onderdelen van dit advies waren:

- in het MER moet duidelijk worden wat de visie is op het gebied, de relatie met en consequenties voor de overige planvorming;
- in het MER moeten duidelijk de hoofd- en neven doelen worden aangegeven evenals de haalbaarheid van deze doelen.
- er moet een ecohydrologische systeemanalyse worden gemaakt, op basis waarvan ingegaan kan worden op de allocatie, haalbaarheid en wenselijkheid van natuurdoeltypen.

Op basis van dit advies hebben de gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist Richtlijnen vastgesteld voor dit MER.

2.4. Formele planvorming Krimpenerwaard en plangebied

In deze paragraaf wordt ingegaan op de specifiek voor de herinrichting van belang zijnde formele procedures binnen de Krimpenerwaard. Een aantal zijn reeds afgerond en een aantal moeten nog in procedure worden gebracht. In afbeelding 2.1 is weergegeven hoe de verschillende formele procedures zich tot elkaar verhouden. In het kort zit dit als volgt in elkaar.

ruimtelijke plannen


- het Slotadvies voor de herbegrenzing van natuur en landbouw [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] is vastgelegd in het Streekplan door middel van een partiële herziening waaraan een planMER gekoppeld was [provincie Zuid-Holland, 2008b];
- de begrenzing van het Streekplan dient als basis voor de bestemmingsplannen in de Krimpenerwaard. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
 - gecoördineerd bestemmingsplan voor de begrensde natuurgebieden voor de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist. Onderliggend MER is gekoppeld aan dit gecoördineerde bestemmingsplan;
 - overige bestemmingsplannen voor het buitengebied in de Krimpenerwaard. Deze worden per afzonderlijke gemeente opgesteld en hierin blijft de agrarische bestemming gehandhaafd.

inrichtingsplannen

Voor alle inrichtingsplannen geldt dat de begrenzing van natuur en landbouw uit het Slotadvies voor de herbegrenzing van natuur en landbouw [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] als uitgangspunt wordt genomen. Voor de inrichting van het begrensde natuurgebied wordt de voorkeursvariant uit de natuurvisie [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a] als uitgangspunt gehanteerd:

- Natuurgebiedsplan: deze heeft alleen betrekking op de nieuw begrensde natuur;
- Watergebiedsplan voor de Krimpenerwaard: deze heeft betrekking op de gehele Krimpenerwaard;
- Integraal inrichtingsplan voor de gehele Krimpenerwaard: deze heeft betrekking op het gehele landelijk gebied van de Krimpenerwaard.

afbeelding 2.1. Schema planfiguren Krimpenerwaard



partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost - Krimpenerwaard en bijbehorend Milieुरapport (planMER)

Op 23 april 2008 is de partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost - Krimpenerwaard door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgesteld. Hiermee is de begrenzing van natuur en landbouw uit het Slotadvies [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] overgenomen in het Streekplan en is de natuurbegrenzing uit het Raamplan vervangen. Het planMER is onderdeel van de partiële streekplanherziening en is gelijktijdig vastgesteld. Het rapport bevat een globale beschrijving van de milieugevolgen van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost - Krimpenerwaard [provincie Zuid-Holland, 2008b] en geeft inzicht in de rol die milieu (groen, water en grijze milieu) heeft gespeeld in de begrenzing van landbouw en natuur. Het rapport geeft een overzicht van (potentiële) milieueffecten en geeft bovendien een integrale beoordeling van de wijze waarop het plan de milieukwaliteit beïnvloedt. In het planMER zijn alternatieven voor de herbegrenzing van landbouw en natuur in de Krimpenerwaard onderzocht. In dit inrichtingsMER zal daarom niet meer ingegaan worden op de milieugevolgen van de herbegrenzing tussen landbouw en natuur in de gehele Krimpenerwaard, dit is immers al gedaan in het planMER.

gecoördineerd bestemmingsplan 'natuurgebieden Veenweidepact'

Door de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard is in september 2007 een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een gecoördineerd bestemmingsplan 'Natuurgebieden Veenweidepact'. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist hebben vervolgens ook met dit plan van aanpak ingestemd. De gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist gaan, uiteraard ieder voor het eigen grondgebied, over tot vaststelling van een bestemmingsplan voor hun deel van het plangebied. Het totaal van die plannen wordt hierna het gecoördineerd bestemmingsplan genoemd. In het gecoördineerde bestemmingsplan 'Natuurgebieden Veenweidepact' zal het plangebied bestemd worden voor natuur. Dit heeft als gevolg dat er voor het gecoördineerde bestemmingsplan een inrichtingsMER gemaakt moet worden; een planMER volstaat niet. Dit inrichtingsMER is dus gekoppeld aan het gecoördineerde bestemmingsplan en beide worden gekoppeld opgesteld en in procedure genomen.

Natuurgebiedsplan Krimpenerwaard

Op 21 oktober 2008 is het Natuurgebiedsplan Krimpenerwaard [provincie Zuid-Holland, 2008] vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het Natuurgebiedsplan gaat uit van de begrenzing van de natuurgebieden uit het Slotadvies van de Strategiegroep Veenweidepact (2006) en de partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost voor de Krimpenerwaard (2008). In het Natuurgebiedsplan worden de gewenste natuurdoelen, de quota van natuurdoelpakketten en de bijbehorende subsidiemogelijkheden op basis van de 'Subsidieregeling Natuurbeheer 2000' vastgelegd. Ook wordt er duidelijk aangegeven waar particulier natuurbeheer mogelijk is en waar niet. Aangezien het Natuurgebiedsplan uitspraken doet over de ligging van verschillende natuurtypen in het plangebied, is er een duidelijk verband met dit inrichtingsMER. In het Natuurgebiedsplan is uitgegaan van het inrichtingsalternatief 'Grutto en Otter' (zie hoofdstuk 3). Dit alternatief is eerder in de Startnotitie voor dit inrichtingsMER opgenomen als voorgenomen activiteit. Indien de uitkomst van dit inrichtingsMER aanleiding zou geven om een ander inrichtingsalternatief te kiezen boven de voorgenomen activiteit of de voorgenomen activiteit op onderdelen aan te passen, dan zal gekeken moeten worden of de inhoud van het Natuurgebiedsplan herzien moet worden en zo ja, op welke onderdelen. Indien dit nodig blijkt te zijn, zullen deze wijzigingen niet worden doorgevoerd in het Natuurgebiedsplan, maar in het Natuurbeheerplan dat vanaf 2009 (in elk geval) jaarlijks zal worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Natuurbeheerplan Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft twee nieuwe regelingen voor het natuurbeheer in Zuid-Holland vastgesteld, namelijk de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en landschap. Voor deze nieuwe regelingen is het noodzakelijk de bestaande natuurgebiedsplannen in Zuid-Holland, het Beheersgebiedsplan Zuid-Holland en het Landschapsgebiedsplan Groene Hart Zuid-Holland om te zetten naar de nieuwe regelingen. De bestaande begrenzing van het Natuurgebiedsplan Krimpenerwaard is in zijn geheel overgenomen. De nieuwe regelingen kennen een nieuw systeem voor het beschrijven van de natuur, beheertypen genaamd. Deze beheertypen zijn opgenomen in de Index Natuur en Landschap. De omzetting van de oude natuurdoelen naar de nieuwe beheertypen is beleidsarm gedaan. In bijlage 13 staat een tabel met waarin staat aangegeven welke nieuwe natuurbeheertypen per deelgebied van toepassing zijn. Voor de locatie van de beheertypen wordt in het Natuurbeheerplan verwezen naar het vigerend natuurgebiedsplan Krimpenerwaard [provincie Zuid-Holland, 2008], waarin de kaart van het alternatief 'Grutto en Otter' uit de natuurvisie [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006] is opgenomen. Het Natuurbeheerplan is in oktober 2009 vastgesteld. Het Natuurgebiedsplan is daarmee vervangen door het Natuurbeheerplan en wanneer in dit MER wordt verwezen naar het Natuurgebiedsplan, wordt nu dus het nieuwe Natuurbeheerplan Zuid-Holland bedoeld.

Integraal inrichtingsplan Krimpenerwaard

In het kader van de uitvoering van het Veenweidepact Krimpenerwaard wordt (eveneens parallel aan het inrichtingsMER) een integraal inrichtingsplan voor de gehele Krimpenerwaard opgesteld. In het integraal inrichtingsplan worden alle inrichtingsmaatregelen opgenomen die worden uitgevoerd in het kader van het Veenweidepact Krimpenerwaard. Het heeft dus niet alleen betrekking op de natuurgebieden. Tevens wordt een begroting en een uitvoeringsstrategie opgesteld waarin de fasering en planning van de uitvoering wordt opgenomen. De inhoud van het integrale inrichtingsplan is mede afhankelijk van de uitkomsten van dit MER. Het Integraal inrichtingsplan Krimpenerwaard wordt op dit moment opgesteld en wordt naar verwachting in 2011 definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Watergebiedsplan Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt een watergebiedsplan op voor de gehele Krimpenerwaard [Osté, 2010]. Dit watergebiedsplan zal als bouwsteen dienen voor het integraal inrichtingsplan, de waterparagraaf van het gecoördineerd bestemmingsplan voor de natuurgebieden en de peilbesluiten. Onderdelen van het watergebiedsplan zijn het peilenplan en het inrichtingsplan voor het watersysteem.

Peilenplan

Als waterbeheerder van het oppervlaktewater is het hoogheemraadschap volgens de wet op de Waterhuishouding verplicht peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden onder zijn beheer. Een goedgekeurd peilbesluit biedt aan belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid over de te handhaven peilen in het betreffende gebied. In een peilbesluit stelt het hoogheemraadschap de gewenste oppervlaktewaterpeilen vast voor het gebied waarvoor het besluit geldt. De onderbouwing voor het peilbesluit staat in het peilenplan, waarin de gemaakte keuzes om te komen tot een toekomstige verdeling van peilvakken en de vast te stellen peilen staan beschreven. Het peilbesluit zelf geeft in ieder geval aan op welk gebied het besluit betrekking heeft, welke peilen daar gelden en de periode waarvoor de in het peilbesluit opgenomen waterstanden zullen gelden. Het peilenplan maakt integraal onderdeel uit van het watergebiedsplan.

Inrichtingsplan watersysteem

In het inrichtingsplan voor het watersysteem wordt de gewenste waterhuishoudkundige inrichting en het hierbij behorende beheer van het gebied beschreven. Deze inrichting is afgestemd op de inrichting zoals vastgelegd in het Veenweidepact, de partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost - Krimpenerwaard en het integraal inrichtingsplan. Het bevat onder andere de indeling in bemalings- en peilgebieden en de ligging van waterlopen en kunstwerken. Uiteraard worden ook de benodigde maatregelen beschreven om te komen tot de gewenste inrichting. Uitgangspunt hierbij is dat een duurzaam watersysteem ontstaat, afgestemd op de verschillende (toekomstige) gebruiksfuncties in het gebied. Het watergebiedsplan zal dus niet alleen betrekking hebben op de begrensde natuurgebieden, maar op de gehele Krimpenerwaard. De inrichting van de natuurgebieden en de verdeling van peilvakken en de daaraan gekoppelde nieuwe waterpeilen, zullen een directe samenhang kennen. Er is dus een belangrijke relatie tussen het watergebiedsplan en dit inrichtingsMER. Het Watergebiedsplan Krimpenerwaard wordt naar verwachting in 2009 afgerond.

2.5. Reikwijdte en detailniveau

De reikwijdte of scope van het MER wordt bepaald door middel van de beschouwde alternatieven enerzijds en de gebruikte criteria van het toetsingskader anderzijds.

alternatieven

Ten aanzien van de alternatieven wordt uitgegaan van de Visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard, waarin een aantal varianten voor de inrichting van de nieuwe natuurgebieden zijn onderzocht en een voorgenomen activiteit met drie subalternatieven is vastgesteld [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a]. De voorgenomen activiteit geeft invulling aan de hoofddoelstelling van het Veenweidepact Krimpenerwaard namelijk het behouden en ontwikkelen van het karakteristieke veenweidelandschap en de daarbij behorende natuurwaarden. Binnen het Veenweidepact Krimpenerwaard en het daarbij behorende slotadvies [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006], zijn daarnaast twee belangrijke doelstellingen te onderkennen voor de inrichting van de begrensde natuurgebieden:

- het realiseren van de natuurdoelstellingen inclusief de robuuste verbinding (Groene Ruggengraat);
- het beperken van bodemdaling en een robuuste inrichting van het watersysteem.

Deze twee doelstellingen hebben een zekere tegenstelling in zich. Het beperken van de bodemdaling ligt in lijn met het principe 'functie volgt peil', maar heeft een dilemma met het realiseren van verschillende gewenste natuurdoeltypen. Met name de natuurdoelen 'botanisch grasland' en 'weidevogelgrasland' vereisen fysieke randvoorwaarden die niet altijd aansluiten bij de ambitie om de bodemdaling maximaal tegen te gaan. Om een goede afweging tussen natuur en het tegengaan van bodemdaling te kunnen maken zijn in de natuurvisie twee inrichtingsalternatieven ontwikkeld: 'Groeïend Veen' primair gericht op het tegengaan van bodemdaling en 'Grutto en Otter' primair gericht op het realiseren van de verschillende gewenste natuurdoelen.

Binnen het alternatief 'Grutto en Otter' worden drie subalternatieven onderscheiden die het gevolg zijn van keuzes voor de inrichting van het watersysteem en het waterbeheer (zie afbeelding 3.1). Deze alternatieven worden in hoofdstuk 3 gedetailleerd beschreven.

detailniveau

Het detailniveau van dit MER wordt bepaald door het niveau waarop de alternatieven ruimtelijk zijn uitgewerkt. In dit MER zijn de alternatieven uitgewerkt op het schaalniveau van de volgende vijf legenda-eenheden zoals die op de diverse plankaarten met hun begrenzing staan aangegeven:

- weidevogelgrasland;
- kruidenrijk grasland;
- botanisch grasland;
- robuuste natuur;
- Groene Ruggengraat.

Kruidenrijk grasland is als aparte legenda-eenheid onderscheiden voor graslanden met meer klei in de ondergrond waar minder goede potenties zijn voor weidevogelgrasland, botanisch grasland en natte natuur.

De robuuste natuur en de Groene Ruggengraat zijn verder onderverdeeld in:

- robuuste natuur:
 - gras;
 - ruigte;
 - struweel/bos;
- Groene Ruggengraat:
 - water;
 - natte ruigte/moeras;
 - grasland (schraal en bloemrijk);
 - struweel/bos.

tijdaspecten

Alle alternatieven worden vergeleken met de huidige situatie. Voor de huidige situatie wordt het moment van start van de m.e.r.-procedure gehanteerd. Dit was het aanbieden van de Startnotitie MER door de Strategiegroep aan de vier gemeenten (november 2007). Er wordt voor gekozen om de effecten van de alternatieven te beschrijven zoals de situatie eruit ziet 25 jaar vanaf het aanbieden van de Startnotitie (2033).

2.6. Toetsingskader

Op basis van het hiervoor geschetste beleidskader is een beoordelingskader ontwikkeld waaraan de alternatieven getoetst zullen worden. Concreet is het onderstaand beoordelingskader tot stand gekomen door analyse en verdere uitwerking van de Startnotitie voor dit MER [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007] en de Richtlijnen voor dit MER zoals die zijn vastgesteld door de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist (gebaseerd op het advies van de Commissie MER (2008). In het beoordelingskader wordt onderscheid gemaakt tussen hoofddoelen (tabel 2.1) en neven-doelen c.q. neveneffecten (tabel 2.2). De hoofddoelen zijn onderverdeeld in vier thema's:

- landschap en cultuurhistorie;
- bodem en water;
- natuur;
- recreatie.

De hoofddoelen zijn de doelen waarvoor de inrichting van het natuurgebied in de eerste plaats bedoeld is. Deze hoofddoelen zijn uitgewerkt in bijlage 3. Voor de uitwerking van de alternatieven in hoofdstuk 3 zijn deze hoofddoelen leidend geweest, waarbij opgemerkt moet worden dat de recreatiedoelen minder zwaar gewogen hebben dan de doelen voor landschap en cultuurhistorie, water en bodem en natuur.

Er is echter geen gewicht toegekend aan de hoofddoelen en ook niet aan de nevendoelen c.q. neveneffecten.

effectbeschrijvingen en vergelijking

In de hoofdstukken 4 tot en met 8 worden de effecten van de alternatieven op de hoofddoelen en de neveneffecten beschreven. De beschrijving is themagewijs op basis van het beoordelingskader volgens tabel 2.1 en tabel 2.2. De opbouw van de paragrafen is voor ieder subdoel gelijk en bevat de volgende onderdelen:

- nulmeting: hierin wordt de huidige situatie in de Krimpenerwaard beschreven;
- nulalternatief: het nulalternatief bestaat uit de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling. De autonome ontwikkeling beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling ten aanzien van het beschouwde criterium, indien de natuurontwikkeling niet wordt uitgevoerd;
- de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter': hier worden de effecten van het alternatief 'Grutto en Otter' én de effecten op de subalternatieven binnen de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' beschreven;
- alternatief 'Groeidend Veen': hier worden de effecten van het alternatief 'Groeidend Veen' beschreven;
- conclusie: de conclusie wordt getrokken en een kwalitatieve beoordeling van de effecten wordt gegeven;
- mitigerende maatregelen: per thema worden mogelijke mitigerende maatregelen aangegeven.

De beoordeling van de effecten gebeurt ten opzichte van de huidige situatie. De huidige situatie scoort daarom per definitie neutraal. Er wordt de volgende codering toegepast:

- ++ : zeer goed, c.q. grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie;
- + : goed, c.q. verbetering ten opzichte van de huidige situatie;
- 0 : neutraal, c.q. gelijk aan de huidige situatie;
- - : negatief, c.q. verslechtering ten opzichte van de huidige situatie;
- -- : zeer negatief, c.q. sterke verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

tabel 2.1. Hoofddoelen, criteria en meeteenheden

hoofddoelen die met de herinrichting nagestreefd worden	criterium	meeteenheid
landschap en cultuurhistorie		
behoud veenweidelandschap, waaronder: - behoud en ontwikkeling van karakteristiek verkavelings- en slotenpatroon - behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische landschapselementen en gebouwde monumenten - behoud van openheid	kwalitatieve beschrijving op basis van regionale kenmerkendheid, zeldzaamheid, gaafheid en vervangbaarheid	-- / - / 0 / + / ++ , ondersteund met visualisatie
bodem en water		
waterbeheer gericht op tegengaan bodemdaling	bodemdaling na 25 jaar bodemdalingsnelheid in eindsituatie	cm mm/jaar
robuust watersysteem door middel van: - minimalisatie van het aantal peilvakken in het natuurgebied - optimalisatie van grootte en vorm van de peilvakken - maximalisatie van de berging in de peilvakken - maximalisatie van de overbruggingsperiode van droogte	aantal peilvakken oppervlakte, lengte/breedte verhouding bergingscapaciteit tijd zonder inlaatbehoefte	# ha, L/B ¹ m ³ duur in dagen

¹ Het gaat om de afwijking ten opzichte van 1. Hoe dichter de lengte-breedte (L/B)-verhouding nadert tot 1, hoe gunstiger dat is voor het beheer en onderhoud in verband met beperking randlengte en opstuwing/afmaling (verhang).

hoofddoelen die met de herinrichting nagestreefd worden	criterium	meeteenheid
verbetering waterkwaliteit voor natuurdoelen: - terugdringen invloed vermessing - bereiken van KRW doelen	totaal P, totaal N maatlaten KRW	mg P/l, mg N/l diverse
natuur		
maximalisatie van natuurkwaliteit ten aanzien van: - diversiteit - zeldzaamheid - kenmerkendheid - natuurlijksheidsgraad - ecologische samenhang (onder andere met Zuidplaspolder) - omvang en levensvatbaarheid van populaties van te beschermen soorten	kwalitatieve beschrijving op niveau van natuurdoeltype en soorten	-- / - / 0 / + / ++
realisering robuuste Groene Ruggengraat, dat wil zeggen het bieden van: - voldoende biotoop voor de doelsoorten van de Groene Ruggengraat - voldoende migratiemogelijkheden c.q. het opheffen van knelpunten - voldoende schuilomgevingen en habitat voor minder mobiele soorten	kwalitatieve beschrijving	-- / - / 0 / + / ++
optimaliseren ontwikkelingsbeheer - zo snel mogelijke realisatie van natuurdoelen ² - geleiding van successie	tijdstip waarop natuurdoelen worden gerealiseerd kwalitatieve beschrijving	jaartal -- / - / 0 / + / ++
recreatie		
- natuur- en recreatieve beleving (onder andere koeien in de wei) - handhaafbaarheid c.q. kansen voor uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen (mogelijkheden voor recreatief medegebruik) en knooppunten	kwalitatieve beschrijving met onderscheid tussen landrecreatie en waterrecreatie	-- / - / 0 / + / ++

tabel 2.2. Nevendoelen c.q. neveneffecten, criteria en meeteenheden

minimalisatie van neveneffecten op:	criterium	meeteenheid
- archeologie	kans op verstoring archeologische waarden	kwalitatief
- bodem	gesloten grondbalans mogelijkheden voor saneren slootdempingen problemen van op de kant zetten van bagger	kwalitatief
- infrastructuur	gevolgen peilverhoging op wegen en bruggen kabels en leidingen	kwalitatief
- kosten	contante waarde van investeringen en onderhoud	EUR
- landbouw	mogelijkheden voor agrarisch medegebruik opbrengst derving door wateroverlast schade door ganzen en onkruid ziekte bij vee door vernatting	kwalitatief
- overlast door muggen	overlast door muggen	kwalitatief
- wateroverlast voor lintbebouwing		kwalitatief
- vernieuwend ondernemerschap		kwalitatief
- bedrijventerrein Veerstaalblok	effecten van natuurontwikkeling op realisatiemogelijkheden voor het bedrijventerrein Veerstaalblok	kwalitatief

² De na te streven natuurdoelen zijn randvoorwaardelijk voor het ontwerp. De realisatietermijn verschilt per alternatief.

minimalisatie van neveneffecten op:	criterium	meeteenheid
- milieu	atmosferische depositie externe veiligheid geluid (invloed op provinciaal stiltegebied) lichthinder luchtkwaliteit (fijnstofafvang, CO ₂ uitstoot door veen)	kwalitatief
- natuur	aantasting actuele natuurwaarden invloed op Vogel- en habitatrichtlijngebieden ten noorden en zuiden van de Krimpenervaard overlast door exoten verstoring door recreanten en verkeer	kwalitatief
- uitvoeringsaspecten	minimaliseer transport van grond over de openbare weg (grote vrachtwagens op kleine wegen)	kwalitatief
- water	effecten op en bijdragen aan waterparels grondwaterbeschermingsgebieden verdroging TOP-gebieden wegzijing	kwalitatief


3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de beschouwde alternatieven gedetailleerd beschreven (zie afbeelding 3.1). Deze alternatieven zijn oorspronkelijk gedefinieerd in de natuurvisie [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a]. In dit MER zijn de alternatieven verder geoptimaliseerd. Dat is op twee manieren gedaan. Ten eerste is een uitgebreide ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd (bijlage IV). De samenvatting hiervan staat in paragraaf 3.2. De ecohydrologische systeemanalyse is opgesteld door de ecologen van Witteveen+Bos en vervolgens uitgebreid besproken met een team van externe experts in een zogenaamde 'expert meeting'. Deze ecohydrologische systeemanalyse kan worden beschouwd als 'second opinion' op de natuurvisie. Op basis van de resultaten van de ecohydrologische systeemanalyse zijn vervolgens twee ontwerpsessies met gebiedskenners gehouden waarin de alternatieven uit de natuurvisie tegen het licht zijn gehouden en geoptimaliseerd.

Daarna is echter gestart met het opstellen van het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard. Hierbij is de optimale ligging van de natuurdoelen en de daarbij behorende verdeling van hectares naar natuurdoelen niet alleen bekeken vanuit de natuurdoelstellingen, maar vanuit een integrale afweging tussen verschillende functies, waaronder natuur, recreatie, mogelijkheden voor Particulier Natuurbeheer en medegebruik van de natuurgebieden door agrariërs, etc. Dit heeft geleid tot een veranderde ligging van de Groene Ruggengraat binnen het natuurgebied in de Krimpenerwaard. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in paragraaf 3.3 en zijn verwerkt in de plankaarten (afbeeldingen 3.3 en 3.5).

afbeelding 3.1. Overzicht van de verschillende te onderzoeken (sub-)alternatieven



3.2. Ecohydrologische systeemanalyse

In de Startnotitie voor het MER is aangegeven dat de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeidend Veen' zijn ontleend aan de 'Visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard'. In beide alternatieven is een bepaalde systematiek gehanteerd om de drie hoofddoelen voor natuur, natte natuur, botanisch grasland en weidevogelgrasland, ruimtelijk te verdelen over het plangebied. De laagste delen van het plangebied zijn benut voor het ontwikkelen van natte natuur (de Groene Ruggengraat). De ligging van de weidevogelgraslanden is bepaald op basis van de huidige kwaliteiten als weidevogelgebied. Botanisch grasland tenslotte is gesitueerd in de resterende gebieden. Bij dit laatste zijn de uitgangspunten gehanteerd dat:

- de omstandigheden voor botanisch grasland in de Krimpenerwaard 'maakbaar' zijn, en;
- dat deze omstandigheden niet of nauwelijks beïnvloed worden door een ruimtelijke variatie in standplaatsfactoren (abiotische omstandigheden die van invloed zijn op het voorkomen van plantensoorten), als gevolg van de homogeniteit van deze standplaatsfactoren over vrijwel het hele plangebied. Uitzondering hierop is het onderscheid tussen de veen- en kleigebieden (waarbij kleigebieden ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van botanisch grasland, maar waarbij de meeste kleigebieden van de Krimpenerwaard buiten het plangebied gelegen zijn) en de zone met rivierkwel in het zuiden.

Ontwikkeling van nieuwe natuur wordt in de alternatieven gerealiseerd door de volgende maatregelen:

- peilopzet;
- natuurlijke peilwisseling (hoog in de winter en daarna uitzakken tot het zomerpeil);
- vermindering van aantal peilgebieden;
- afplaggen en vergraven;
- begreppeling;
- hydrologische isolatie;
- goede kwaliteit van het inlaatwater.

homogeniteit

De bodem bestaat voornamelijk uit een dik veenpakket (8-14 m) op een laag pleistoceen zand. Aan de noordwest- en zuidrand van het plangebied (polder Kattendijksblok en Den Hoek), komt in een smalle zone klei op veen voor. De kalkgehalten in deze klei zijn over het algemeen laag en incidenteel hoog. De invloed van het eerste watervoerende pakket (pleistoceen zand) is gering door de afdekkende veenlaag. Van meer invloed is de diepe Zuidplaspolder, ten noordwesten van de Krimpenerwaard. Hierdoor treedt er in het plangebied overwegend (geringe) wegzijging op. Kwel (vooral in de categorie 0-0,3 mm/dag, maximaal 0,7 mm/dag) komt voor in het zuidelijke deel van het plangebied (polder Den Hoek).

Het maaiveld loopt geleidelijk af naar het noorden. Het aanwezige reliëf is met name van antropogene oorsprong: sloten, klei- en veenputten, afgegraven en opgehoogde percelen, landscheidingen, wegen en dijken. Maaiveld daling speelt vanwege de dikke veenlaag (8-14 m) een belangrijke rol in het plangebied. Het waterbeheer, dat met name gericht is op de huidige agrarische functie van het gebied, blijkt hierbij een grote rol te spelen.

Om de waterpeilen zo goed mogelijk af te stemmen op de functies is het watersysteem verdeeld in een aantal peilgebieden. Doordat de functie nu nog overwegend agrarisch is, zijn de peilen in de huidige situatie in relatief grote peilgebieden afgestemd op deze functie. Hierbij zijn enkele relatief kleine peilgebieden ontstaan rond bebouwing. Het oppervlaktewater is voedselrijk en is sterk beïnvloed door het jarenlange agrarisch gebruik. Onder andere de hoge concentraties stikstof, fosfaat en sulfaat in het oppervlaktewater wijzen hierop. Ruimtelijk bezien is er ook in de waterkwaliteit weinig variatie waar te nemen in het plangebied. Wel kan het voorkomen van de waterplant Krabbenscheer in met name de noordwestelijke helft van de Krimpenerwaard, en dus in het grootste deel van het plangebied, erop wijzen dat hier de waterkwaliteit beter is. Krabbenscheer is namelijk sterk gevoelig voor hoge sulfide concentraties (sulfide ontstaat uit sulfaat onder zuurstofloze omstandigheden).

Mogelijk hangt het voorkomen van Krabbenscheer samen met de aanwezigheid van veenbodems met een lichte kleifractie. Deze bodems bevatten veel meer ijzer dan veenbodems zonder kleifractie en zijn daardoor veel beter in staat zwavel te binden en de aanwezigheid van vrij sulfide te voorkomen.

De beschikbare historische vegetatiebeschrijvingen van schraallanden in de Krimpenerwaard duiden erop dat deze grotendeels onder invloed stonden van lithoclien (grondwaterachtig), matig voedselrijk water en dat slechts plaatselijk atmocliene (regenwaterachtige) omstandigheden voorkwamen [Den Held, 1990]. Dit komt waarschijnlijk door het aanwezige broekveen, dat relatief rijk is aan calcium, mangaan en bicarbonaat als gevolg van de langdurige aanwezigheid van rivierinvloeden. In het gehele centrale deel van de Krimpenerwaard is dit broekveen aanwezig. De plaatselijk aanwezige atmocliene omstandigheden zijn waarschijnlijk het gevolg van microreliëf, waardoor lokale variatie kon ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld kleine regenwaterlenzen.

Dit hierboven beschreven, weinig heterogeen systeem vormt de ondergrond voor de ecologie. De natte schraallanden die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw aanwezig waren, waren soortenrijk en vertoonden in vrijwel de gehele Krimpenerwaard een uniform beeld. De differentiërende werking van de wel aanwezige variatie binnen de veen- of kleigebieden (regenwaterlenzen, microreliëf) was blijkbaar relatief klein. Het historische gebruik (bemesting, peilbeheer, etc.) bepaalt grotendeels de huidige kwaliteit en variatie. Door intensivering van de veeteelt en door veenmineralisatie als gevolg van lagere (grond)waterpeilen is de uniformiteit van de natuurwaarden verder toegenomen en is de soortenrijkdom zowel op land als in het water langzaam achteruit gegaan. De oorspronkelijke natte schraallanden zijn, op een aantal natuurgebieden na, vrijwel verdwenen.

maakbaarheid

Zoals hierboven aangegeven is voor de inrichting van de alternatieven in een aantal maatregelen voorzien om de juiste omstandigheden voor de natuurdoeltypen te creëren. De voor- en nadelen van deze maatregelen die in de ecohydrologische systeemanalyse (bijlage 4) naar voren kwamen, worden puntsgewijs besproken:

- peilopzet:
 - gunstig voor het tegengaan van maaiveldddaling door een afname van veenoxidatie onder zuurstofloze omstandigheden;
 - gunstig voor de ontwikkeling van natte natuur, botanisch grasland en weidevogelgraslanden omdat de ontwatering wordt verminderd;
 - mogelijk ongunstig voor de nalevering van fosfaat als gevolg van hoge fosfaatgehalten in de bovenste decimeters van de bodem door bemesting. Dit kan voorkomen worden door afplaggen en vergraven (zie verder);
- natuurlijke peilwisseling (hoog in de winter en daarna uitzakken tot het zomerpeil):
 - hoge peilen in het voorjaar zijn gunstig voor het remmen van de grasgroei in de weidevogelgraslanden;
 - periodiek lage peilen zijn gunstig voor de binding van fosfaat aan ijzer. Dit voorkomt fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater bij de hogere winter- en voorjaarspeilen;
- vermindering van het aantal peilgebieden:
 - gunstig voor de migratie van planten en dieren;
- afplaggen en vergraven:
 - de snelste manier voor het verwijderen van de met nutriënten verrijkte bouwvoor. Dit voorkomt de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater bij het opzetten van de peilen en creëert de juiste bodemkwaliteit voor de ontwikkeling van soortenrijk botanisch grasland en natte natuur. Zonder afplaggen of vergraven is dit niet mogelijk;
 - gunstig voor de ontwikkeling van de in de bodem aanwezige zaadbank. Hierbij is aan te bevelen om tot verschillende dieptes te plaggen om zo diversiteit te creëren in het reliëf en het type zaden dat tot ontwikkeling komt;
 - gunstig voor het bereiken van de juiste ontwatering voor natte natuurdoeltypen waarvoor vernatting door het verhogen de peilen onvoldoende is;

- experimenteel getest op verschillende locaties in de Krimpenerwaard, waaronder het proefproject Nooitgedacht nabij Berkenwoude. Uit de monitoring van de vegetatieontwikkeling blijkt dat in de loop der jaren schraallandsoorten terrein winnen, maar dat na enige tijd ook de ontwikkeling van veenmossen begint toe te nemen, wat wijst op enige verzuring. De bodem is echter niet gevoelig voor acute verzuring door de grote calciumvoorraad in de bodem. Bekalken na afplaggen is dus geen voor de hand liggende maatregel;
- begreppeling:
 - gunstig voor het verhogen van de grondwaterstand in de percelen bij peilverhoging, met name in de zomer, en is daarmee gunstig voor weidevogels en het tegengaan van bodemdaling. Zonder greppels leidt peilverhoging niet automatisch tot hogere grondwaterpeilen. De oevers slibben gemakkelijk dicht wat grondwaterstroming tegengaat;
 - gunstig voor het tegengaan van de verzurende werking van regenwater. In het proefproject Nooitgedacht vertoont de vegetatieontwikkeling na afplaggen na enige tijd kenmerken van zure omstandigheden;
 - een aandachtspunt is dat het gebruikte oppervlaktewater van voldoende kwaliteit is. Dat kan men mogelijk bereiken door hydrologische isolatie en inlaat van water van goede kwaliteit (zie hieronder). Bij gebruik van nutriëntenrijk water wordt veenaafbraak gestimuleerd wat de kwaliteit van de natuur en het tegengaan van de maaiveldaling niet ten goede komt;
- hydrologische isolatie:
 - uit praktijkproeven in de Krimpenerwaard (polder Nooitgedacht) blijkt dat hydrologische isolatie een positief effect heeft op de waterkwaliteit. De invloed van bemesting en rivierwater op de waterkwaliteit neemt hierdoor flink af. Zonder isolatie is dat op korte termijn niet of moeilijk mogelijk;
- inlaat van (rivier)water van goede kwaliteit:
 - de oorsprong van inlaatwater is bepalend voor de kwaliteit van het water dat het natuurgebied in komt.

In de ecohydrologische systeemanalyse is dus een onderbouwing gegeven van nut en noodzaak van bovenstaande maatregelen voor het behalen van de natuurdoelen. Uit de ecohydrologische systeemanalyse blijkt dat de afzonderlijke nadelen van specifieke maatregelen opgeheven worden door andere maatregelen die ook onderdeel uitmaken van het gehele pakket van inrichtings- en beheersmaatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de gewenste natuurdoelen.

conclusies en aanbevelingen

Met de beschrijving van de huidige situatie ontstaat van de Krimpenerwaard het beeld van een veenpolder die qua geologie, bodemopbouw, hydrologie, maaiveldhoogte en waterkwaliteit weinig heterogeen is. De bodemopbouw, grondwaterbeweging en daarmee ook de grondwaterkwaliteit is vrij uniform. Dit komt ook tot uiting in de beschrijving van schraallandvegetaties uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Deze waren over de gehele Krimpenerwaard soortenrijk, maar uniform van karakter. De differentiërende werking van de wel aanwezige variatie (veen/klei, kalkrijke klei, regenwaterlenzen, microreliëf) is blijkbaar relatief klein. Daarnaast zijn deze verschillen binnen het plangebied minder uitgesproken. Het historische en huidige gebruik (bemesting, peilbeheer, etc.) bepalen grotendeels de huidige kwaliteit en variatie. Dit wijst tevens op de 'maakbaarheid' (in negatieve zin) van de natuur.

De 'maakbaarheid' (in positieve zin) blijkt ook uit de gunstige beoordeling van het voorgestelde maatregelenpakket. Sleutelprocessen- en factoren die de toekomstige (natuur)kwaliteit in belangrijke mate bepalen worden gunstig beïnvloed. We kunnen zelfs stellen dat zonder die maatregelen de natuurdoelen niet gehaald zullen worden.

Als aanbeveling zouden de volgende aanvullende maatregelen nog kunnen bijdragen aan de robuustheid en kwaliteit van de nieuwe natuur:

- realiseren van natuurvriendelijke oevers om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren (score verhogen op KRW-maatlat);

- het aanbrengen van sporen of zaden om soorten die zich niet spontaan vestigen te helpen;
- het toepassen van een beheer van maaien en afvoeren om (verdere) verschraving te bereiken (en te behouden);
- het oplossen van migratieknelpunten met behulp van faunapassages (bijvoorbeeld visvriendelijke gemalen, voor vis passeerbare stuwen en faunapassages bij autowegen);
- bij de inrichting rekening houden met percelen die benut zijn voor maïsteelt, omdat hier de nutriëntenverzadigde bovenlaag diep geploegd is.

3.3. Veranderingen in ligging natuurdoelen

In het kader van dit MER zijn de projectalternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeiend Veen' verder geoptimaliseerd. Dat is op twee manieren gedaan.

Ten eerste is een uitgebreide ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd (bijlage 4). Op basis van de resultaten van de ecohydrologische systeemanalyse zijn vervolgens twee ontwerpssessies met gebiedskenners gehouden waarin de alternatieven uit de natuursvisie tegen het licht zijn gehouden en geoptimaliseerd.

Daarna is gestart met het opstellen van het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard. Daarbij is tot de conclusie gekomen dat de volgende ontwikkelingen aanleiding gaven tot aanpassing van de ligging van de natuurdoelen in de Krimpenerwaard en dan met name de Groene Ruggengraat:

- Er heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden in de invulling van de grotere leefgebieden (de zogenaamde 'knopen') en de verbindingen (de zogenaamde 'schakels') binnen de Groene Ruggengraat (een toelichting op 'knopen' en 'schakels' is opgenomen in bijlage 12). Gebleken is namelijk dat een duidelijker onderscheid moet worden gemaakt tussen de leefgebieden en de verbindende schakels. De verbindende schakels worden gekarakteriseerd door een groot percentage schraalgrasland en breed doorgaand open water. Langs dat water is sprake van enig moeras, struweel en ruigte, maar dit blijft qua oppervlakte beperkt. Daarmee hebben de verbindingen een veel opener karakter dan eerder gedacht.
- De ligging van de Groene Ruggengraat binnen de vastgestelde natuurbegrenzing is bekeken vanuit een integrale achtergrond: vanuit landschap, recreatie, mogelijkheden voor Particulier Natuurbeheer en medegebruik door agrariërs, hoogteligging en mogelijke risico's.

Op basis van deze analyse heeft de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard gekozen voor een wijziging van de ligging van de Groene Ruggengraat. De Groene Ruggengraat zal vanaf het Loetbos in het zuiden van de Krimpenerwaard niet de Tiendweg volgen aan de noordkant van het natuurgebied en dan tot vlakbij de nieuwe zuid-westelijke randweg nabij Gouda lopen om daarna af te buigen naar het Beijersche, maar zal vanaf het Loetbos aan de noordkant van de Landscheiding lopen (en dus zuidelijker blijven) voordat deze afbuigt naar het Beijersche. Deze wijzigingen zijn verwerkt en weergegeven in de plankaarten (afbeeldingen 3.3 en 3.5).

Deze gewijzigde ligging van de Groene Ruggengraat heeft de volgende voordelen:

- een aantal bestaande schraalgraslanden, brede watergangen en eendekooien komen nu in de Groene Ruggengraat te liggen. Daarmee kunnen ze gaan functioneren als verbindende schakel of deel van een groter leefgebied in de Groene Ruggengraat en is er minder afplaggen, afgraven en opgaande begroeiing nodig om de Groene Ruggengraat te realiseren;
- er ontstaan grotere aaneengesloten weidevogelgebieden, die er bovendien voor zorgen dat de cultuurhistorisch belangrijke grote open ruimtes minder versnipperd worden en er meer mogelijkheden ontstaan voor Particulier Natuurbeheer en medegebruik door agrariërs, met name vanaf de IJsseldijk ten noorden van het plangebied;
- door de ligging van de Groene Ruggengraat langs de Landscheiding worden de achtereinden van de verkaveling gebruik die van oorsprong al een ruiger karakter hebben en wordt de ligging van de Landscheiding in het landschap geaccentueerd. Bovendien is er minder verstoring vanaf de Landscheiding dan vanaf de Tiendweg die midden door de Groene Ruggengraat zou lopen.

3.4. Nulalternatief

Onder het nulalternatief wordt binnen een milieueffectrapportage de huidige situatie plus de meest waarschijnlijke, realistische autonome ontwikkelingen verstaan. In de startnotitie [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007] is al een globale beschrijving gegeven van het nulalternatief. Daar is alleen nog niet ingegaan op de beleidsmatige uitgangspunten die gehanteerd moeten worden voor het nulalternatief. Deze beleidsmatige uitgangspunten zijn echter wel bepalend voor de autonome ontwikkelingen.

3.4.1. Beleidsuitgangspunten

streekplan

Doordat van de situatie van november 2007 wordt uitgegaan, is in het nulalternatief het 'oude' streekplan van toepassing en dus niet de partiële herziening van het streekplan d.d. 23 april 2008. Dit betekent dat er uitgegaan wordt van een streekplan met de natuurbegrenzing van het raamplan. Gezien de politieke keuze in 2005 voor het Veenweidepact, wordt er vanuit gegaan dat niet actief ingezet wordt op realisatie van de natuurbegrenzing zoals vastgelegd in het raamplan. Vrijwillige grondverwerving binnen de raamplanbegrenzing blijft wel mogelijk, maar er wordt in dit nulalternatief vanuit gegaan dat daar geen gebruik van zal worden gemaakt.

natuurgebiedsplan

In het nulalternatief wordt uitgegaan van het 'oude' natuurgebiedsplan Veenweiden-Midden Zuidplas en niet het nieuw vastgestelde natuurgebiedsplan d.d. 22 oktober 2008. Gezien de politieke keuze in 2005 voor het Veenweidepact, wordt er vanuit gegaan dat niet actief ingezet wordt op realisatie van de natuurbegrenzing zoals vastgelegd in het raamplan. In het 'oude' natuurgebiedsplan was geen particulier natuurbeheer mogelijk en dus wordt er in het nulalternatief niet uitgegaan van particulier natuurbeheer, maar wel van de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer zoals aangegeven in het 'oude' natuurgebiedsplan.

bestemmingsplan

In de huidige situatie hebben de gronden binnen de natuurbegrenzing een agrarische bestemming. Er wordt in het nulalternatief vanuit gegaan dat het bestemmingsplan niet aangepast wordt en dat die gronden agrarisch bestemd blijven. Er wordt wel vanuit gegaan dat verzoeken tot het wijzigen van de bestemming naar natuur van gronden, die nu al in eigendom zijn bij Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) of Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, door de gemeenten gehonoreerd worden.

3.4.2. Kenmerken

Tabel 3.1 geeft het landgebruik in het plangebied weer voor de huidige situatie en de autonome ontwikkeling (het nulalternatief). Er is goed te zien dat het landbouwareaal in de autonome ontwikkeling afneemt ten faveure van het natuurareaal.

tabel 3.1. Landgebruik in het nulalternatief (huidige situatie en autonome ontwikkeling)

landgebruik	huidige situatie		autonome ontwikkeling	
	oppervlakte (ha)	oppervlakte (%)	oppervlakte (ha)	oppervlakte (%)
agrarisch (minus open water)	2.074	85	1.354	55
bebouwd en verhard	0	0	0	0
open water	343	14	368	15
natuur (minus open water)	33	1	729	30
eindtotaal	2.450	100	2.450	100

waterbeheer (peilbesluiten)

Er wordt vanuit gegaan dat voor grote aaneengesloten stukken natuur een apart peilvak zal worden gerealiseerd waarin het peil optimaal wordt ingericht voor natuur. Geschat wordt dat op termijn 40 % van het areaal natuur binnen het plangebied in aparte peilvakken komt te liggen. Het overige natuurareaal, dat naar verwachting versnipperd gelegen zal zijn binnen landbouwgebied, zal binnen peilvakken komen te liggen met een agrarisch peil. In die gevallen zal per natuurgebiedje moeten worden overwogen een apart peilvak te maken of niet. In het nulalternatief zal er daardoor waarschijnlijk sprake zijn van een toename van het aantal peilvakken (versnippering van het waterbeheer).

recreatie

De recreatievisie [Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard, 2007] beschrijft dat door diverse ontwikkelingen de behoefte aan recreatieve mogelijkheden in de toekomst verder zal toenemen. Deze ontwikkelingen zijn:

- de verstedelijking met name ten noorden van de Krimpenerwaard (Gouda, Waddinxveen en Zuidplaspolder);
- een toename van de bevolkingsomvang van gemeenten waar bezoekers van de Krimpenerwaard vandaan komen met 14 % in 2025;
- de aanleg van nieuwe infrastructuur in de omgeving, zoals de Zuidwestelijke Randweg N207 bij Gouda, verhoogt de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard voor recreanten;
- een veranderende kwalitatieve vraag door veranderingen in de bevolkingssamenstelling;
- maatschappelijke trends, recreatieve trends en ontwikkelingen per recreatietype.

In het nulalternatief uit zich dit in grote tekorten aan paden voor de meest populaire vormen van recreatie: wandelen en fietsen. Voor de provincie Zuid-Holland geldt een capaciteitstekort in 2020 voor wandelen van 60 % van de benodigde capaciteit, voor fietsen is dat 34 %. Daarnaast is er stijgende behoefte aan uitbreiding van de mogelijkheden voor kanoën en paardrijden. Ook is er een grote behoefte aan recreatiemogelijkheden met een sterke belevingscomponent.

klimaatverandering

Eind mei 2006 heeft het KNMI vier nieuwe algemene klimaatscenario's voor Nederland gepresenteerd. Deze scenario's zijn samengesteld op basis van de meest recente resultaten van klimaatonderzoek. Klimaatscenario's zijn consistente en plausibele beelden van een mogelijk toekomstig klimaat. Ze geven aan in welke mate temperatuur, neerslag, wind, etc. kunnen veranderen, bij een bepaalde mondiale klimaatverandering. Klimaatscenario's zijn geen lange termijn weersverwachtingen: ze doen geen uitspraken over het weer op een bepaalde datum, maar alleen over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer in de toekomst. Het KNMI doet geen uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijk is [KNMI, 2008]. In de onderstaande tabel 3.2 is de klimaatverandering rond 2050 uitgedrukt in cijfers voor vier klimaatscenario's. Elk van de vier klimaatscenario's geeft slechts één getal voor de verandering in een variabele, behalve bij de zeespiegelstijging waarvoor de bandbreedte is aangegeven. De getallen zijn voor heel Nederland gelijk: er is geen differentiatie naar provincie of streek. Het klimaat in het basisjaar 1990 is beschreven met gegevens van 1976 tot en met 2005. Onder winter wordt hier verstaan december, januari en februari, zomer staat gelijk aan juni, juli en augustus.

In elk KNMI'06 scenario komt een aantal dezelfde kenmerken van de klimaatverandering in Nederland naar voren:

- de opwarming zet door, hierdoor komen zachte winters en warme zomers vaker voor;
- de winters worden gemiddeld natter en ook extreme neerslaghoeveelheden nemen toe;
- de hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder;
- de berekende veranderingen in het windklimaat zijn klein ten opzichte van de natuurlijke grilligheid;
- de zeespiegel blijft stijgen.

Deze algemene klimaatontwikkelingen kunnen voor de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard de volgende effecten hebben:

- een toename van warmteminnende soorten (onder andere grote zilverreiger en grote bosmuis) en een afname van koudeminnende soorten (onder andere velduil en noordse glazenmaker);
- meer kans op het voorkomen van exoten, bijvoorbeeld de grote waternavel (zie paragraaf 8.11.3);
- uitbreiding van geschikte leefmilieus voor steekmuggen en knutten (zie paragraaf 8.6);
- meer kans op ziekten door exoten;
- verandering van de snelheid van bodemdaling door hogere afbraak van veen door de hogere temperatuur;
- een grotere benodigde waterberging door toename van neerslag in de winter;
- verandering van de waterhuishouding door verandering van neerslag en verdamping (toename van inlaat en afvoer van water);
- een verandering van de efficiency van helofytenfilters door hogere temperaturen.

Indien relevant, worden deze onderwerpen bij de effectbeschrijvingen in de hoofdstukken 4 en verder beschouwd.

tabel 3.2. Klimaatverandering in Nederland rond 2050 ten opzichte van het basisjaar 1990 volgens de vier KNMI'06 klimaatscenario's

2050		G	G+	W	W+
wereldwijde temperatuurstijging		+1°C	+1°C	+2°C	+2°C
verandering in luchtstromingspatronen in West Europa		nee	ja	nee	ja
winter	gemiddelde temperatuur	+0,9°C	+1,1°C	+1,8°C	+2,3°C
	koudste winterdag per jaar	+1,0°C	+1,5°C	+2,1°C	+2,9°C
	gemiddelde neerslaghoeveelheid	+4 %	+7 %	+7 %	+14 %
	aantal natte dagen (≥0,1 mm)	0 %	+1 %	0 %	+2 %
	10-daagse neerslagsom die eens in de 10 jaar wordt overschreden	+4 %	+6 %	+8 %	+12 %
	hoogste daggemiddelde windsnelheid per jaar	0 %	+2 %	-1 %	+4 %
zomer	gemiddelde temperatuur	+0,9°C	+1,4°C	+1,7°C	+2,8°C
	warmste zomerdag per jaar	+1,0°C	+1,9°C	+2,1°C	+3,8°C
	gemiddelde neerslaghoeveelheid	+3 %	-10 %	+6 %	-19 %
	aantal natte dagen (≥0,1 mm)	-2 %	-10 %	-3 %	-19 %
	dagsom van de neerslag die eens in de 10 jaar wordt overschreden	+13 %	+5 %	+27 %	+10 %
	potentiële verdamping	+3 %	+8 %	+7 %	+15 %
zeespiegel	absolute stijging	15-25 cm	15-25 cm	20-35 cm	20-35 cm

- Bron: KNMI, 2008.
- G: gematigd 1 °C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990 geen verandering in luchtstromingspatronen West Europa.
- G+: gematigd + 1 °C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990, winters zachter en natter door meer westenwind, zomers warmer en droger door meer oostenwind.
- W: warm 2 °C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990 geen verandering in luchtstromingspatronen West Europa.
- W+ warm + 2 °C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990, winters zachter en natter door meer westenwind, zomers warmer en droger door meer oostenwind.

overige ontwikkelingen

Binnen en buiten de Krimpenerwaard is er nog sprake van een aantal ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de Krimpenerwaard. Het gaat om:

- natuurontwikkeling in de Zuidplaspolder (natuurkerngebied in de omgeving);
- woningbouw in de Zuidplaspolder (effect op recreatievraag);
- infrastructuur (de zuidwestelijke rondweg rond Gouda en N210, verstoring lucht, geluid en licht).

Waar relevant, worden de effecten van deze ontwikkelingen meegenomen bij de effectbeschrijvingen.


3.4.3. Uitvoering

Het areaal natuur binnen het plangebied zal in de komende 25 jaar alleen toenemen op percelen die in eigendom zijn van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL; zie afbeelding 3.2). Het betreft circa 35 % van het plangebied. Het areaal natuur binnen het plangebied zal verspreid gelegen zijn en niet één groot aaneengesloten gebied vormen. Het is dus ook onwaarschijnlijk dat de Groene Ruggengraat wordt gerealiseerd. Aangenomen wordt dat 40 % van het natuurareaal (circa 340 ha) over 25 jaar gelegen is binnen een eigen peilvak met een optimaal peil voor natuur en 60 % (circa 510 ha) gelegen is binnen een peilvak met een agrarisch peil (maximaal 60 cm drooglegging).

vernieuwend ondernemerschap

De regeling vernieuwend ondernemerschap is in 2008 opgesteld en vastgesteld door de gemeenten. Het is aannemelijk dat ook zonder wijziging van de natuurbegrenzing in het Streekplan, deze regeling opgesteld en toegepast zou worden. Daarom maakt deze regeling deel uit van het nulalternatief.

afbeelding 3.2. Bestaande natuur en eigendom Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)



Legenda

- Plangebied
- Bestaande natuur
- Eigendom ZHL
- Eigendom BBL
- Provinciale wegen
- Hoofdwatergangen

InrichtingsMER Krimpenerwaard

Natuur in autonome ontwikkeling

schaal: 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 km

projectcode: GV774-5
 versie: definitief
 datum: 09-06-2009
 getekend: B. de Jong
 gecontroleerd: L. Turlings
 goedgekeurd: L. Turlings

Witteveen **Bos**

onderwaterdrainage

De toepassing van onderwaterdrains wordt voor agrarische veenweidegebieden gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. De drains liggen ongeveer 10 cm onder het slootpeil en op onderlinge afstanden van 4 tot 6 meter. Ze worden toegepast om in natte perioden te draineren en de ontwatering te bevorderen en om in droge periode te infiltreren en op die manier de grondwaterstand niet veel dieper te laten worden dan het slootpeil. In het veenweidegebied ontstaan namelijk in de zomer holle grondwaterspiegels omdat de infiltratie vanuit de sloten de gewasverdamping en wegzijging niet kan bijhouden. Vooral op het einde van de zomer kan daardoor de grondwaterstand decimeters onder het slootpeil uitzakken, waardoor een dikke laag veen aan zuurstof (en daardoor aan oxidatie) wordt blootgesteld.

In het kader van het project 'Waarheen met het veen?' [www.waarheenmethetveen.nl] wordt onderzoek verricht naar de voor- en nadelen van de toepassing van onderwaterdrains. Uit de voorlopige conclusies blijkt dat onderwaterdrains de grondwaterstanden effectief kunnen beheersen (afhankelijk van de drainafstand). Dit is gunstig voor de melkveehouders. De kosten voor de aanleg van onderwaterdrains worden geraamd op circa EUR 2.000,- per ha bij drains op een onderlinge afstand van 6 m [Osté, 2010]. Een vertraging van de maaiveldddaling kon op de onderzoekslocatie nog niet direct gemeten worden vanwege het trage verloop en de beperkte nauwkeurigheid waarmee de maaiveldhoogte gemeten kan worden.

Door toepassing van onderwaterdrains neemt de buffercapaciteit voor water van het gebied af, waardoor de inlaatbehoefte en waterafvoer (extra voedingsstoffen en extra bergingsopgave) toenemen. Dit effect wordt versterkt als ook nog de drooglegging in de zomer beperkt en gefixeerd wordt (wat gunstig zou kunnen zijn voor vertragen maaiveldddaling). De extra in- en uitlaat wordt in recent onderzoek van Alterra (2008a) ingeschat op 7 tot 15 % maar is ook wel berekend op 25 - 30 %. Het toelaten van peilvariaties zou de extra in- en uitlaat sterk kunnen beperken. Aandachtspunt daarbij is dat het beleid van de provincie Zuid-Holland als uitgangspunt heeft dat inrichtingsmaatregelen niet mogen leiden tot een toename van de zoetwatervraag. Uit het onderzoek is verder gebleken dat het (gebiedsvreemde) water dat in de zomer infiltreert door de samenstelling (sulfaat en alkaliniteit) kan leiden tot versterkte afbraak van het veen (maaiveldddaling en baggerproductie). In welke mate dit bijdraagt aan de maaiveldddaling is onbekend. Wel is duidelijk dat de 'gewone' afbraak van veen in de aërobe (zuurstofrijke) zone veel groter is dan in de anaërobe (zuurstofarme) zone in het veen.

Op basis van de resultaten die nu bekend zijn over onderwaterdrainage, wordt in het kader van het project 'Waarheen met het veen?' ingeschat dat de baten voor de agrariër (extra gewasproductie en betere draagkracht van het perceel door het jaar heen) niet opwegen tegen de kosten voor aanleg van onderwaterdrainage. De verwachting is dan ook dat zonder het beschikbaar stellen van overheidssubsidie onderwaterdrainage in de toekomst slechts op beperkte schaal zal worden toegepast. Het beschikbaar stellen van overheidssubsidie zal naar verwachting afhankelijk zijn van lopend en toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van grootschalige toepassing van onderwaterdrainage op het watersysteem, zowel waar het de waterkwaliteit als de waterkwantiteit betreft en de effecten van onderwaterdrainage op het tegengaan van bodemdaling (zie hierboven). Overigens wordt in het kader van het Veenweidepact Krimpenerwaard wel geprobeerd Rijksmiddelen aan te vragen om onderwaterdrainage mogelijk te maken in agrarische delen van de Krimpenerwaard buiten het plangebied.

Samenvattend kan worden gesteld dat de effecten van de toepassing van onderwaterdrains nog niet volledig in beeld zijn en dat het nog onzeker is of onderwaterdrainage toegepast gaat worden in de Krimpenerwaard. De methode kan een gunstig effect hebben voor het watersysteem, beperking van de maaiveldddaling en CO₂- en N₂O-emissies en het duurzaam faciliteren van de landbouwfunctie, maar zal ook leiden tot andere wateropgaven (berging, inlaat, bagger en waterkwaliteit) en investeringskosten met onzekere baten. Ook is het effect op het bodemleven nog onbekend. Op basis van bovenstaande onzekerheden, zijn de effecten van onderwaterdrainage niet in het nulalternatief opgenomen die in dit MER ontwikkeld worden.

Ook in de projectalternatieven, waarin het gehele plangebied voor natuur ontwikkeld wordt, is onderwaterdrainage niet opgenomen. In deze alternatieven is wel uitgegaan van begreppeling hetgeen positieve effecten heeft op de grondwaterstand en daarmee ook op het tegengaan van bodemdaling.


3.4.4. Kabels en leidingen

Door de Krimpenerwaard liggen elektriciteits-, telefoon-, defensie- en waterleidingen en daarnaast een gastransportleiding. Het inrichten van een natuurgebied en het verhogen van het peil hebben geen gevolgen voor deze leidingen. Echter, graafwerkzaamheden (afplaggen) hebben mogelijk wel gevolgen voor kabels en leidingen. Dit betreft zowel het graven zelf als het verkleinen van de gronddekking van de kabels en leidingen, tot onder de minimaal vereiste gronddekking. De gevolgen van kabels en leidingen worden daarom bepaald door het grondverzet en de daarvoor benodigde graafwerkzaamheden. Voor de exacte ligging van kabels en leidingen dienen KLIC-meldingen te worden uitgevoerd. In de regel wordt dit pas gedaan in de inrichtingsfase en is daarom niet gedaan voor dit MER. Door bij de uitvoering rekening te houden met de ligging van kabels en leidingen kan de schade beperkt worden. Daarnaast liggen de meeste kabels en leidingen in wegbermen. De wegbermen zullen niet afgegraven worden in de alternatieven. Kabels en leidingen hebben daarom geen rol gespeeld bij het optimaliseren van de alternatieven voor dit MER.

3.5. Alternatief 'Grutto en Otter', de voorgenomen activiteit

In het alternatief 'Grutto en Otter' is gezocht naar een optimalisatie van de realisatie van de natuurdoelen binnen het plangebied. De plankaart van alternatief 'Grutto en Otter' (afbeelding 3.3) is ontstaan na de afweging en optimalisatie van twee denkmodellen, te weten 'Weidevogel' en 'Robuuste verbinding' [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007b]. Het eerste denkmodel ging bij de inrichting van het natuurgebied uit van de beste locaties voor weidevogelgebieden. Het tweede denkmodel ging bij de inrichting uit van optimale omstandigheden voor de robuuste verbinding (Groene Ruggengraat) door de Krimpenerwaard. 'Grutto en Otter' is dus een combinatie van beide. In het kader van dit MER en het integraal inrichtingsplan zijn er wijzigingen aangebracht in de ligging van de natuurdoelen als gevolg van een 'verlegging' van de Groene Ruggengraat. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in paragraaf 3.3.

afbeelding 3.3. Plankaart voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'



3.5.1. Kenmerken

verdeling natuurdoelen

Uitgangspunt van het slotadvies was een verdeling van het plangebied in de natuurdoelen weidevogelgrasland, botanisch grasland en natte natuur in de verhouding 1/3 - 1/3 - 1/3. Volgens de visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard is de realisatie van de natuurdoelen in alternatief 'Grutto en Otter' in de verhouding 41 % weidevogelgrasland - 35 % botanisch grasland - 25 % natte natuur mogelijk. In dit inrichtingsMER is uiteindelijk uitgegaan van een verdeling zoals in tabel 3.3. Bij het ontwerp van de plankaart zijn de volgende overwegingen gehanteerd.

natuur

- de laagste delen zijn benut voor het ontwikkelen van de natte gebieden (Groene Ruggengraat). De Groene Ruggengraat vormt een logische, doorlopende zone. Hierbij is aansluiting gezocht op de diverse peilvakken en zijn de huidige waardevolle weidevogelgebieden ontzien;
- op de hogere delen zijn de juiste omstandigheden gerealiseerd voor weidevogels. Daarbij worden de gebieden die nu al in trek zijn bij weidevogels, verder geoptimaliseerd, bijvoorbeeld voor wat betreft drooglegging (zie verder). Hierbij moet rekening gehouden worden met verstoring door wegen, bebouwing, hoogspanningsmasten en hoger opgaande begroeiing;
- de ligging van de weidevogelgebieden is bepaald op basis van de huidige kwaliteiten als weidevogelgebied. De goede weidevogelgebieden liggen in de huidige situatie vooral in de veengebieden, in dit alternatief zijn de weidevogelgebieden daarom ook in de veengebieden gesitueerd;
- graslanden van hoge botanische waarde zijn gesitueerd in de resterende gebieden binnen de begrenzing. In deze gebieden worden door maatregelen als plaggen en begreppelen (zie paragraaf 2.2) de juiste randvoorwaarden gerealiseerd;
- de ligging van de Groene Ruggengraat is gebaseerd op een integrale afweging zoals beschreven in paragraaf 3.3.

Een deel van het begrensde natuurgebied (circa 50 ha) bestaat uit bestaande natuur die niet in het kader van de vroegere landinrichting of het Veenweidepact is gerealiseerd. Dit zijn eendekooien, boezems, etc. Voor de volledigheid zijn deze wel opgenomen in onderstaande tabel, zodat het totaal aantal ha wel op 2.450 uitkomt.

tabel 3.3. Verdeling natuurdoelen plankaart 'Grutto en Otter'

natuurdoelen plankaart	oppervlakte (ha)	oppervlakte (%)
weidevogelgrasland	890	36
botanisch grasland	443	18
kruidenrijk grasland	87	4
Groene Ruggengraat, waarvan:	1.030	42
- water	258	11
- natte ruigte/moeras	360	14
- grasland (schraal en bloemrijk)	258	11
- droge ruigte	103	4
- struweel/bos	51	2
eindtotaal	2.450	100

peilen

- de drooglegging in de peilvakken is afgestemd op een optimale drooglegging voor weidevogelgebieden en de projectie van de natte verbinding op de laagste delen. Er is uitgegaan van een natuurlijke fluctuatie;
- de eisen van weidevogelgebieden zijn: circa 20 centimeter onder de mediaan van de maaiveldniveau in de winter, het liefst tot ver in het voorjaar om de grasgroei te remmen, uitzakkend tot circa 35 centimeter onder maaiveld in de zomer;

- deze peilen worden ingesteld per peilvak, waarbij de gemiddelde hoogteligging van de weidevogelgebieden als uitgangspunt wordt gehanteerd. De 20 centimeter drooglegging in de winter en 35 cm drooglegging in de zomer zijn dus gemiddelden in de weidevogelgebieden;
- in de winter ligt het peil in de laagste delen boven maaiveld; in de zomer kan het peil dan op natuurlijke wijze uitzakken. Voor de ontwikkeling van natte natuur is het wenselijk dat deze gebieden vier tot zes weken per jaar droogvallen.

grondverzet

- voor het verkrijgen van de juiste ontwatering in de niet weidevogelgebieden kan ontgraven nodig zijn;
- de lage delen vormen een logische, doorlopende zone. Hierbij is aansluiting gezocht bij de huidige hoogteligging van het gebied. Op een aantal plekken zal vergraven nodig zijn;
- voor de ontwikkeling van botanisch grasland en natte natuur zal indien noodzakelijk de met nutriënten verzadigde bovenlaag afgeplagd worden, in totaal zal het om circa 600 ha van het plangebied gaan;
- voor verhogen van de grondwaterpeilen ten behoeve van het tegengaan van de maaiveldafval en het voorkomen van regenwaterlenzen met bijbehorende verzuring wordt intensieve begroeiing toegepast;
- vrijkomende grond wordt zoveel mogelijk in het natuurgebied verwerkt, bijvoorbeeld voor sanering van slootdempingen.

beheer

- voor het openhouden van het gebied en de ontwikkeling van botanische en kruidenrijke graslanden is een toegespitst maaibeheer nodig;
- om de nutriëntenbelasting te verminderen is in dit alternatief voorzien dat water van een goede kwaliteit wordt ingelaten.

recreatie

Geldend beleid is het Veenweidepact Krimpenerwaard met als doel een meer duurzame inrichting van de Krimpenerwaard. Daarin is aangegeven dat er voldoende ruimte en perspectief moet worden gecreëerd voor de recreatie. Concrete doelstellingen ontbreken echter. Het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard heeft de Visie Recreatie Krimpenerwaard [Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard, 2007] opgesteld, die de input vormt voor het Integrale Inrichtingsplan Krimpenerwaard dat in het kader van het Veenweidepact Krimpenerwaard wordt opgesteld. De recreatievisie doet aanbevelingen om de in het nulalternatief ontstane tekorten op te vangen. Deze worden in het Integrale Inrichtingsplan Krimpenerwaard omgezet in concreet beleid.

Door middel van een zonering op de plankaart is voor diverse vormen van recreatie aangegeven wat de mogelijkheden voor recreatie in ieder alternatief zijn. Deze zonering is gebaseerd op de ruimte voor recreatief medegebruik die de natuur geeft. Hierbij zijn twee zones onderscheiden:

- 'extensieve vormen van recreatie onder voorwaarden toegestaan'. Deze zonering is toegekend aan de Groene Ruggengraat en botanisch en kruidenrijk grasland buiten de Groene Ruggengraat;
- 'extensieve vormen van recreatie onder voorwaarden toegestaan, uitgezonderd het broedseizoen'. Deze zonering is toegekend aan de weidevogelgraslanden.

3.5.2. Uitvoering


Binnen het alternatief 'Grutto en Otter' is de wijze waarop omgegaan wordt met inrichting en beheer van het watersysteem zeer bepalend. Het waterbeheer dat hieronder per subalternatief beschreven staat, wordt overigens pas gestart nadat alle natuurgebieden zijn verworven of onder Particulier Natuurbeheer gebracht én zijn ingericht. Daarom zijn hiervoor drie subalternatieven onderscheiden aan de hand van twee vragen. Ten eerste de vraag op welke wijze de inrichting van het watersysteem bereikt wordt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: realisatie ineens en een ingroeimodel.

Het probleem van realisatie ineens is dat er problemen kunnen ontstaan met de huidige infrastructuur zoals wegen en bruggen, zodat extra investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn. Ten tweede de vraag hoe in geval van directe realisatie met het peil moet worden omgegaan: peilfixatie of peil volgt maaiveldddaling. Zo ontstaan er drie subalternatieven (zie afbeeldingen 3.1 en 3.4):

1. subalternatief 'directe realisatie met peilfixatie':
 - In dit subalternatief wordt het waterpeil direct verhoogd naar de gewenste drooglegging. Bovendien wordt het winterpeil gefixeerd. In de zomer zal het peil op natuurlijke wijze 'uitzakken'. Als gevolg van bodemdaling zal de drooglegging daardoor steeds kleiner worden en zal op termijn het waterpeil (op een aantal plekken) aan het maaiveld komen te liggen. In feite is dit subalternatief daarmee een vernattingsstrategie op langere termijn. Op langere termijn zal dit subalternatief dan ook steeds meer gaan lijken op het alternatief 'Groeiend Veen'.
2. subalternatief 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt':
 - In dit subalternatief wordt het waterpeil direct verhoogd naar de gewenste drooglegging. Het winterpeil zal vervolgens de (ten opzichte van de autonome situatie geringere) maaiveldddaling blijven volgen waardoor de drooglegging gelijk blijft. In de zomer zal het peil op natuurlijke wijze 'uitzakken'. Doordat de drooglegging gelijk blijft, blijven deze omstandigheden gehandhaafd en blijven dus ook de randvoorwaarden voor de gewenste natuurdoelen gehandhaafd. Daarmee wijkt dit subalternatief niet af van de uitgangspunten van het alternatief 'Grutto en Otter'.
3. subalternatief 'ingroeimodel':
 - Het zomerpeil wordt niet opgezet, maar er is wel sprake van flexibel peilbeheer. Dit zal betekenen dat het winterpeil circa 15 centimeter hoger zal zijn en zal 'uitzakken' in de zomer tot het peil van het moment van realisatie van de natuur. Daarmee wordt in de meeste peilvakken niet direct de gewenste drooglegging verkregen. De drooglegging zal in dit subalternatief in de winter direct na realisatie van de natuurgebieden variëren tussen de 19 en 36 cm onder het maaiveld. Gedurende een aantal jaren zal dit peil gehandhaafd blijven, totdat het maaiveld gedaald is tot de gewenste drooglegging. In bijlage 6 is per peilvak zichtbaar gemaakt na hoeveel jaar de gewenste drooglegging wordt bereikt. In dit subalternatief zal dus pas na een aantal jaren de gewenste drooglegging zijn gerealiseerd voor de gewenste natuurdoelen. Nadat de gewenste eindsituatie bereikt is, gaat het peil de maaiveldddaling volgen. Op de langere termijn zal dit subalternatief steeds meer gaan lijken op het subalternatief 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt'.

afbeelding 3.4. Ontwikkeling van de peilen in de tijd voor de verschillende subalternatieven

zomerpeil in m
(t.o.v. NAP)



3.6. Alternatief 'Groeidend Veen'

De plankaart van alternatief 'Groeidend Veen' (afbeelding 3.5) is ontstaan na de afweging en optimalisatie van een denkmodel uit de Visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard, te weten 'Maximaal voorkomen maaiveldddaling' [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007b]. Dit denkmodel gaat uit van een inrichting van het natuurgebied die de maaiveldddaling in de Krimpenerwaard maximaal tegengaat. Na optimalisatie is dit denkmodel in haar geheel opgenomen in het alternatief 'Groeidend Veen'. Dit inrichtingsalternatief is volledig gericht op het snel en maximaal tegengaan van bodemdaling. Uiteraard zal in dit alternatief ook getracht worden om de natuurdoelen te realiseren, maar dat doel is volgend op de doelstelling om de bodemdaling tegen te gaan.

3.6.1. Kenmerken

verdeling natuurdoeltypen

Uitgangspunt van het slotadvies was een verdeling van het plangebied in de natuurdoelen weidevogelgrasland, nat schraalland en moeras in de verhouding 1/3 - 1/3 - 1/3 [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006]. Volgens de visie op het natuurgebied in de Krimpenerwaard was die verdeling niet mogelijk, maar is de verhouding uit tabel 3.4 aangehouden. Bij het ontwerp van de plankaart zijn de volgende overwegingen gehanteerd.

natuur

- de laagste delen zijn benut voor het ontwikkelen van de natte gebieden (Groene Ruggengraat). De lagere delen zullen volledig onder water komen te staan;
- weidevogelgebieden en graslanden met (hoge) botanische waarden zijn verdeeld over het overige areaal;
- relatief grote moerassen zijn nodig om tot dierrijke natte natuur te komen.

In het kader van dit MER en het integraal inrichtingsplan zijn er wijzigingen aangebracht in de ligging van de natuurdoelen als gevolg van een 'verlegging' van de Groene Ruggengraat. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in paragraaf 3.3.

Een deel van het begrensde natuurgebied (circa 50 ha) bestaat uit bestaande natuur die niet in het kader van de vroegere landinrichting of het Veenweidepact is gerealiseerd. Dit zijn eendekooien, boezems, etc. Voor de volledigheid zijn deze wel opgenomen in tabel 3.4, zodat het totaal aantal ha wel op 2450 uitkomt.

peilen

- voor het tegengaan van bodemdaling worden de slootpeilen zo hoog mogelijk en de ontwateringsdiepte zo klein mogelijk gehouden. De drooglegging wordt ingesteld op circa 15 cm onder de median van de maaiveldhoogte in een peilvak;
- de zomer- en winterpeilen zijn in dit alternatief gelijk;
- om de peilen in de zomer hoog te houden zal vaker (rivier)water ingelaten moeten worden.

grondverzet

- water wordt in het maaiveld gebracht door intensieve begreppeling;
- er wordt in principe niet afgeplagd en ontgraven, omdat dit maaiveld daling tot gevolg heeft. Uitgangspunt is dat ontgraven of afgeplagde grond sowieso binnen het plangebied (en bij voorkeur op locatie) hergebruikt moet worden.

beheer

- voor het stimuleren van veenaangroei en het openhouden van het gebied is een toegespitst beheer van belang. Zowel in de rietlanden (natte natuur) als de graslanden zal beperkt gemaaid worden zonder afvoer van het maaisel;
- intensief (maai)beheer is nodig om nat grasland met open water en moeras te creëren;
- om de nutriëntenbelasting in het water te verminderen is in dit alternatief voorzien dat water van goede kwaliteit ingelaten wordt.

Alternatief "Groeidend veen"

Veenweidepact Krimpenerwaard

Datum: januari 2010

Schaal: 52.000

Legenda

- plangebiedbegrenzing
- grasland: hoge botanische waarden
- grasland: kruidenrijk
- grasland: weidevogels
- groene ruggengraat:

water: 25%
 natte ruigte/moeras: 35% (10/25)
 grasland (schraal en bloemrijk): 25%
 droge ruigte: 10 %
 struweel/bos: 5 %

robuuste natuur:

gras: 44%
 ruigte: 28 %
 struweel/bos: 28 %


bestaande natuur en recreatie

DLG Regio West

DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!

dienst landelijk gebied
 voor ontwikkeling en beheer

Kaartnr: 20091221RS02



Topografie: Copyright © 2008 Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, Apeldoorn

tabel 3.4. Verdeling natuurdoelen plankaart 'Groeiend Veen'

natuurdoelen plankaart	oppervlakte (ha)	oppervlakte (%)
weidevogelgrasland	235	10
botanisch grasland	46	2
kruidenrijk grasland	44	2
robuuste natuur, waarvan:	1095	44
- gras	483	20
- ruigte	306	12
- struweel/bos	306	12
Groene Ruggengraat, waarvan:	1030	42
- water	258	11
- natte ruigte/moeras	360	14
- grasland (schraal en bloemrijk)	258	11
- droge ruigte	103	4
- struweel/bos	51	2
eindtotaal	2.450	100

zonering recreatie

De recreatiezonering is op dezelfde manier gedaan als in het alternatief 'Grutto en Otter'. Ook hier zijn de Groene Ruggengraat en de natte graslanden op de kaart gezoned als 'extensieve vormen van recreatie onder voorwaarden toegestaan'. De weidevogelgraslanden zijn op de kaart gezoned als 'extensieve vormen van recreatie onder voorwaarden toegestaan, uitgezonderd het broedseizoen'.

3.6.2. Uitvoering

Bij de start van de realisatie zal direct het peil verhoogd worden. Daarna zal het peil gefixeerd worden. Indien er inderdaad op langere termijn sprake is van aangroei van veen, dan zal op dat moment het peil gelijk met de aangroei van het veen verhoogd kunnen worden. Dit wordt overigens niet voorzien (zie paragraaf 5.2).

3.7. Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)

Eén van de doelen van een milieueffectrapportage is het zoeken naar die combinatie van inrichtingsmaatregelen die de gestelde projectdoelen realiseert en tevens de grootste milieuwinst heeft. Daarom is het verplicht om in de milieueffectrapportage ook een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) op te nemen. In dit geval zijn de projectdoelen gericht op natuurontwikkeling (het omvormen van intensief gebruikte landbouwgrond in natuur). De meeste milieueffecten van de projectalternatieven zullen naar verwachting positief zijn ten opzichte van de huidige situatie. Alle inrichtingsalternatieven bewerkstelligen namelijk een verbetering van natuur en milieu. Wel is het zo dat de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeiend Veen' van elkaar verschillen ten aanzien van de nagestreefde natuur- en milieudoelen: respectievelijk het realiseren van hoogwaardige natuur behorende bij het waardevolle cultuurhistorische landschap en het tegengaan van bodemdaling. De keuze van het MMA ligt daarom genuanceerd en is op voorhand niet te maken. Daarom wordt er op voorhand geen apart meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) ontwikkeld, maar na toetsing van de alternatieven aan het beoordelingskader zal blijken welk alternatief het meest milieuvriendelijk is en dat alternatief (of subalternatief) zal als MMA aangemerkt worden.

3.8. Relatie tussen voorgenomen activiteit en voorkeursalternatief

Het inrichtingsalternatief 'Grutto en Otter' is door de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard in de startnotitie aangemerkt als de voorgenomen activiteit. De aanname van de Strategiegroep dat dit alternatief de meest gewenste inrichting oplevert, wordt in dit inrichtingsMER getoetst. In dit InrichtingsMER worden drie subalternatieven van 'Grutto en Otter' onderzocht.

Op basis van de resultaten van dit MER zal de Strategiegroep een voorkeursalternatief kiezen.

4. EFFECTEN OP LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

4.1. Inleiding

Ten aanzien van landschap en cultuurhistorie is het hoofddoel het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle veenweidelandschap. Dit hoofddoel is gesplitst in drie subdoelen:

- behoud van het karakteristieke verkavelings- en slotenpatroon (landschap als samenhangend geheel);
- behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische (landschaps)elementen en gebouwde monumenten, zoals tiendwegen en eendenkooien;
- behoud van openheid van het landschap (landschap als samenhangend geheel).

Beoordeling op deze thema's vindt plaats aan de hand van de criteria kenmerkendheid, zeldzaamheid, gaafheid en vervangbaarheid. Daarbij is het methodisch niet noodzakelijk om een historisch overzicht te geven van de Krimpenerwaard omdat alle effecten worden beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie en niet ten opzichte van een of ander referentiebeeld uit het verleden. Hiervoor wordt verwezen naar DHV (2005).

4.2. Verkavelings- en slotenpatroon

nulmeting

De Krimpenerwaard is een typisch veenweidegebied met een grote openheid en een kenmerkende verkavelingstructuur. Ongeveer 15 % van het gebied is water. De kavels zijn lang en smal en voornamelijk noord-zuid gericht, loodrecht op de rivieren de Lek en de Hollandsche IJssel. De kavels draaien dan ook met de rivieren mee. Dit is typerend voor middeleeuwse veenontginningen. Bijzonder voor de waarden zijn de lange, rechte tiendwegen. Dit zijn parallel lopende sloten met een lange rechte weg of kade er tussenin. Vermoedelijk zijn deze kades aangelegd om een deel van het land in het voorjaar eerder droog (en dus bruikbaar) te maken [Projectbureau Belvedere, 2005].

De verkavelingstructuur is vrij zeldzaam, maar komt ook voor in andere veenweidegebieden in Nederland. De Nederlandse veenweidegebieden zijn echter wel uniek in Europa.

Hoewel in de afgelopen eeuw vele sloten zijn gedempt, is de oorspronkelijke verkavelingstructuur nog goed herkenbaar en van hoge waarde. Er zijn wel enkele doorsnijdingen van infrastructuur, maar er is geen grootschalige infrastructuur en vrijwel geen bebouwing in het plangebied waardoor de structuur nog gaaf te noemen is. De verkavelingstructuur en het slotenpatroon kunnen, als zij eenmaal veranderd zijn, nog wel in de oude staat teruggebracht worden. De structuur is dus redelijk vervangbaar. De vraag is echter of het reëel is dat dit ooit zou gebeuren. Wanneer kavelsloten dichtgroeien door natuurontwikkeling, wordt de kans klein geacht dat deze later weer open gegraven zullen worden.

afbeelding 4.1. Kavelstructuur Krimpenerwaard in nulmeting



[Bron: www.minlnv.nl].

nulalternatief

In het nulalternatief zullen de verkaveling en het slotenpatroon gehandhaafd blijven. Door schaalvergroting van de landbouw zal de wens ontstaan om enkele sloten te dempen om zo de kavels beter bereikbaar te maken [provincie Zuid-Holland, 2007a]. Echter, het is in de Krimpenerwaard verboden c.q. zeer moeilijk om sloten te dempen vanwege voorschriften uit de landschapsverordening en de bestemmingsplannen. Het is daarom niet erg waarschijnlijk dat er in het nulalternatief nog sloten gedempt zullen worden, zodat de huidige structuur niet wordt aangetast.

Daarnaast worden de gebieden in eigendom van Zuid-Hollands Landschap ingericht als natuur (ongeveer 35 % van het gebied). Deze nieuwe natuurgebieden zijn kleinschalig en versnipperd. Deze zullen vooral bestaan uit botanisch en weidevogelgrasland. Deze natuurdoelen hebben geen effect op het slotenpatroon.

afbeelding 4.2. Collage van inpassing van moerasland in bestaande verkavelingsstructuur en slotenpatroon



[Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwkoopse_plassen en DLG].

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In het alternatief 'Grutto en Otter' wordt het gehele plangebied omgezet in natuur. De natuurdoelen weidevogelgebied, botanisch grasland en natte natuur zullen ontstaan (zie tabel 3.3). De structuur van de kavels en sloten verandert niet door het realiseren van weidevogelgrasland en botanisch grasland. Echter, de sloten kunnen dichtgroeien en verlanden, zodat het slotenpatroon in de vorm van open water minder zichtbaar wordt. Een uitgangspunt voor het integraal inrichtingsplan is echter dat de natte natuur zoveel mogelijk wordt ingepast in de bestaande kavelstructuur en slotenpatroon. Hiervoor kunnen een aantal natuurontwikkelingslocaties bij de Nieuwkoopse Plassen als referentiebeeld worden gebruikt (afbeelding 4.2).

alternatief 'Groeidend Veen'

In het alternatief 'Groeidend Veen' wordt het gehele plangebied omgezet in natuur. De natuurdoelen zijn hetzelfde als in het alternatief 'Grutto en Otter', maar worden in een andere verhouding gerealiseerd (zie tabel 3.4). Alleen bij aanleg van natte natuur zal de kavelstructuur en het slotenpatroon kunnen veranderen door dichtgroeien van sloten en verlanding. Daarnaast is een ontwerpuitgangspunt voor het integraal inrichtingsplan dat de natte natuur zoveel mogelijk wordt ingepast in de huidige kavelstructuur en slotenpatroon.

conclusie

De huidige verkaveling en het bijbehorende slotenpatroon hebben een hoge waarde. Het is zeer kenmerkend voor het gebied, gaaf en redelijk zeldzaam in Nederland. De verkaveling en slotenpatroon is wel redelijk vervangbaar (maakbaar). In het nulalternatief zal het slotenpatroon niet veranderen (neutrale beoordeling). Bij de alternatieven wordt het gehele plangebied omgezet in natuur, echter alleen de realisatie van natte natuur kan de structuur door verlandingsprocessen aantasten.

In het inrichtingsplan wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de natuurontwikkeling zoveel mogelijk wordt ingepast in de huidige kavelstructuur en het slotenpatroon. Toch zal een deel van de sloten in de natte natuur van karakter kunnen veranderen.

Om de onderlinge verschillen zichtbaar te maken krijgt het alternatief 'Grutto en Otter' een neutraal tot negatieve beoordeling, waarbij subalternatief 1 negatiever scoort dan de beide andere subalternatieven omdat subalternatief 1 op den duur natter wordt door de peilfixatie en daarmee meer op 'Groeierend Veen' gaat lijken. 'Groeierend Veen' met meer natte natuur dan 'Grutto en Otter' krijgt een negatieve beoordeling.

tabel 4.1. Beoordelingstabel verkavelings- en slotenpatroon

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
behoud en ontwikkeling van karakteristiek verkavelings- en slotenpatroon	0 zeer kenmerkend redelijk zeldzaam gaaf redelijk vervangbaar	0	-	0/-	0/-	-

mitigerende maatregelen

Mogelijke mitigerende maatregelen zijn:

- inpassing van natuurontwikkeling in de huidige kavelstructuur en het slotenpatroon (ontwerpopgave);
- slotenbeheer (maaien en baggeren) om verlanding tegen te gaan.

4.3. Cultuurhistorische landschapselementen en gebouwde monumenten

nulmeting

In het plangebied zijn er diverse cultuurhistorische landschapselementen aanwezig. Het betreft voornamelijk tiendwegen, weteringen, wegen en eendenkooien, zie tabel 4.2 en afbeeldingen 4.3 tot en met 4.7. Er zijn slechts drie gebouwde monumenten aanwezig in het plangebied. De cultuurhistorische landschapselementen zijn zeer kenmerkend voor het gebied. Ze zijn niet erg zeldzaam, aangezien deze landschapselementen ook in andere veenweidegebieden gevonden kunnen worden. De staat van de elementen is gaaf en zijn niet zondermeer vervangbaar.

afbeelding 4.3. Voorbeeld eendenkooi Nooitgedacht



[Bron: Barend de Jong, 2009].

afbeelding 4.4. Tiendweg in de Krimpenerwaard (Lange Tiendweg)



[Bron: Barend de Jong, 2009].

afbeelding 4.5. Gewone weg in de Krimpenerwaard (Bilwijkerweg)



[Bron: Barend de Jong, 2008].

afbeelding 4.6 Landscheiding in de Krimpenerwaard (Ouderkerkse Landscheiding)



[Bron: Barend de Jong, 2008].

afbeelding 4.7. Kade in de Krimpenerwaard (Achter- of Hillekade)



[Bron: Barend de Jong, 2009].

tabel 4.2. Inventarisatie cultuurhistorische (landschaps)elementen

locatie	naam	waarde	categorie ¹
Deelgebied Den Hoek			
Den Hoek Oost	Polder Den Hoek oost	vlak met hoge waarde	2
Den Hoek West	Polder Den Hoek west	vlak met redelijk hoge waarde	3
	Tiendweg oost	lijnelement met zeer hoge waarde	1
	gebied	molenbiotoop (Amerikaanse windmotor bij Loetbos)	
Kromme Geer en Zijde	gebied langs Molenvliet	vlak met hoge waarde	2
	gebied ten noorden Loetbos	vlak met redelijk hoge waarde	3
	gebied Berkenwoude	vlak met zeer hoge waarde	1
	Achter- of Hillekade	lijnelement met hoge waarde	2
	Oudelandse weg	lijnelement met hoge waarde	2
	Molenvliet	lijnelement met zeer hoge waarde	1
	Historische Boerderij Oude-landse weg 18	uit Kennisinfrastuctuur Cultuurhistorische Waarde (KICH)	

locatie	naam	waarde	categorie ¹
Berkenwoude	Ouderkerkse landscheiding	lijnelement met zeer hoge waarde	1
	Eendekooi	Eendekooi ten westen Kerkweg Berkenwoude	gaaf
	Eendekooi	Eendekooi ten zuiden Ouderkerkse landscheiding	gaaf
	Graafkade	lijnelement met hoge waarde	2
	Kerkweg	lijnelement met hoge waarde	2
	Wellepoort	lijnelement met hoge waarde	2
	Historische Boerderij bij Achterbroek	uit Kennisinstructuur Cultuurhistorische Waarde (KICH)	
Nesse/Kattendijksblok	Polder Nesse en Kattendijksblok	vlak met hoge waarde	2
	Tiendweg	lijnelement met hoge waarde	2
	Schaapjeszijde	lijnelement met hoge waarde	2
De Nesse (agrarisch)	lintbebouwing langs dijk	lijnelement met hoge waarde	2
Achterbroek	Polder Achterbroek	vlak met zeer hoge waarde	1
	Bebouwingslint Achterbroek	lijnelement met hoge waarde	2
	Voorwetering	lijnelement met hoge waarde	2
Middelblok	Polder Middelblok	vlak met hoge waarde	2
	Stolwijkse boezem	lijnelement met hoge waarde	2
	Tiendweg (zelfde als Nesse/Kattendijksblok)	lijnelement met zeer hoge waarde	1
Middelblok bebouwd	lintbebouwing langs dijk	lijnelement met hoge waarde	2
Veerstalblok/het Beijersche	Veerstalblok en het Beijersche	vlak met hoge waarde	2
	Bebouwingslint Beijersche	lijnelement met hoge waarde	2
	Beyersche Wegje	lijnelement met hoge waarde	2
	Ouderkerkse landscheiding (zelfde als Berkenwoude)	lijnelement met hoge waarde	2
	Gouderakse Tiendweg	lijnelement met zeer hoge waarde	1
	Goudsche Vliet	lijnelement met zeer hoge waarde	1
	weg langs Goudsche Vliet	lijnelement met redelijk hoge waarde	3
	Beijersche Brug	uit Kennisinstructuur Cultuurhistorische Waarde (KICH)	
Bilwijk	Polders Bilwijk en Beneden Haastrecht	vlak met hoge waarde	2
	Scheikade	lijnelement met hoge waarde	2
	Schenkelkade	lijnelement met hoge waarde	2
	Korte Tiendweg	lijnelement met hoge waarde	2
	Eendekooi	Eendekooi ten zuiden Schenkelkade	gaaf
	gebied	Molenbiotoop bij windmolen Haastrecht (molen zelf niet in plangebied)	
Bergambacht/Kadijk	Polder Kadijk	vlak met hoge waarde	2

[Bron: cultuurhistorische kaart provincie Zuid-Holland en www.kich.nl].

¹ Categorieën uit de Cultuurhistorische Kaart provincie Zuid-Holland: 1 = zeer hoge waarde; 2 = hoge waarde; 3 = redelijk hoge waarde.

nulalternatief

In het nulalternatief zal de nieuwe natuur vooral bestaan uit botanisch en weidevogelgrasland. Echter, het effect is beperkt omdat de natuur verspreid wordt aangelegd en het moerasbos een zeer beperkt areaal zal innemen. De gebouwde monumenten zullen zelf niet worden aangetast. Het is onwaarschijnlijk dat de landschapselementen aangetast zullen worden: de natuur wordt naar verwachting gerealiseerd tussen de bestaande (tiend)wegen, weteringen, kades en eendenkooien in. De waarde van de vlakken (polders) zal niet afnemen omdat het overwegende landgebruik landbouw blijft.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In het alternatief 'Grutto en Otter' wordt het gehele plangebied omgezet in natuur. Van het totale gebied wordt 2 % moerasbos. De gebouwde monumenten in het plangebied worden niet aangetast. De Beijersche Brug dient in subalternatief 1 waarschijnlijk verhoogd te worden. Door de realisatie van grote aaneengeschaalde natuurgebieden is het waarschijnlijk dat enkele cultuurhistorische landschapselementen aangetast worden of deels verloren kunnen gaan. Wegen blijven behouden maar dienen wel voor een deel opgehoogd te worden [Witteveen+Bos, 2007a]. Het is niet de verwachting dat de eendenkooien of kades aangetast worden. De waarde van de cultuurhistorische vlakken (polders en verkavelingstructuur) verandert wel, een deel van de polder krijgt een nieuwe inrichting.

alternatief 'Groeiend Veen'

In het alternatief 'Groeiend Veen' wordt het gehele plangebied omgezet in natuur. Hiervan zal 14 % zich ontwikkelen tot moerasbos. De gebouwde monumenten worden niet aangetast. Door de realisatie van natuur en met name moeras op grote schaal kunnen landschapselementen verloren gaan. Eendenkooien en kades worden niet aangetast. De waarde van cultuurhistorische vlakken (polders) verandert: deze neemt af door herinrichting van het gebied. Dit effect wordt echter apart beoordeeld bij openheid en verkavelingstructuur

conclusie

De huidige situatie wordt beschouwd als cultuurhistorisch waardevol. De diverse landschapselementen zijn zeer kenmerkend voor het gebied en gaaf. Ze zijn echter niet zeldzaam maar wel in grote mate onvervangbaar. In het nulalternatief blijft de waarde (op korte en middellange termijn) behouden. In beide alternatieven blijven de gebouwde monumenten behouden en de meeste landschapselementen ook. Afhankelijk van de subalternatieven, zullen sommige wegen opgehoogd moeten worden (mogelijke aantasting gaafheid).

De cultuurhistorische waarde van vlakken (de polders en verkavelingstructuur) verandert in het nulalternatief nauwelijks. De vraag is of de nieuwe inrichting in de alternatieven de cultuurhistorische waarde van het vlak aantast of juist herstelt. Dit is afhankelijk van het gekozen natuurdoel. Inrichting als weidevogelgrasland, kruidenrijk grasland of botanisch grasland zal de situatie van rond 1900 dichterbij brengen en kan als zodanig positief beoordeeld worden. Inrichting als moeras zal juist aantasting van de cultuurhistorische waarde geven en zal negatief beoordeeld moeten worden. In het nulalternatief wordt slechts weinig moeras ontwikkeld, dus netto een neutraal tot positief resultaat. Op 25 % van het areaal van 'Grutto en Otter' wordt natte natuur ontwikkeld, waaronder ook moeras. Op meer dan 75 % van het plangebied (want ook in bepaalde delen van de natte natuur) worden cultuurhistorisch waardevolle graslanden ontwikkeld. Dit scoort voor de subalternatieven 2 en 3 netto neutraal tot positief. Subalternatief 1 scoort negatief, omdat deze op den duur meer op 'Groeiend Veen' gaat lijken. Op circa 50 % van het areaal wordt in het alternatief 'Groeiend Veen' moerasbos, ruigte en natte natuur ontwikkeld. De netto beoordeling wordt hierdoor negatief. Tenslotte wordt opgemerkt dat in deze paragraaf alleen gekeken is naar de cultuurhistorische elementen zelf en niet naar de samenhang tussen deze elementen en de omgeving en de invloed van de alternatieven daarop. Hieraan zal in het ontwerpstadium aandacht besteed moeten worden.

tabel 4.3. Beoordelingstabel cultuurhistorische landschapselementen en gebouwde monumenten

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveldddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische landschapselementen en gebouwde monumenten	0 zeer kenmerkend niet zeldzaam gaaf redelijk vervangbaar	0/+	-	0/+	0/+	-

mitigerende maatregelen

Mogelijke mitigerende maatregelen zijn:

- bij het ontwerp op detailniveau rekening houden met cultuurhistorische landschapselementen en de samenhang van deze elementen met de omgeving.

4.4. Openheid

nulmeting

De visuele openheid en weidsheid van de Krimpenervaard is een typerend kenmerk van de Krimpenervaard (fysieke drager, zie afbeelding 4.8). Deze weidsheid heeft ook een grote aantrekkingskracht op doortrekkende en overwinterende vogels en weidevogels. De openheid wordt mede veroorzaakt doordat de lintbebouwing zich voornamelijk oost-west heeft georiënteerd. De openheid is zeldzaam, want dit komt in Nederland, zelfs bij andere veenweidegebieden, niet op deze schaal voor. De openheid is nog nauwelijks verstoord en dus nog gaaf. Als de openheid verloren gaat is deze theoretisch te herstellen door de geplaatste obstakels weer weg te halen, maar in de praktijk zal dat niet gebeuren. De openheid is dus in praktische zin onvervangbaar. Een belangrijk aspect van de openheid is dat het typerende beeld van de hoge rivierdijk en een lagere polder goed zichtbaar is. Deze visuele relatie wordt als waardevol beschouwd, zie afbeelding 4.9. Op veel locaties is de relatie minder zichtbaar door de aanwezigheid van lintbebouwing langs de dijk.

afbeelding 4.8. Openheid in de Krimpenervaard (links: zuidelijk van Bilwijkerweg bij Haastrecht; rechts: Achterwetering vanaf Wellepoort)



[Bron: Barend de Jong, 2008].

afbeelding 4.9. Voorbeeld relatie rivierdijk (Lekdijk) met polder (polder Den Hoek)



[Bron: Barend de Jong, 2009].

nulalternatief

In de autonome ontwikkeling blijft de openheid van het plangebied redelijk behouden. De geplande natuur is versnipperd en zal de zichtlijnen niet belemmeren omdat de beoogde natuur vooral zal bestaan uit botanisch en weidevogelgrasland. Deze natuurdoelen zijn open van karakter (afbeelding 4.10). Er is dus weinig houtopslag te verwachten dat op het schaalniveau van het landschap de zichtlijnen kan aantasten (afbeelding 4.11). De mate van aantasting wordt bepaald door het areaal moerasbos (zeer gering in het nulalternatief en deels al aanwezig in de nulmeting) en de plaats in de ruimte. De visuele relatie tussen de rivierdijken en de polder blijft onaangetast.

afbeelding 4.10. Nat grasland, open natuur



afbeelding 4.11. Moerasbos, niet open natuur



[Bron: www.natuurpunt-meise.be].

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Bij het alternatief 'Grutto en Otter' wordt het gehele plangebied omgezet in natuur. De natuurdoelen zijn grotendeels doelen met een open karakter (botanisch en weidevogelgrasland). In 2 % van het gebied zal echter (moeras)bos aanwezig zijn dat niet open is. Een deel van dit (moeras)bos is overigens in de huidige situatie al aanwezig (eendenkooien, bosjes op kopse einden van percelen, etc.). Dit tast de openheid van het gebied aan, hoewel een percentage van 2 % relatief laag is en dus de openheid gehandhaafd blijft.

Ook de visuele relatie tussen de rivierdijk en de polder wordt hiermee aangetast omdat de dijk minder goed zichtbaar is vanuit de polder. Dit hangt wel af van de verdeling van de 2 % bos over het gebied, die hier niet beoordeeld is, omdat de precieze locatie van nieuw bos bepaald zal worden in het kader van het integraal inrichtingsplan.

alternatief 'Groeind Veen'

Bij het alternatief 'Groeind Veen' wordt het gehele plangebied omgezet in natuur. Voor een deel zijn dat open natuurdoelen (botanisch en weidevogelgrasland), maar voor 14 % is dit moerasbos. Hierbij is houtopslag te verwachten en wordt de openheid aangetast. Ook de visuele relatie tussen de rivierdijk en de polder kan hiermee aangetast worden.

conclusie

De openheid en weidsheid van de Krimpenerwaard is van een hoge waarde. Natuurontwikkeling beïnvloedt de openheid door houtopslag en riet. In de hier gemaakte beoordeling is alleen het effect van houtopslag in de beoordeling meegenomen, omdat dit een permanent effect heeft. Rietgroei is door middel van gericht maaibeheer naar wens (zichtlijnen open houden) te beïnvloeden.

In het nulalternatief en bij subalternatieven 2 en 3 van 'Grutto en Otter' blijft de openheid vrijwel geheel behouden (beoordeling neutraal: 0/-). Bij 'Groeind Veen' en subalternatief 1 van 'Grutto en Otter' verslechtert de openheid omdat er in 14 % van het gebied moerasbos gerealiseerd wordt waarbij houtopslag optreedt (beoordeling negatief: -/-). Een afname van de openheid betekent ook dat de visuele relatie tussen de rivierdijk en de polder verslechtert. De rivierdijk wordt minder zichtbaar in het landschap.

tabel 4.4. Beoordelingstabel openheid

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveldaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
behoud van openheid	0 zeer kenmerkend zeldzaam gaaf redelijk vervangbaar	0/-	-/--	0/-	0/-	-/--

mitigerende maatregelen

Mogelijke mitigerende maatregelen zijn:

- bij het inrichtingsontwerp rekening houden met de locatie van moerasbos in relatie tot openheid en zichtlijnen.

5. EFFECTEN OP BODEM EN WATER

5.1. Inleiding

Dit hoofddoel heeft betrekking op:

- waterbeheer gericht op tegengaan bodemdaling;
- de realisering van een robuust watersysteem door middel van:
 1. minimalisatie van het aantal peilvakken in het plangebied;
 2. optimalisatie van grootte en vorm van de peilvakken;
 3. maximalisatie van de berging in de peilvakken;
 4. maximalisatie van de overbruggingsperiode van droogte;
- de verbetering van de waterkwaliteit voor natuurdoelen door middel van:
 1. terugdringen invloed vermessing;
 2. bereiken van de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), te weten het bereiken van een goede fysisch-chemische toestand en een goede ecologische toestand.

5.2. Tegengaan bodemdaling

Het grootschalige veenvormingsproces dat tot het ontstaan van de huidige ondergrond heeft geleid, is circa duizend jaar geleden gestopt als gevolg van ontwatering en het tegengaan van inundaties met rivierwater. Door oxidatie, klink, krimp en zetting is er sindsdien sprake van maaiveldddaling. Hieronder worden de processen afzonderlijk besproken en wordt aangegeven hoe er met het proces rekening is gehouden in de uitgevoerde berekening van de bodemdaling.

oxidatie

Oxidatie is de afbraak van veen. Veen bestaat uit geaccumuleerd organisch materiaal dat niet of onvolledig is verteerd. In de toplaag boven de grondwaterspiegel (aëroob) wordt het veen onder invloed van zuurstof relatief snel afgebroken. Hierbij komen nutriënten en CO_2 (broeikasgas) vrij. Onder de grondwaterspiegel (anaëroob) oxideert veen onder invloed van SO_4^{2-} en NO_3^- waarbij naast nutriënten N_2O vrijkomt (lachgas, een broeikasgas). Oxidatie van veen gaat door zolang er veen is. Temperatuur blijkt van groot belang voor de oxidatiesnelheid. Zo vindt 90 tot 95 % van de afbraak plaats in het zomerhalfjaar. Verhoging van de temperatuur onder invloed van klimaatverandering kan zo de afbraaksnelheid doen toenemen. De oxidatiesnelheid wordt verder beïnvloed door de zuurgraad en het zuurstofgehalte van de bodem.

Oxidatie vindt vooral plaats boven de grondwaterspiegel en is bij een normale landbouwdrooglegging voor veengebied verantwoordelijk voor ongeveer 85 % van de bodemdaling boven de grondwaterspiegel. De overige 15 % daling boven de grondwaterspiegel worden veroorzaakt door permanente krimp en klink.

De berekeningswijze van bodemdaling door oxidatie is uitgelegd in bijlage 6. Er is gebruik gemaakt van de formules van Van der Meulen et al (2005). De formule is door middel van een correctiefactor geijkt op de gemeten bodemdalingssnelheid in de Krimpenerwaard, waarbij is aangenomen dat 55 % van de totaal gemeten bodemdaling wordt veroorzaakt door oxidatie. Zie kader 'bijdrage processen aan bodemdaling' en bijlage 6 voor meer uitleg.

bijdrage processen aan bodemdaling

De bodemdaling vindt normaliter voor 65 % plaats boven en voor 35 % beneden de grondwaterstand (Schothorst, 1977). Van de bodemdaling veroorzaakt door oxidatie, klink en krimp boven de grondwaterstand is normaliter 85 % het gevolg van veenoxidatie [Wesdorp, 1985]. De overige 15 % wordt veroorzaakt door krimp en klink. Dit betekent dat van de totale bodemdaling 55 % wordt veroorzaakt door oxidatie (65 % van 85 %), 5 % door permanente krimp (65 % van 7,5 %) en 40 % door klink.

krimp

Krimp is het gevolg van uitdroging. Jong veen bestaat voor circa 90 % uit water. Bij grondwaterstandsverlaging neemt dat percentage af, waardoor het veen als het ware verschrompelt. Hierbij verandert de structuur en samenstelling van het veen, wat tot gevolg heeft dat een deel van de krimp blijvend is en niet herstelt bij vernatting. Krimp vindt dus alleen boven de grondwaterspiegel plaats. De bijdrage van permanente krimp aan de totale bodemdaling is gering: samen met klink slechts 15 % van de daling boven de grondwaterspiegel. Aangenomen is dat de helft van deze resterende daling boven de grondwaterspiegel wordt veroorzaakt door permanente krimp, zie bijlage 6. Dit betekent dat krimp voor 5 % bijdraagt aan de totale bodemdaling (65 % van 7,5 %).

klink

Klink is het in elkaar gedrukt worden door het eigen gewicht van het veenpakket. Door een toename van de korrelspanning (de druk die de veendeeltjes op elkaar uitoefenen) gaat de bodem inklinken. De klink gaat na een verandering van de korrelspanning door een externe ingreep (bijvoorbeeld waterstandsverlaging) eerst snel en neemt geleidelijk af. Na zes jaar [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenervaard, 2007a] klinkt de bodem niet verder in, er is dan wat klink betreft een evenwichtssituatie bereikt. Het evenwicht wordt echter zelden bereikt doordat de korrelspanning vrijwel continu verandert door veranderingen in de grondwaterspiegel en afname van de dikte van het veenpakket. De korrelspanning kan onder andere veranderen door:


- verlagen grondwaterpeil, waardoor de opwaartse kracht van het water afneemt en de korrelspanning toe (afbeelding 5.1). Peilverlaging geeft daardoor klink;
- bodemdaling, waarbij het peil mee zakt, waardoor de korrelspanning afneemt (afbeelding 5.2). Afname van de korrelspanning geeft geen klink;
- bodemdaling, waarbij het peil gefixeerd wordt, waardoor de korrelspanning nog meer afneemt (afbeelding 5.3). Afname van de korrelspanning geeft geen klink;
- afplaggen, waardoor de bodem in korte tijd veel daalt, waardoor de korrelspanning afneemt. Dit is eigenlijk een speciaal geval van bodemdaling met peilfixatie (afbeelding 5.3). Afname van de korrelspanning geeft ook hier geen klink.

De afbeeldingen 5.1 tot en met 5.3 zijn illustratief. De toegepaste peilwijzigingen en bodemdalingen zijn overdreven. In de afbeeldingen zijn spanningsdiagrammen weergegeven voor de verschillende situaties. De korrelspanning is het verschil tussen totale grondspanning en de waterspanning (opwaartse druk) en is in kN/m^2 in de afbeeldingen opgenomen en doormiddel van een liggend pijltje op een diepte van 11 m onder maaiveld aangegeven. De klink is verantwoordelijk voor ongeveer 40 % van de totale bodemdaling, zie bijlage 6.


zetting

Zetting is samendrukking van het bodemprofiel als gevolg van een externe belasting (bijvoorbeeld het gewicht van een zandlichaam). Het principe is gelijk aan klink, alleen de oorzaak van de spanningstoename is anders. Bodemdaling door zetting is verder niet meegenomen in de berekeningen, omdat dit hier niet speelt.


afbeelding 5.1. Toename korrelspanning door peilverlaging van 50 cm



afbeelding 5.2. Afname korrelspanning door zakking maaiveld en peil van 1 m



afbeelding 5.3. Afname grondspanning door zakking bodem van 1 m terwijl peil gelijk blijft



combinatie van processen

Uit de literatuur volgt dat ongeveer 55 % van de totale bodemdaling wordt veroorzaakt door oxidatie en 45 % door krimp en klink (zie kader 'bijdrage processen'). Door de mate van het opzetten van het peil en door vervolgens het peil te fixeren of mee te laten dalen met het maaiveld veranderen de verhoudingen tussen de processen die de totale bodemdaling veroorzaken. In deze paragraaf wordt aan de hand van de met de in bijlage 6 beschreven methode berekende bodemdaling in het gebied Veerstaalblok de veranderende verhoudingen tussen de processen toegelicht. In afbeelding 5.4. is de bodemdalingssnelheid voor de alternatieven weergegeven in de periode 2008 tot 2033 en in afbeelding 5.5. de totale bodemdaling voor deze periode. Uit de afbeeldingen komt naar voren dat de bodemdalingssnelheid gedurende de periode 2008-2033 niet voor alle alternatieven constant is.


In de alternatieven waarin het peil mee blijft zakken met het maaiveld, zal er oxidatie blijven plaatsvinden met een vrijwel constante snelheid. De oxidatiesnelheid is immers afhankelijk van de drooglegging. Ook de krimp blijft gelijk omdat er steeds een nieuw stukje veen kan uitdrogen omdat het peil mee zakt. Voor klink treden twee mechanismen in werking: na verlaging van het peil neemt eerst de korrelspanning toe waardoor klink optreedt. Daarna neemt de korrelspanning langzaam af omdat de drooglegging weer langzaam kleiner wordt. Na de volgende peilaanpassing begint dit proces opnieuw, zodat een zaagtandfiguur ontstaat in afbeelding 5.4 voor het nulalternatief gedurende de gehele periode en voor de subalternatieven 2 en 3 van Grutto en Otter na verloop van tijd. Een groot deel van de tijd treedt dus nog wel klink op.

In de situatie waarbij het peil gefixeerd wordt, zal de oxidatie langzaam afnemen omdat de drooglegging steeds kleiner wordt. De krimp stopt na enige tijd omdat er geen nieuwe delen van het veen droog komen te staan. De klink neemt langzaam af omdat de dikte van het totale veenpakket afneemt en wordt uiteindelijk 0. In afbeelding 5.4. treedt dit op bij alternatief Groeiend Veen en bij subalternatief 1 van Grutto en Otter. De grafieken van de bodemdalingssnelheid voor deze alternatieven zijn daarom geen zaagtandfiguren.


Bij de alternatieven met een initiële peilopzet zal de klink 0 zijn omdat de korrelspanning afneemt. De bodem kan in theorie zelfs een stuk terug veren. In de berekening is in dat geval aangenomen dat de klink 0 wordt, met terugvering is geen rekening gehouden. In de subalternatieven van Grutto en Otter en het alternatief Groeiend Veen wordt het peil opgezet. De bodemdaling voor deze alternatieven is daarom in de eerste jaren klein ten opzichte van de bodemdaling van het nulalternatief. Klink keert terug als het peil verlaagd wordt en onder het niveau van 2008 komt te liggen. Dit is het geval bij de subalternatieven 2 en 3 van Grutto en Otter. Door de initiële peilopzet is er in eerste instantie geen klink. De grafieken van de bodemdalingssnelheid voor deze subalternatieven zijn daarom pas na verloop van tijd zaagtandfiguren.

Opvallend detail in afbeelding 5.4. is de verhoging van de bodemdalingssnelheid voor het nulalternatief na 2029. Ook in het nulalternatief wordt het peil opgezet. Dit gebeurt in de natuurgebieden die een eigen peilvak krijgen. In 2029 wordt het peil in deze natuurgebieden verlaagd en komt onder het niveau van 2008 te liggen. Hierdoor keert in dit gebied klink terug en neemt de bodemdalingssnelheid voor het gebied als geheel toe.

afbeelding 5.4. Bodemdalingssnelheid Veerstablok voor verschillende alternatieven



afbeelding 5.5. Bodemdaling Veerstablok voor verschillende alternatieven



nulmeting

In het concept watergebiedsplan, dat door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt opgesteld [Osté et al, 2010], is op basis van historische maaiveldhoogtemetingen de bodemdalingsnelheid afgeleid. Tabel 5.1 geeft de huidige drooglegging per (peil)gebied in 2008, dit is gemiddeld 48 cm, en de daaruit voortkomende maaiveld daling varieert tussen 0,4 en 0,9 cm per jaar.

nulalternatief

De komende 25 jaar komt het areaal natuur met een eigen peilvak uit op circa 14 % van het totale plangebied. Het optimaal peil voor natuur is een flexibel peil binnen een drooglegging van 20 tot 35 cm. Het resterende deel van de natuur is gelegen in peilgebieden met een voor de landbouw geschikte drooglegging. Dit heeft tot gevolg dat slechts een deel van de peilen aangepast wordt en daarmee voor slechts beperkte gebieden de drooglegging wordt verkleind. De maaiveld daling is berekend in bijlage 6. Vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse maaiveld daling in de huidige situatie, vermindert de jaarlijkse maaiveld daling in het nulalternatief in het plangebied iets (zie tabel 5.1). Dit komt door de vermindering van de bodemdaling in de natuurgebieden met een eigen peilvak.

Door de kleinere drooglegging neemt de totale veenoxidatie in het gebied iets af in het nulalternatief. De krimp blijft echter onveranderd omdat het peil mee blijft zakken met de bodem. De klink neemt in eerste instantie af omdat het peil iets opgezet wordt. Daarna zal na elke peilverlaging de klink tijdelijk toenemen door de verhoogde grondspanning en daarna weer afnemen omdat de grondspanning weer daalt door het dunner worden van het veenpakket.

tabel 5.1. Drooglegging en maaiveldddaling in de huidige situatie en autonome ontwikkeling

naam (peil)gebied (zie afbeelding 5.1)	nulmeting (huidige situatie)		nulalternatief (autonome ontwikkeling)		
	gemiddelde drooglegging 2008 (cm)	gemiddelde maaiveld- dalingssnelheid 2008 (cm/jaar)	gemiddelde drooglegging 2033 (cm)	gemiddelde maaiveld- dalingssnelheid 2033 (cm/jaar)	gemiddelde maaiveldddaling periode 2008- 2033 (cm)
Den Hoek natuurgebied	50	0,5	47,9	0,4	9,3
Oudeland en Berkenwoude	37	0,6	36,4	0,5	10,0
De Nesse en Kattendijkblok	48	0,8	46,5	0,7	16,7
Middelblok totaal	52	0,9	50,0	0,8	18,0
Veerstalblok	39	0,5	38,4	0,4	8,4
Hollandsche polder	45	0,3	43,4	0,4	8,9
Haastrecht Natuur	54	0,4	51,3	0,4	8,6
plangebied (gewogen ge- middelde)	48	0,7	45	0,6	13,4

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' wordt voor ieder peilvak het peilregime afgestemd op de eisen van de weidevogelgebieden die in het peilvak gelegen zijn. Het winterpeil ligt in de weidevogelgebieden op ongeveer 20 cm onder maaiveldniveau en voor het gehele plangebied op ongeveer 15 tot 30 cm onder maaiveldniveau, en dit blijft zo het liefst tot diep in het voorjaar. Het zomerpeil ligt in de weidevogelgebieden op ongeveer 35 cm onder maaiveld en dus voor het hele plangebied op ongeveer 30 tot 40 cm onder maaiveld. De peilen zijn op die wijze optimaal afgestemd op de weidevogelgebieden. Binnen het alternatief 'Grutto en Otter' zijn er drie subalternatieven:

1. subalternatief 'directe realisatie met peilfixatie';
2. subalternatief 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt';
3. subalternatief 'ingroeimodel'.

De maaiveldddaling over de periode 2008-2033 is berekend in bijlage 6 en is voor ieder subalternatief verschillend (zie tabel 5.2), maar substantieel minder dan in het nulalternatief. Deze kleinere maaiveldddaling is het resultaat van een kleinere drooglegging dan in het nulalternatief. Er is duidelijk een verschil tussen de subalternatieven met peilfixatie en handhaven van de drooglegging. Door de peilfixatie komt de bodem in evenwicht en vindt er alleen bodemdaling door veenoxidatie plaats en niet meer door klink en krimp. Door het handhaven van de drooglegging in subalternatief 2 blijft de bodem dalen door oxidatie, klink en krimp. In het subalternatief 3 'ingroeimodel' wordt het winterpeil bij de inrichting opgehoogd, terwijl in de zomer het peil kan uitzakken naar het niveau van voor de inrichting voor natuur. Daarmee is nog niet de gewenste drooglegging verkregen. Gedurende een aantal jaren zal dit peil gehandhaafd blijven, totdat het maaiveld gedaald is tot de gewenste drooglegging. Na het bereiken van de gewenste drooglegging, zal het peil de maaiveldddaling volgen waardoor de drooglegging gehandhaafd wordt.

tabel 5.2. Gemiddelde drooglegging en maaiveldddaling 'Grutto en Otter'

alternatieven	gemiddelde drooglegging 2033		gemiddelde maaiveldddalingssnelheid 2033		gemiddelde maaiveldddaling periode 2008- 2033	
	cm	reductie	cm/jaar	reductie	cm	reductie
nulalternatief	48	0 %	0,6	0 %	13,4	0 %
'Grutto en Otter' subalternatief 1 'directe realisatie met peilfixatie'	29,0	40 %	0,1	83 %	4,7	65 %
'Grutto en Otter' subalternatief 2 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt'	33,6	30 %	0,3	50 %	5,2	61 %
'Grutto en Otter' subalternatief 3 'ingroei-model'	33,9	29 %	0,5	17 %	7,6	43 %

alternatief 'Groeind Veen'

In het alternatief 'Groeind Veen' wordt geprobeerd de bodemdaling te minimaliseren (zie tabel 5.3). Daartoe zullen de zomer- en winterpeilen in dit alternatief gelijk worden gehouden op gemiddeld 15 cm onder het maaiveld. Hiermee is de drooglegging 5 tot 20 cm kleiner dan vergeleken met het alternatief 'Grutto en Otter'. De gemiddelde maaiveldddaling over de periode 2008-2033 is berekend op 9 mm, dit is slechts 7 % van de gemiddelde maaiveldddaling in het nulalternatief. De snelheid van de bodemdaling is gemiddeld 0,03 mm per jaar. Dit is nog maar 6 % van de oorspronkelijke bodemdalingssnelheid in de autonome ontwikkeling (nulalternatief). Deze kleinere maaiveldddaling is het resultaat van het waterbeheer gericht op het tegengaan van de maaiveldddaling. De peilen worden niet meer gewijzigd zodat de bodem in evenwicht komt en de bodemdaling alleen door veenoxidatie wordt veroorzaakt en niet meer door klink en krimp.

tabel 5.3. Gemiddelde drooglegging en maaiveldddaling 'Groeind Veen'

alternatieven	gemiddelde drooglegging 2033		gemiddelde maaiveldddalingssnelheid 2033		gemiddelde maaiveldddaling periode 2008- 2033	
	cm	reductie	cm/jaar	reductie	cm	reductie
nulalternatief	48	0 %	0,6	0 %	13,4	0 %
'Groeind Veen'	14	71 %	0,03	95 %	0,9	93 %

conclusie

Vergeleken met de bodemdaling in het nulalternatief wordt de bodemdaling in zowel de subalternatieven van de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' als het alternatief 'Groeind Veen' sterk gereduceerd. De maatregelen om bodemdaling te verminderen zijn volgens de berekeningen effectief. Echter, de verschillen tussen de (sub)alternatieven zijn behoorlijk groot vooral als de verschillen worden uitgedrukt in procenten ten opzichte van het nulalternatief.

Voor 'Grutto en Otter' scoort subalternatief 1 het beste. Dit subalternatief gaat op den duur steeds meer op 'Groeind Veen' lijken. De bodemdaling na 25 jaar is in subalternatief 2 iets meer dan gehalveerd ten opzichte van het nulalternatief. Dit wordt positief beoordeeld. Het ingroei-model van subalternatief 3 scoort duidelijk het minst goed van de drie subalternatieven en wordt daarom gematigd positief beoordeeld.

Het tegengaan van bodemdaling in het alternatief 'Groeind Veen' wordt zeer positief beoordeeld. In dit alternatief neemt de bodemdaling met 93 % af en de bodemdalingssnelheid met 95 %.

tabel 5.4. Effectentabel Bodemdaling


beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	nulalternatief (autonome ontwikkeling)	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie met peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld-daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
bodemdaling na 25 jaar in cm en reductie in % ten opzichte van het nulalternatief	n.v.t.	13,4	4,7 (65 %)	5,2 (61 %)	7,6 (43 %)	0,9 (93 %)
bodemdalingsnelheid na 25 jaar in cm/jaar en reductie in % ten opzichte van het nulalternatief	n.v.t.	0,6	0,1 (83 %)	0,3 (50 %)	0,5 (17 %)	0,03 (95 %)
beoordeling	0	0	+/++	+	0/+	++

mitigerende maatregelen


In de hier toegepaste rekenmethodiek is nog geen rekening gehouden met de invloed van het uitzakken van de grondwaterspiegel op bodemdaling binnen een perceel. Het is bekend dat de grondwaterspiegel in het midden van een perceel in veenweidegebieden meer dan een meter kan uitzakken in de zomer, afhankelijk van het weer (afbeelding 5.7). Dit effect wordt veroorzaakt door de geringe doorlatendheid van veen in horizontale richting en de grote infiltratieweerstand vanuit de sloot naar het grondwater, waardoor de aanvulling van het grondwater uit de sloot beperkt is. Het gevolg hiervan is dat de bodemdaling in het midden van een perceel sneller gaat dan dicht bij de sloten, waardoor de zogenaamde holle percelen kunnen ontstaan (afbeelding 5.6). Dit effect wordt nog eens versterkt doordat de bagger uit de sloten vaak op de kant wordt gezet, waardoor de oever periodiek wordt opgehoogd. Overigens komen holle profielen niet in alle percelen van het projectgebied voor. Dit hangt af van de bodemsoort en het beheer. Sommige profielen zijn bijvoorbeeld weer vlak geschoven.

De mate van uitzakking in het midden van een perceel wordt bepaald door het vochttransport in verticale richting, de afstand tussen de drainage middelen (sloten, greppels of drains) en het oppervlaktewaterpeil. Het vochttransport in verticale richting wordt bepaald door neerslag en verdamping (het weer) in combinatie met kwel of wegzijging (de geohydrologische situatie). In de Krimpenerwaard is er sprake van (geringe) wegzijging naar de Zuidplaspolder. Dit is een geohydrologisch gegeven, waarvoor geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Ook aan neerslag en verdamping valt niets te veranderen. Daarom kan de uitzakking in het midden van een perceel alleen beperkt worden door het verkleinen van de afstand tussen de drainagemiddelen (sloten, greppels of drains). Aangezien het bestaande historisch gegroeide verkavelingspatroon vanuit landschappelijke overwegingen zoveel mogelijk gehandhaafd dient te worden, blijft als mitigerende maatregel het graven van greppels over om in de zomer vocht in de bodem te brengen om de bodemdaling tegen te gaan. Het voordeel daarvan is dat de bodemdaling beperkt wordt en de percelen minder hol trekken.

afbeelding 5.6. 'Holle' percelen in de Krimpenerwaard



afbeelding 5.7. Principeschets ontwateringsdiepte in een perceel tijdens de zomerperiode



5.3. Realisering robuust watersysteem

aantal en vorm van de peilvakken

Er wordt in de projectalternatieven gestreefd naar een vereenvoudiging van het watersysteem. Een belangrijk doel hiervan is het creëren van een robuust watersysteem met zo min mogelijk peilvakken. Het aantal peilvakken, de grootte en de vorm van de peilvakken wordt daarom meegenomen in de beoordeling. Hierbij is het positief als er minder peilvakken zijn en als de peilvakken groter zijn. Voor de vorm is de lengte/breedte verhouding aangehouden als maatstaf. Een lage lengte/breedte verhouding wordt hierbij positief beoordeeld. Zeer langgerekte peilvakken scoren hier dus slecht omdat er relatief veel kunstwerken nodig zijn om de waterscheidingen aan te brengen.

piekberging (waterberging voor wateroverlast)

In tijden van hevige neerslagpieken is de berging tot het maaiveld van belang. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (neerslaggebeurtenissen die zeldzamer zijn dan de norm), mag in economisch gebruikte gebieden (landbouw, bebouwd gebied) water uit de sloot overlopen en wateroverlast veroorzaken. Voor graslanden is de norm ruimer gesteld. Bij grasland mag 5 % van het oppervlak inunderen bij neerslaggebeurtenissen met een kleinere herhalingsstijd dan de norm. Bij neerslaggebeurtenissen die zeldzamer zijn dan de norm mag meer dan 5 % van het oppervlak inunderen. Een grote piekberging is daarom gunstig en draagt bij aan de robuustheid van het watersysteem. In natuurgebieden ligt dit iets anders. Voor natuur zijn er geen inundatienormen vastgesteld en vanuit het oogpunt van veiligheid kan inundatie in principe geaccepteerd worden. Door berging op maaiveld en het daarmee gepaard gaande zeer grote beschikbare oppervlak, is de omvang van de mogelijke piekberging in natuurgebieden daarmee vrijwel onbeperkt. Aandachtspunt daarbij zijn wel de gevolgen op de natuurdoelen, met name weidevogels zijn gevoelig voor zeer hoge waterstanden in het broedseizoen, en eventuele overlast van deze piekberging op omliggende landbouwgronden.

seizoensberging

Ook een grote seizoensberging draagt bij aan een robuust watersysteem. Er wordt gekeken hoeveel water het watersysteem kan bergen in een normale situatie (berging tot het streefpeil). Seizoensberging is alleen mogelijk als het peil tijdens droge perioden mag uitzakken. Grotere bergingen worden positief beoordeeld. Een grote seizoensberging betekent namelijk dat er minder water voor peilhandhaving hoeft te worden ingelaten en te worden uitgemalen (kostenbesparing).

Het waterbergend vermogen van het watersysteem wordt getoetst met een eenvoudige statische berekening voor het oppervlaktewatersysteem. Omdat er nauwelijks indringing van water vanuit het oppervlaktewater naar het freatisch grondwater plaatsvindt, wordt de seizoensberging in het grondwater hier buiten beschouwing gelaten. De inlaat van gebiedsvreemd water is dus primair bedoeld voor het handhaven van het oppervlaktewaterpeil. Het aantal dagen zonder inlaat is bepaald door voor een droge zomer (zomer 2003) te berekenen hoeveel oppervlaktewater verdampt uit het gebied en wegzijgt richting de zeer laag gelegen Zuidplaspolder. Deze verdamping en wegzijging veroorzaken een daling van het waterpeil in het open water. Als het streefpeil strak gehanteerd wordt, zal bij de eerste daling water worden ingelaten. Indien het peil mag uitzakken, wordt er pas water ingelaten als de ondergrens van het peil bereikt wordt. Dit speelt alleen bij het alternatief 'Grutto en Otter' en zal daar nader toegelicht worden. Volgens de klimaatscenario's van het KNMI neemt tot het jaar 2050 de potentiële verdamping tussen de 3 en 15 % toe. Deze toename is niet meegenomen met het bepalen van het aantal dagen dat er niet ingelaten hoeft te worden in het plangebied.

nulmeting

In de huidige situatie zijn de peilgebieden niet aangepast aan de geplande natuur. Hierdoor valt het plangebied binnen verschillende peilgebieden die doorlopen buiten het plangebied. Voor de beoordeling zijn al deze peilgebieden meegeteld met de huidige oppervlakte en vorm. De totale oppervlakte van deze peilvakken is bijna 5 keer zo groot als de oppervlakte van het plangebied. Bij het berekenen van de berging is uitgegaan van alleen het plangebied. Uitgangspunt hierbij is dat in de huidige situatie 15 % van de oppervlakte uit open water bestaat [Witteveen+Bos, 2007]. Op basis van de droogleggingskaart [Casimir et al, 2006] is de piekberging tot het maaiveld bepaald op 1.800.000 m³. De seizoensberging wordt nul verondersteld omdat in de huidige situatie het streefpeil strak gehandhaafd blijft. Zodra het peil onder streefpeil zakt wordt er dus vrijwel direct rivierwater ingelaten van buiten de Krimpenerwaard. Hierdoor is ook het aantal dagen zonder inlaat nul, men start immers direct met het inlaten van water.

nulalternatief

Er wordt een stijging verwacht van het aantal peilgebieden, door de toename van het natuurareaal met een eigen peilvak. Waar deze peilvakken precies komen te liggen, hoeveel het er zullen worden en hun vorm, zijn nog onbekend. Wel kan gesteld worden dat de versnippering van peilvakken in het nulalternatief behoorlijk toeneemt omdat de natuurpercelen verspreid in het plangebied liggen (zie afbeelding 3.2). Dit effect wordt versterkt doordat de bodemdaling in de natuurgebieden afneemt ten opzichte van de omringende landbouwpercelen. De natuur komt daardoor op den duur hoger in het landschap te liggen dan de omringende landbouw. Dit geeft op lange termijn een inversie van het landschap: droge functies laag gelegen en natte functies hoog gelegen. Deze ontwikkeling maakt het waterbeheer steeds complexer en dat is niet gunstig voor de robuustheid van het watersysteem.

Bij het berekenen van de hoeveelheid piekberging in de peilvakken wordt net als in de nulmeting uitgegaan van alleen het plangebied en 15 % open water. Van het plangebied zal 35 % omgezet worden in natuur (gronden in bezit Zuid-Hollands Landschap), waarvan 40 % in een eigen peilvak is gelegen. Op deze delen zal de drooglegging veranderen van 45-60 cm naar 20-25 cm. Gemiddeld neemt daar de drooglegging dus af met 30 cm. Dat komt neer op een vermindering van de piekberging met 155.000 m³, zodat er 1.645.000 m³ piekberging tot maaiveld resteert. In de overige peilvakken zal de piekberging niet veranderen omdat het peil mee zakt met het maaiveld zodat de drooglegging van 45-60 cm gehandhaafd blijft ten behoeve van de landbouw. Echter, op de natuurpercelen met een eigen peilvak (14 % van het areaal van het plangebied, 343 ha) kan inundatie van het maaiveld geaccepteerd worden. Reeds bij een geaccepteerde inundatie van 5 cm op maaiveld in de natuurgebieden met een eigen peilvak wordt het berekende verlies van 155.000 m³ aan piekberging gecompenseerd. Bij verdere stijging van het peil boven maaiveld zal de piekberging in de natuurgebieden met een eigen peilvak alleen maar toenemen wat gunstig is voor de robuustheid van het watersysteem.

Het beleid voor het inlaten van gebiedsvreemd water verandert niet in het nulalternatief. De seizoensberging verandert daardoor niet en blijft gelijk aan de huidige situatie. Bij droogte zal water worden ingelaten om het gebied op peil te houden.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Voor alle (sub)alternatieven geldt dat dezelfde nieuwe indeling in peilvakken van kracht is. Voor de bepaling van het aantal peilvakken en de grootte en vorm bij de alternatieven is uitgegaan van de concept kaart 'ligging peilgebieden' d.d. 22 juni 2008 uit het concept watergebiedsplan Krimpenerwaard, zie afbeelding 5.8 [Osté et al, 2010].

De piekberging tot aan maaiveld is afhankelijk van de droogleggingen, deze verschillen per subalternatief, maar zijn eigenlijk niet zo interessant meer. Doordat het gehele plangebied de functie natuur heeft gekregen kan inundatie van het maaiveld geaccepteerd worden. Bij een inundatie van slechts 10 cm op een oppervlakte van 2.450 ha is de totale piekberging op maaiveld 2.450.000 m³. Dit is veel meer dan de huidige piekberging van 1.800.000 m³ en bij verdere peilstijging is de piekberging in het natuurgebied bijna onbegrensd.

De seizoensberging tot het streefpeil is voor alle varianten hetzelfde: in de zomer mag het peil 15 cm wegzakken in het gehele plangebied met uitzondering van Den Hoek [Osté et al, 2010]. Dit komt overeen met een berging van 805.000 m³. Het aantal dagen zonder inlaat is voor de drie subalternatieven gelijk. Tijdens een droge zomer (zomer 2003) bedraagt de gemiddelde openwaterverdamping ongeveer 6 mm/dag. De netto wegzijging bedraagt voor de gehele Krimpenerwaard 5,4 miljoen m³/jaar [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007]. De netto wegzijging wordt onttrokken aan het oppervlaktewater en is daarmee 0,7 mm/dag. Bij een toelaatbare peiluitzakking van 15 cm betekent dit dat er 22 dagen geen water ingelaten hoeft te worden, mits het waterpeil aan het begin van de droge periode maximaal was.

alternatief 'Groeind Veen'

De peilvakindeling is voor het alternatief 'Groeind Veen' hetzelfde als het alternatief 'Grutto en Otter' en wordt gelijk beoordeeld.

Ten aanzien van de piekberging geldt in analogie met 'Grutto en Otter' dat ook hier de piekberging bijna onbegrensd is door de acceptabele inundatie van het maaiveld.

Het peil mag in dit alternatief niet wegzakken in de zomer, er is dus geen flexibel peilbeheer. De seizoensberging tot het streefpeil is dan ook op 0 m³ gesteld.

conclusie

In het nulalternatief neemt het aantal en de versnippering van de peilvakken in het plangebied toe en de grootte van de peilvakken neemt daardoor af en de natuurgebieden komen op lange termijn geïsoleerd en hoger in het landschap te liggen. Dat is voor de robuustheid ongunstig. Daar staat tegenover dat de piekbergingscapaciteit toeneemt door acceptabele inundatie van het maaiveld in de natuurgebieden. Beide effecten tegen elkaar afwegend wordt het effect op de robuustheid van het watersysteem in het nulalternatief toch negatief beoordeeld, omdat de versnippering en daarmee toenemende complexiteit zwaarder weegt (-).

Ten aanzien van de robuustheid van het watersysteem is er nauwelijks onderscheid te maken tussen de subalternatieven van 'Grutto en Otter'. 'Grutto en Otter' scoort het beste van alle alternatieven ten aanzien van de robuustheid van het watersysteem, omdat:

- het aantal peilvakken af neemt ten opzichte van de nulmeting;
- er seizoensberging ontstaat waardoor er minder rivierwater hoeft te worden ingelaten;
- er veel piekberging op maaiveld ontstaat.

'Groeind Veen' scoort iets minder dan 'Grutto en Otter', omdat in dit alternatief geen seizoensberging is.

tabel 5.5. Effectentabel robuust watersysteem

beoordelingscriterium	nulmeting	autonome ontwikkeling	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeind Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
aantal peilvakken in het natuurgebied	15 ³	onbekend, maar hoger dan in de nulmeting	11	11	11	11
gemiddelde grootte van de peilvakken (ha)	800	onbekend, maar kleiner dan in de andere alternatieven	430	430	430	430
vorm van de peilvakken (lengte/breedte ratio)	2,3	onbekend maar groter (ongunstiger) dan in de nulmeting	3,2	3,2	3,2	3,2

³ Gedeeltelijk buiten het plangebied.

beoordelingscriterium	nulmeting	autonome ontwikkeling	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
piekberging in het plangebied na 25 jaar (miljoen m ³)	1,8	1,6 + berging op maaiveld in natuur 0 met eigen peilvak	>2,5	>2,5	>2,5	>2,5
seizoensberging in het plangebied na 25 jaar (miljoen m ³)	0	0	0,8	0,8	0,8	0
maximale tijd zonder inlaat tijdens droge periode (dagen)	0	0	22	22	22	0
totaal beoordeling robuust watersysteem	0	-	++	++	++	+


5.4. Waterkwaliteit

In de projectalternatieven worden landbouwgebieden omgezet in natuurgebieden en de waterpeilen worden verhoogd ten behoeve van de natuur en het tegengaan van bodemdaling. Het veranderen van de functie van gebieden en het opzetten van waterpeilen heeft potentieel positieve en negatieve effecten op de waterkwaliteit. Dit betreft zowel de chemische als de ecologische waterkwaliteit. Beide worden beoordeeld aan de hand van de maatlatten van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voor de Kaderrichtlijn Water heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de wateren in haar beheersgebied ingedeeld in waterlichamen. Zoals aangegeven in afbeelding 5.9 liggen in het plangebied delen van drie waterlichamen. Dit zijn de waterlichamen Stolwijk, Bergambacht en Waterrijk Berkenwoude. De waterlichamen zijn gekenmerkt als gebufferde laagveensloten [codering M8; hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2007c]. Voor het beoordelen van de waterlichamen zijn maatlatten opgesteld. De maatlatten beoordelen de waterlichamen op abundantie van groeivormen, abundantie van macrofyten, vissen en fysische kwaliteitselementen [STOWA, 2007a].

In de maatlat fysische kwaliteitselementen wordt het waterlichaam beoordeeld op thermische omstandigheden, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, zuurgraad en nutriënten. Voor de Krimpenerwaard zijn de nutriënten een aandachtspunt. Voor het behalen van het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) dienen de fosfaat- en stikstofgehalten respectievelijk onder de 0,22 en 2,4 mg/l te liggen. De bronnen van de nutriënten zijn divers. De bemesting en de mineralisatie van de veenbodem zijn ieder voor 40-50 % van de totale nutriëntenbelasting verantwoordelijk. Daarnaast zorgt het inlaten van rivierwater voor 7 % van de nutriëntenbelasting [hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2007a].

afbeelding 5.8. Locatie van de waterlichamen in het plangebied



Legenda

 begrenzing

KRW-waterlichamen

 Bergambacht

 Stolwijk

 Waterrijk Berkenwoude

 Peilgebieden nieuwe situatie

KRW-waterlichamen

Aanwezige KRW-waterlichamen
in het plangebied

schaal: 0 0.5 1 1.5 2 km

projectcode: GV774-5
versie: definitief02
datum: 12-06-2009
getekend: dr. Ir. R.L.J. Nieuwkamer
gechecked: dr. Ir. R.L.J. Nieuwkamer

In de projectalternatieven verminderen deze belastingen door:

- het wijzigen van de functie van landbouw naar natuur (vermesting neemt af);
- afplaggen van de met fosfaat verrijkte bouwvoor in een deel van het gebied (alleen Grutto en Otter);
- het opzetten van het waterpeil en daarmee het verminderen van de veenoxidatie (mineralisatie neemt af);
- het laten wegzakken van het waterpeil in de zomer waardoor minder water ingelaten hoeft te worden.

Een potentiële bron van fosfaat bij vernatting is de huidige fosfaatvoorraad in de landbouwpercelen. Fosfaat blijft, in tegenstelling tot nitraat, zeer goed gebonden onder droge omstandigheden. Door vernatting van de bodem met een door bemesting verhoogde fosfaatvoorraad, komt het fosfaat vrij en ontstaat er extra uitspoeling van fosfaat vanuit de bodem. Deze belasting varieert tussen de 5 en 40 kg fosfor per hectare per jaar en houdt 60 tot 100 jaar aan na het vernatten van het bodemprofiel als er geen maatregelen worden getroffen [Lamers et al, 2005]. Of dit optreedt is, naast andere factoren, onder andere afhankelijk van het feit of het met fosfaat verrijkte bodemprofiel daadwerkelijk vernat door (maatregelen in) de alternatieven. Hieronder gaan we daar op in.

De met fosfaat verrijkte bodem is in de Krimpenerwaard waarschijnlijk beperkt tot de bovenste 10 tot 40 cm. Dit blijkt uit metingen in de polder Berkenwoude [Brouwer, 2009]. Fosfaten uit de landbouw zijn in de polder Berkenwoude 20-25 cm diep in de permanente graslanden doorgedrongen. Percelen die geroerd zijn, zijn tot op 40 cm diepte verrijkt met fosfaat. Op één perceel, waar de bemesting 28 jaar geleden is stopgezet, is het fosfaat slechts ruim 10 centimeter doorgedrongen in de bodem.

De waterverzadiging van de bovenste 40 cm van de bodem wordt met name bepaald door de invloed van neerslag en verdamping en niet of nauwelijks door de drooglegging (het slootpeil), omdat de horizontale weerstand van de bodem groot is (zie hiervoor ook paragraaf 5.2 tegengaan bodemdaling). Door begreppeling wordt de invloed van het slootpeil wel groter, maar deze reikt waarschijnlijk niet tot de bovenste 40 cm van de bodem. Dit betekent dat er in de alternatieven niet of nauwelijks vernatting plaatsvindt in de met fosfaat verrijkte bodem als gevolg van een wijziging van de drooglegging. Wat dit betekent voor de verschillen tussen de alternatieven wordt besproken bij de effecten.

Voor het nulalternatief en de alternatieven is kwalitatief nagegaan in welke mate de nutriëntenbelasting vanuit de verschillende bronnen toe- of afneemt. Om de verandering van de nutriëntenbelasting te kwantificeren en te vertalen naar de ontwikkeling van de nutriëntengehaltes in de verschillende alternatieven is een water- en stoffenbalans van het plangebied benodigd. Een water- en stoffenbalans is echter niet beschikbaar. Dit is een belangrijke leemte in kennis. De beoordeling vindt daarom plaats aan de hand van:

- een kwalitatieve beoordeling over de ontwikkeling van de nutriëntengehaltes op basis van de verandering van de nutriëntenbelastingen. Hierbij zullen functiewijziging van landbouw naar natuur en afplaggen relatief de grootste bijdrage leveren aan een verandering van de belasting. Bij de beschrijving van de effecten wordt hier dan ook de meeste aandacht aan besteed;
- op basis van een vergelijking van metingen in huidige landbouwgebieden en natuurgebieden.

nulmeting

De ecologische waterkwaliteit in de huidige situatie is beoordeeld met de maatlatten van de Kaderrichtlijn Water. Hieruit komt naar voren dat de ecologische toestand in het waterlichaam Stolwijk 'ontoereikend' is. Dit is een gevolg van de beoordeling op de macrofytenmaatlat (waterplantenmaatlat). Op de vissenmaatlat wordt het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) behaald. Uit de toetsingsresultaten voor het waterlichaam Waterrijk Berkenwoude komt naar voren dat de ecologische toestand van dit waterlichaam wordt beoordeeld als 'matig'. Dit komt door de beoordeling op de macrofyten- en macrofauna-maatlat. Op de vissenmaatlat wordt het GEP behaald. De ecologische toestand van het waterlichaam Bergambacht wordt beoordeeld als 'ontoereikend'. Op de vissenmaatlat behaalt dit waterlichaam het GEP [hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2007c].

tabel 5.6. Ecologische beoordeling waterlichamen in plangebied (HHSK, 2007c)

waterlichaam	macrofyten	macrofauna	vissen	oordeel
Stolwijk	ontorekend	matig	GEP	ontorekend
Berkenwoude	matig	matig	GEP	matig
Bergambacht	ontorekend	matig	GEP	ontorekend

Voor de chemische waterkwaliteit worden de chemische grondwaterkwaliteit en de chemische oppervlaktewaterkwaliteit beschouwd. Het grondwater is chloride arm (zoet), matig hard water met daarin nog diverse ionen (calcium, bicarbonaat en sulfaat) en anionen [Den Held, 1990]. De kwaliteit is constant over de diepte. Dit houdt in dat regenwater relatief snel verandert van karakter. De aanwezigheid van sulfaat wordt veroorzaakt door bemestingsinvloeden of door de afbraak van organische stoffen (veenoxidatie). Hetzelfde geldt voor relatief hoge meetwaarden van stikstof en fosfaat. Regenwater kan lokaal invloed hebben op het grondwater. Bijvoorbeeld in niet vergraven bodems met hoge en weinig fluctuerende grondwaterstanden [Den Held, 1990].

De invloed van het oppervlaktewater op de waterkwaliteit van het grondwater is beperkt tot een zeer smalle strook (enkele meters) langs de watergangen. Omgekeerd is de invloed van grondwater op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater groter. Dit blijkt uit de overeenkomst van de oppervlaktewaterkwaliteit met de grondwaterkwaliteit in de winter.

Van de chemische oppervlaktewaterkwaliteit zijn meetgegevens beschikbaar. De meetwaarden van een aantal algemene stoffen en parameters zijn samengevat in tabel 5.7 en getoetst aan de MTR-normen⁴. Het gemiddelde stikstofgehalte is 3,3 mg/l en ligt boven de MTR-norm. Dit geldt ook voor het fosfaatgehalte. Het gemiddelde zuurstofgehalte voldoet ook niet aan de MTR-norm en het doorzicht is onvoldoende. De norm wordt voor enkele zware metalen overschreden, echter dit vormt geen belemmering voor een gezonde ecologische toestand (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2007b). Op de maatlat voor de algemene fysische kwaliteitselementen scoort de Krimpenerwaard op fosfaat en zuurstofhuishouding 'ontorekend'. De KRW-lichamen moeten in plaats van aan de MTR voldoen aan de GEP-normen. Voor de drie waterlichamen in het project gebied is dat bijvoorbeeld voor stikstof en fosfaat respectievelijk 2,4 en 0,22 mg/l.

tabel 5.7. Algemene stoffen en parameters van hoofdwatgangen en sloten (HHSK, 2007a)

	N-totaal (mg/l)	P-totaal (mg/l)	Chlorofyl-a (ug/l)	Cl (mg/l)	SO ₄ (mg/l)	O ₂ (mg/l)	T (C)	pH (-)	doorzicht (m)
MTR-norm	2,2	0,15	100	200	100	5	25	6,5 - 9	0,4
sloten (n=23)									
gemiddeld	3,3	1,1	50	83	93	2,2	20	7,8	0,25
% voldoet	10	0	95	100	65	0	100	100	20
hoofdwatgang (n=17)									
gemiddeld	2,8	0,9	40	77	85	2,6	21	7,8	0,46
% voldoet	20	0	100	100	75	0	100	100	80

In tabel 5.7 staan gemiddelde nutriëntenconcentraties van sloten. Per type sloot kan deze waarde echter vrij sterk van het gemiddelde afwijken. Dit blijkt uit tabel 5.8. Daarin wordt een vergelijking gemaakt van meetwaarden van enkele bestaande landbouwsloten en enkele sloten in natuurgebied Nooitgedacht met de waarden van het inlaatwater uit de Lek. Uit de tabel blijkt dat stikstof en fosfaat in de huidige landbouwsloten niet voldoen aan zowel de MTR- als GEP-normen. De metingen van sloten in natuurgebieden laten een heel ander beeld zien: zowel stikstof en fosfaat voldoen aan de beide normen, met name de fosfaatgehalten zijn daar laag.

⁴ Maximaal Toelaatbaar Risico, norm geïntroduceerd in het Vierde Nationaal Waterplan.

tabel 5.8. Vergelijking van bestaande meetwaarden voor landbouwsloten, sloten in natuurgebied en Lekwater

	N-totaal (mg N/l)	P-totaal (mg P/l)	Sulfaat (mg/l)
landbouwsloten	3,62	1,49	46,84
sloten natuurgebied Nooitgedacht			
- weidevogelgebied	2,25	0,07	20,50
- botanisch grasland	2,37	0,07	13,65
- plagproef	2,13	0,05	20,00
Lek	2,67	0,13	64,03

[Bron: diverse bronnen].

nulalternatief

In het nulalternatief worden alleen de percelen die in eigendom zijn of komen van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap veranderd in natuur. Dit betreft 35 % van het plangebied. Van deze 35 % krijgt 40 % (in totaal 14 % van het plangebied) een peil afgestemd op de natuur.

De bronnen voor nutriënten blijven voor een belangrijk deel bestaan in het nulalternatief. Het grootste deel van het plangebied (65 %) blijft landbouwgebied. In deze gebieden zijn vermessing en mineralisatie de voornaamste bronnen voor nutriënten. De vermessing wordt wel beïnvloed door de in 2006 ingevoerde Meststoffenwet. In de Meststoffenwet is een indicatief traject vastgelegd voor aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen zodat in 2015 evenwichtsbemesting wordt bereikt. Het verwachte milieueffect van fosfaatevenwichtsbemesting is dat tot 2027 de kwaliteit van het dominant door landbouw belast oppervlaktewater niet verslechtert, maar tot 2027 verbetert de oppervlaktewaterkwaliteit ook nauwelijks. Voor stikstof wordt in de Meststoffenwet gestreefd naar het halen van de Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn stelt een norm voor nitraat van 50 mg/l in het bovenste grondwater. In de periode 2006-2009 worden de stikstofgebruiksnormen met 10 % verlaagd. Volgens Hooijboer et al. (2007) voldoen veenregio's al in 2005 aan deze norm. Een verdere verlaging van de stikstofgebruiksnorm voor veengronden is daarmee niet nodig [MNP, 2007]. De Meststoffenwet voorkomt een toename van de uitspoeling van nutriënten. De belasting vanuit deze bron blijft constant.

De bodemdaling in het nulalternatief verschilt niet significant met de bodemdaling in de huidige situatie. De mate van veenoxidatie blijft in het nulalternatief constant en daardoor blijft mineralisatie een constante bron voor nutriënten. De nutriëntenbelasting vanuit deze bron neemt niet af. Het overige deel van het plangebied (35 %) wordt natuur. In deze delen neemt de vermessing af. Echter door nalevering van stikstof en fosfaat vanuit de bodem blijven de percelen een bron van nutriënten. Deze zal op termijn afnemen, de snelheid en mate waarin dat gebeurt kan echter niet worden gekwantificeerd. Omdat stikstof relatief eenvoudig uitspoelt of via de lucht verdwijnt uit het systeem, zal de stikstofbelasting sneller afnemen dan de fosfaatbelasting.

Een beperkt deel van de natuur (40 %) in het plangebied (in totaal 14 % van het plangebied) krijgt een peil afgestemd op de natuur (verhoogd peil). In deze peilgebieden mag de waterstand 15 cm wegzakken in de zomer. Hierdoor hoeft er in de zomer minder water ingelaten te worden om de waterstand op peil te houden. Hierdoor wordt de nutriëntenbelasting door de waterinlaat verminderd. Ecologisch gezien is dit een positief effect, maar op de KRW-normen, die niet uitgaan van belasting maar van concentraties, kan dit echter een negatief effect hebben, omdat het Lekwater lagere nutriëntenconcentraties bevat dan het polderwater in landbouwgebied. Verdunning van polderwater met aangevoerd Lekwater geeft dus enerzijds lagere concentraties maar anderzijds hogere belasting van het plangebied met nutriënten.

Omdat vernatting niet plaatsvindt in het fosfaat verzadigde bodemprofiel treedt geen aanvullende nalevering van fosfaat vanuit de bodem op.

Bovendien wordt door het natuurlijke peilverloop, waarbij onder aërobe omstandigheden bij laag peil weer bindingsmogelijkheden voor fosfaat ontstaan, de uitspoeling van fosfaat beperkt. Mogelijk gaat het meest geïsoleerde deel van de 14 % van het plangebied met natuurlijk peilverloop min of meer lijken op de natuurgebieden bij eendenkooi Nooitgedacht. Ook dit betreffen geïsoleerde natuurgebieden met een eigen peil binnen landbouwgebied. Dit betekent dat minder dan 10 % van het plangebied naar verwachting zal voldoen aan de GEP-normen.

De overige gebieden krijgen een gemengde waterkwaliteit en zullen door de invloed van de landbouw niet kunnen voldoen aan de GEP-normen.

Door het nemen van maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water is in 2027 het oordeel op basis van de maatlatten van de Kaderrichtlijn Water voor Stolwijk en Bergambacht verbeterd van 'ontoereikend' in de huidige situatie naar 'matig'. In deze waterlichamen wordt de vismigratie van en naar het hoofdsysteem bevorderd en via stimuleringsmaatregelen wordt getracht de mestgift te verkleinen en het aantal natuurvriendelijke oevers uit te breiden en beter te beheren. Naast de stimuleringsmaatregelen, zoals toegepast in de waterlichamen Stolwijk en Bergambacht, wordt natuurvriendelijk onderhoud gepleegd [hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2008]. Ondanks dat verbetert het oordeel voor Waterrijk Berkenwoude in 2027 ten opzichte van 2008 niet en blijft 'matig'. Om het oordeel van alle drie de waterlichamen te verbeteren van 'matig' naar 'goed' dient de belasting vanuit de landbouw verminderd te worden [hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2008].

tabel 5.9. Beoordeling waterlichamen in plangebied [HHSK, 2008]

waterlichaam	oordeel in 2008	oordeel in 2015	oordeel in 2027
Stolwijk	ontoereikend	ontoereikend	matig
Waterrijk Berkenwoude	matig	matig	matig
Bergambacht	ontoereikend	ontoereikend	matig

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' wordt in het gehele plangebied de landbouwgebieden omgevormd naar natuurgebieden. Voor circa 600 hectare wordt in dit alternatief voorafgaand aan het inrichten van de natuurgebieden de fosfaatrijke bovenlaag verwijderd door de bodem af te plagen waardoor fosfaat niet meer kan vrijkomen bij vernatting. In de natuurgebieden wordt een op natuur afgestemd peil ingesteld met een natuurlijk peilverloop.

Daarnaast zal worden gezorgd voor inlaat van water van een goede kwaliteit wat niet vermengd zal worden met water uit agrarische gebieden.

De nutriëntenbelasting door het inlaten van water wordt verder verminderd door het laten wegzakken van de waterstand in de zomer. Dit zorgt voor een afname van de hoeveelheid ingelaten (rivier)water van 800.000 m³ (zie tabel 5.5).

Door het omzetten van landbouwgebieden naar natuurgebieden neemt de uitspoeling van stikstof en fosfaat af. Bovendien zal in een deel van het plangebied voorafgaand aan de peilopzet de bodem worden afgeplagd, waarmee het door de bodem gebonden fosfaat wordt verwijderd. Deze gebieden kunnen naar verwachting worden vergeleken met gebieden in polder Nooitgedacht waarin een plagproef is uitgevoerd. In dat gebied is 25 cm van de toplaag afgegraven met als doel het verwijderen van de voedselrijke toplaag en het verhogen van de grondwaterstand (door het maaiveld naar het grondwater te brengen) en met het doel om daarmee een goede uitgangssconditie te creëren voor nat schraalland en/of moerasvegetatie. Deze maatregel bleek erg succesvol te zijn. Het geplagde perceel heeft nu veruit de grootste soortenrijkdom van het hele gebied [Van der Welle et al., 2007].

In de overige gebieden zal het natuurlijk peilverloop er voor zorgen dat minder fosfaat zal worden nageleverd dan zonder natuurlijk peilverloop, door binding van fosfaat bij laag peil (vergelijkbaar met de natuurgebieden in het nulalternatief).

De 3 subalternatieven verschillen alleen in de wijze waarop de gewenste drooglegging zal worden bereikt. In de inleiding bij deze paragraaf is gemotiveerd dat het verkleinen van de drooglegging niet of nauwelijks leidt tot een andere vochttoestand in de met fosfaat verrijkte bodemlaag (de bovenste 40 cm) en dus niet tot een verandering van de fosfaatsniveaus. Omdat de drooglegging hierop geen effect heeft, heeft ook de wijze waarop de gewenste drooglegging wordt bereikt, hier geen effect op. Er worden daarom geen verschillen tussen de drie subalternatieven verwacht.

inlaat van Lekwater en de toepassing van helofytenfilters

In het kader van het watergebedsplan voor de Krimpenerwaard is onderzoek gedaan naar de wateraanvoer en waterzuivering ten behoeve van natuur in de Krimpenerwaard. De conclusies worden opgenomen in het watergebedsplan en het integraal inrichtingsplan. De belangrijkste conclusies zijn:

- het Lekwater heeft een dermate goede kwaliteit dat het helofytenfilter in het zuiden van de Krimpenerwaard (polder Den Hoek) niet noodzakelijk is. In het Watergebedsplan en het Integraal Inrichtingsplan zal dit verder onderbouwd worden;
- voor het noordelijke deel van het natuurgebied zal worden ingezet op een waterstaatkundige maatregel nabij Schoonhoven waardoor in periodes van droogte Lekwater ingelaten kan worden in het gebied net ten zuiden van Haastrecht. Daardoor is ook daar een helofytenfilter niet noodzakelijk.

De verandering van de nutriëntenbelasting vanuit de verschillende bronnen verandert voor de subalternatieven in dezelfde mate. Hierdoor is er geen verschil in de beoordeling van de subalternatieven. Zowel voor stikstof als fosfaat nemen de nutriëntenbelastingen sterk af.

In het nulalternatief wordt voor alle drie de huidige waterlichamen de beoordeling 'matig' op de maatlaten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verwacht. Een verbetering van deze beoordeling is alleen mogelijk door de mestgift te verkleinen [hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2008]. Door landbouwgrond om te zetten in natuurgebieden wordt de mestgift gereduceerd tot nul en daarmee is een verbetering van de beoordeling op de maatlat van de KRW mogelijk. In de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' wordt het watersysteem zodanig aangepast dat er nieuwe waterlichamen 'ontstaan': alle peilgebieden van 250 hectare en groter met minimaal 20 % open water zullen als waterlichaam worden aangewezen. In het plangebied liggen alleen nog nieuwe waterlichamen met alleen de functie natuur. Door de lage nutriëntenbelasting en door de optimale ecologische inrichting kan hier het KRW-doel 'goed ecologisch potentieel' worden gehaald.

In de 'oude' waterlichamen blijft het doelbereik voor de KRW hetzelfde als in het nulalternatief (matig), omdat in het nulalternatief het grondgebruik ook overwegend agrarisch is.

alternatief 'Groeidend Veen'

In het alternatief 'Groeidend Veen' worden in het gehele plangebied de landbouwgebieden tot natuurgebieden omgevormd en de peilen opgezet voor het realiseren van een drooglegging van 15 cm. De waterstand mag in de zomer niet wegzakken. Ook in dit alternatief zal worden gezorgd voor inlaat van water van een goede kwaliteit wat niet vermengd zal worden met water uit agrarische gebieden. Dit zorgt voor een afname van de nutriëntenbelasting door het inlaatwater. Doordat het peil het hele jaar constant wordt gehouden neemt de hoeveelheid inlaatwater niet af in tegenstelling tot de subalternatieven van Grutto en Otter.

Het omzetten van landbouwgebieden naar natuurgebied leidt tot een afname van de uitspoeling van nutriënten. Omdat er in dit alternatief niet wordt geplagd en geen natuurlijk peilverloop wordt ingesteld, zal de uitspoeling minder afnemen dan in het alternatief Grutto en Otter.

De drooglegging van 15 cm zorgt voor een afname van veenoxidatie en daarmee tot een verkleining van mineralisatie als bron voor nutriënten. Aangezien de bodemdaling door veenoxidatie met 70 % afgenomen is, is de mineralisatie met een zelfde percentage afgenomen.

De beoordeling van de drie waterlichamen in het nulalternatief is 'matig'. Doordat in dit alternatief de belasting van fosfaat naar verwachting licht zal afnemen, kan een lichte verbetering verwacht worden van de waterkwaliteit. De beoordeling zal echter 'matig' blijven.

conclusie

In het nulalternatief wordt een lichte afname verwacht van de nutriëntenbelasting voor stikstof en fosfaat. Hierdoor wordt verwacht dat het stikstof- en fosfaatgehalte licht zal afnemen. Daarom wordt het terugdringen van vermessing in het nulalternatief als licht positief (0/+) beoordeeld. In de voorgenomen activiteit wordt een sterke afname van de nutriëntenbelasting voor stikstof en fosfaat verwacht door de afname van de mestgift en het afplaggen van een deel van het plangebied. Hierdoor zullen de stikstof- en fosfaatgehalten sterk afnemen. Er wordt geen verschil tussen de subalternatieven verwacht, omdat de wijze waarop de gewenste drooglegging wordt bereikt, geen effect heeft op de nutriëntenbelasting. Alle subalternatieven worden daarom als positief (+) beoordeeld. In het alternatief 'Groeierend Veen' wordt een afname van de nutriëntenbelasting en concentraties voor fosfaat en stikstof verwacht, maar in mindere mate dan in Grutto en Otter, omdat niet wordt afgeplagd en er een vast peil wordt ingesteld. Dit alternatief wordt daarom als licht positief (0/+) beoordeeld.

In het nulalternatief valt voor twee van de drie waterlichamen die deels vallen in het plangebied verbetering van de beoordeling te verwachten. Doordat de waterlichamen slechts deels in het plangebied liggen zal het effect van de verbeterde waterkwaliteit in de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' beperkt doorwerken op de chemische kwaliteit van de waterlichamen. Een verbetering van de beoordeling van één van de waterlichamen valt daardoor niet te verwachten. De waterkwaliteit in het alternatief 'Groeierend Veen' verbetert licht door de afname van de stikstof- en fosfaatbelasting. Hierdoor valt ook een lichte verbetering van de beoordeling van de waterlichamen ten opzichte van het nulalternatief te verwachten.

tabel 5.10. Effectentabel Waterkwaliteit

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
terugdringen vermessing	0	0	+	+	+	0/+
bereiken van KRW doelen	0	0/+	+	+	+	0/+

5.5. Conclusie bodem en water

Tabel 5.11 bevat de overzichtstabel voor het thema bodem en water. Uit de beoordeling blijkt dat voor het thema bodem duidelijke voorkeur uitgaat naar het alternatief 'Groeierend Veen'. Voor het thema bodem zijn de subalternatieven van 'Grutto en Otter' duidelijk verschillend, met een aflopende voorkeur van subalternatief 1 naar subalternatief 3.

In de tabel 5.11 zijn de beoordelingen van het robuuste watersysteem en waterkwaliteit op een kwalitatieve manier (expert oordeel) geaggregeerd tot één score voor het thema water. Voor het thema water gaat de voorkeur uit naar 'Grutto en Otter' boven 'Groeierend Veen', maar er is nauwelijks onderscheid te maken tussen de drie subalternatieven van 'Grutto en Otter'.

tabel 5.11. Overzichtstabel bodem en water

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	nulalternatief (auto- nome ontwikke- ling)	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'Directe rea- lisatie met peilfixatie'	subalternatief 2 'Directe realisa- tie, peil volgt maaiveldddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
beoordeling bodemdaling	0	0	+/++	+	0/+	++
beoordeling robuustheid wa- tersysteem	0	-	++	++	++	+
terugdringen vermesting	0	0	+	+	+	0/+
bereiken van KRW doelen	0	0/+	+	+	+	0/+
totaal beoordeling water	0	0	+/++	+/++	+/++	+

6. EFFECTEN OP NATUUR

6.1. Natuurkwaliteit

De natuurkwaliteit wordt kwalitatief beoordeeld aan de hand van een zestal beoordelingscriteria:

- diversiteit:
 - diversiteit aan inheemse planten- en diersoorten, de definitie van biodiversiteit zoals verwoord in het Handboek Natuurdoeltypen [Bal et al., 2001];
- zeldzaamheid:
 - zeldzaamheid van een natuurdoeltype in Nederland;
- kenmerkendheid:
 - passend bij het historische landschap (zoals het oorspronkelijk was aan het begin van vorige eeuw);
- natuurlijksheidsgraad:
 - we hanteren de definitie van Bal et al. (2001): 'Intensiteit van de menselijke beïnvloeding van natuurlijke processen in combinatie met de schaal daarvan'. De hoogste natuurlijksheidsgraad wordt gekenmerkt door afwezigheid van menselijke beïnvloeding op grote schaal. Fysische, chemische en biologische processen kunnen onbelemmerd plaatsvinden. Zo ontstaan robuuste, waardevolle ecosystemen zoals de Waddenzee of een hoogveenlandschap die waardevol zijn voor het behoud van de biodiversiteit. De laagste natuurlijksheidsgraad wordt gekenmerkt door natuur met intensieve en gedetailleerde menselijke beïnvloeding. Diverse vormen van beheer (maaibeheer, peilbeheer, bemesting, etc.) drukken hun stempel op de natuur. De afhankelijkheid van menselijke ingrepen maakt deze ecosystemen kwetsbaar, bijvoorbeeld voor klimaatverandering. Een hoge natuurlijksheidsgraad is daarom vanuit het oogpunt van robuustheid, duurzaamheid en instandhouding van de biodiversiteit te prefereren boven een systeem dat kunstmatig met beheer in stand gehouden dient te worden;
- ecologische samenhang:
 - ruimtelijke samenhang in het plangebied of met andere natuurgebieden;
- omvang en levensvatbaarheid van populaties van te beschermen soorten:
 - grootte van een populatie en kans van de populatie om zich te ontwikkelen en gedurende een langere periode in leven te blijven, met inachtneming van diverse risicofactoren zoals strenge winters en lokale fluctuaties in leefgebieden (niet klimaatverandering).

nulmeting

In de ecohydrologische systeemanalyse (bijlage 4) wordt de huidige natuur (aquatisch en terrestisch) beschreven. Hieruit blijkt dat de Krimpenerwaard vanouds (begin vorige eeuw) vooral bestond uit soortenrijke schraallanden. In de loop van de tijd zijn deze door cultuurdruk (peilverlaging, bemesting, lozing van riolering) veranderd in soortenarme, voedselrijke weilanden. Ook de huidige soortenarme watervegetatie wijst op een hoge voedselrijkdom. Kroos en algen domineren in veel sloten en de hoeveelheid krabbenscheer, een indicatorplant voor een goede waterkwaliteit, neemt af. De ecologische toestand is hierdoor 'ontoereikend' tot 'matig' volgens de maatlatten van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Agrarische weidevogelgraslanden, bosjes, eendenkooien, waterparels en voormalige boezems zijn nu de belangrijkste gebieden met actuele natuurwaarden in de Krimpenerwaard. Deze liggen deels in bestaande natuurgebieden (afbeelding 6.1). In enkele van deze natuurgebieden komen schraalland- en moerasvegetaties voor. Het totale natuuroppervlak dat ook daadwerkelijk in het plangebied ligt bedraagt daarmee 19 ha van het plangebied. Daarnaast zijn sinds 1999 verschillende delen van het plangebied ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling. Dit betreft de Berkenwoudse Driehoek (120 ha) en natte natuur in polder Den Hoek (60 ha). Het areaal bestaande natuur bedraagt daarmee circa 200 ha.

Van belang is ook de fauna in het gebied, met name de weide-, moeras- en watervogels, zoals de grutto, zomertaling en zwarte stern. Deze komen in zowel de natuur- als de landbouwgebieden voor. In het plangebied bevinden zich landbouwgebieden met hoge weidevogelwaarden (afbeelding 6.1).

Door de openheid en de rust is het plangebied ook belangrijk voor wintergasten (doortrekkende en overwinterende vogels).

De natuurlijksheidsgraad is over het geheel van het plangebied genomen laag. Zoals al gezegd is de menselijke beïnvloeding in het agrarische gebied (peilbeheer, maaibeheer, bemesting, uitbaggeren van sloten, etc.) dermate hoog dat de oorspronkelijke natuur in kwaliteit is achteruitgegaan. In de natuurgebieden speelt dit minder een rol door een op de natuur aangepast maaibeheer en waar mogelijk ook een aangepast peilbeheer.

De afstand tussen de diverse natuurgebieden is voor diverse flora- en faunasoorten te groot om te overbruggen. Een aantal natuurgebieden zijn wel deels met elkaar verbonden door smalle, natuurlijke verbindingen. Voor veel soorten is dit echter niet genoeg om zich door het plangebied te kunnen verplaatsen.


Door het ontbreken van voldoende en juist ingerichte natuurlijke verbindingzones tussen zowel gebieden binnen als buiten de Krimpenervaard en door de aanwezigheid van diverse barrières (wegen, watergangen, stuwtjes, bebouwingslinten) is de ecologische samenhang onvoldoende.

Het areaal natuur in het plangebied is relatief klein. Knelpunt is de hoge cultuurdruk en het ontbreken van de ecologische samenhang tussen de natuurgebieden in het plangebied en tussen het plangebied en gebieden buiten de Krimpenervaard. Dit gaat de natuurlijke ontwikkeling van natuur en de uitwisseling van flora- en faunasoorten tegen, wat niet bevorderlijk is voor de levensvatbaarheid van populaties.

Samenvattend geldt voor de beoordelingscriteria:

- diversiteit:
 - laag ten opzichte van de situatie aan het begin van de vorige eeuw;
- zeldzaamheid:
 - laag ten opzichte van de situatie aan het begin van de vorige eeuw;
- kenmerkendheid:
 - niet passend bij het oorspronkelijke landschap; het landschap aan het begin van vorige eeuw;
- natuurlijksheidsgraad:
 - laag ten opzichte van de situatie aan het begin van de vorige eeuw;
- ecologische samenhang:
 - onvoldoende;
- omvang en levensvatbaarheid van populaties:
 - laag ten opzichte van de situatie aan het begin van de vorige eeuw.

afbeelding 6.1. Bestaande natuurgebieden en agrarische gebieden met hoge weidevogelwaarden in het plangebied



Legenda

- Plangebied
- Bestaande natuur
- Weidevogelgebied in plangebied
- Provinciale wegen
- Hoofdwatergangen

InrichtingsMER Krimpenerwaard

Natuur in autonome ontwikkeling

schaal: 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 km

projectcode: GV774-5
 versie: definitief
 datum: 09-06-2009
 getekend: B. de Jong
 gecontroleerd: L. Turlings
 goedgekeurd: L. Turlings

Witteveen **Bos**

nulalternatief

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zal het areaal natuur in de autonome situatie alleen toenemen op percelen die in eigendom zijn van de stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Dit wordt geschat op 35 % van het plangebied (circa 875 ha). Voor de ontwikkeling van natuurdoelen zal men zoeken naar kenmerkende natuurdoeltypen voor het gebied. Dit gebeurt nu ook al, waarbij vooral te denken valt aan botanisch en weidevogel grasland. De toename van het areaal natuur is gunstig voor de ecologische samenhang. Met name voor flora- en faunasoorten die in staat zijn relatief grote afstanden te overbruggen zoals vogels en de wat grotere zoogdieren (otter, bever). Dit is tevens gunstig voor de levensvatbaarheid van populaties van te beschermen soorten. De natuurgebieden zullen echter versnipperd over het gehele plangebied gelegen zijn.

Naast de omvorming van agrarisch gebied naar natuur zal de natuurkwaliteit in de natuurgebieden verbeteren door een aantal inrichtingsmaatregelen:

- in 40 % van de natuurgebieden (14 % van het plangebied) stelt men afzonderlijke peilvakken in waardoor de peilen beter zijn af te stemmen op de natuurdoelen;
- door deze peilvakken neemt ook de invloed van het nutriëntenrijke water uit de agrarisch gebieden af;
- in de Krimpenervaard is ervaring opgedaan met plaggen voor het verschrallen van de bodem en begreppelen voor het tegengaan van verzuring door neerslag. Ook het toepassen van deze inrichtingsmaatregelen komt ten goede aan de natuurkwaliteit.

In het agrarische deel van het plangebied kan de natuurkwaliteit verbeteren door mestwetgeving, toenemende waterkwaliteit en eventueel een toename van agrarisch natuurbeheer.

Licht negatief is de toename van de verstoring door recreanten en verkeer. Maar bij de juiste zonering weegt dit niet op tegen de positieve doorwerking van bovenstaande processen en maatregelen. Ten opzichte van de nulmeting wordt daarom in het nulalternatief een lichte verbetering verwacht van alle beoordelingscriteria:

- | | |
|--|-------------------|
| - diversiteit | : lichte toename; |
| - zeldzaamheid | : lichte toename; |
| - kenmerkendheid | : lichte toename; |
| - natuurlijkheidsgraad | : lichte toename; |
| - ecologische samenhang | : lichte toename; |
| - omvang en levensvatbaarheid van populaties | : lichte toename. |

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

De voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3. In dit alternatief wordt het totale plangebied omgevormd tot natuur. Het natuurareaal neemt daardoor ten opzichte van de nulmeting flink toe. De natuurdoelen van dit alternatief zijn uitgewerkt in tabel 3.3. De arealen weidevogelgrasland liggen in dit alternatief op de locaties waar, in de huidige situatie de hoogste weidevogelwaarden aangetroffen worden. In de huidige situatie komen echter in een groot deel van de Krimpenervaard weidevogels voor. Door de ontwikkeling van natte natuur en in mindere mate botanisch grasland wordt een deel van het plangebied minder geschikt voor weidevogels. Hier staat tegenover dat de 890 hectare weidevogelgrasland in het alternatief 'Grutto en Otter' optimaal voor weidevogels zal worden ingericht (drooglegging van 35 centimeter, bemesting met ruwe stalmest en begrazingsbeheer). Netto wordt hiervan een positief resultaat verwacht. Bovendien zullen de natte graslanden, die ontwikkeld worden binnen botanisch grasland en natte natuur, ook een positief effect hebben, met name op de meer kritische weidevogelsoorten.

In het natuurgebied worden diverse inrichtingsmaatregelen genomen gericht op het ontwikkelen van de natuurdoelen te weten: plaggen, vergraven, begreppelen, instellen dynamische peilen, instellen aparte peilvakken en vergroten peilvakken.

In de Visie op het natuurgebied (Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a) worden de natuurdoelen gekoppeld aan natuurdoeltypen uit het handboek natuurdoeltypen [Bal et al., 2001; zie tabel 6.1]. In het handboek staan per natuurdoeltype ook de omvangklassen aangegeven van zeer gering tot groot (1-100.000 ha). Dit is gebruikt als mate van zeldzaamheid.

Het meest zeldzaam is botanisch grasland, gevolgd door respectievelijk weidevogelgrasland en natte natuurnatuur (met uitzondering van trilveen en laagveenbos die wel zeldzamer zijn).

De potenties voor een natuurdoeltype hangen af van de abiotische omstandigheden, de inrichtingsmaatregelen en het beheer. De algemene lijn is dat de meest zeldzame natuurdoeltypen ook het lastigste zijn om te ontwikkelen. In de ecohydrologische systeemanalyse (bijlage 4) is onderzocht in hoeverre de natuurdoeltypen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen komen met in achtname van de diverse inrichtingsmaatregelen. De kans op een kwalitatief goede ontwikkeling van de natuurdoelen is onder subalternatief 2 het hoogst, omdat de peilen hier overeenkomen met de eisen van de natuurdoeltypen. In subalternatief 3 (het ingroeimodel) wordt op termijn ook de gewenste drooglegging gerealiseerd, maar deze gewenste situatie zal pas na enige tijd worden bereikt. Een kwalitatief goede ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen zal daardoor ook langer duren.

Het plangebied is van oorsprong homogeen. Door de inrichtingsmaatregelen wordt de heterogeniteit in het gebied bevorderd wat positief doorwerkt in de diversiteit van de natuur. Uit paragraaf 6.2 blijkt dat de Groene Ruggengraat onder de voorgenomen activiteit ook daadwerkelijk kan functioneren als een robuuste verbindingzone voor diverse flora- en faunadoelsoorten als in het inrichtingsplan wordt voldaan aan de daarvoor geldende eisen. Dit is gunstig voor de ecologische samenhang, zowel binnen het plangebied als met de omgeving. Ten opzichte van de nulmeting wordt een sterke verbetering verwacht van alle beoordelingscriteria. Deze zullen goed tot zeer goed scoren. Omdat subalternatief 2 optimaal is voor de ontwikkeling van de natuurdoelen, zal deze ook het hoogste scoren. Dit geldt echter niet voor de natuurlijkheidsgraad. Door de hogere peilen in subalternatief 1 is beheer daar minder mogelijk. Dit komt ten goede aan de natuurlijkheidsgraad. Subalternatief 3 scoort, ondanks een naar verwachting lagere fosfaataflevering, minder goed dan subalternatief 2 door de vertraging in de realisatie van natuurdoelen als gevolg van het later in de tijd realiseren van de gewenste drooglegging.

tabel 6.1. Natuurdoelen en de bijbehorende natuurdoeltypen [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a] met hun omvang in Nederland [Bal et al, 2001]

natuurdoel	natuurdoeltype	omvang*
moerasnatuur	3.14a gebufferde poel	vrij groot
	3.15 gebufferde sloot	vrij groot, maar slechts 5-10 % goed ontwikkeld
	3.19 kanaal en vaart	gering en beperkt deel goed ontwikkeld
	3.24 moeras	vrij groot
	3.25 natte strooiselruigte	vrij groot
	3.27 trilveen	zeer gering
	3.28 veenmosrietland	vrij gering
	3.55 wilgenstruweel	vrij groot
	3.62 laagveenbos	zeer-vrij gering
nat schraalland	3.29 nat schraalgrasland	gering (blauwgrasland)
	3.31 dotterbloemgrasland van veen en klei	vrij gering
weidevogelgrasland	3.38 bloemrijk grasland van het zand en veengebied	vrij gering-groot
	3.32 nat, matig voedselrijk (weidevogel)grasland	gering-vrij groot

* Zeer gering 1-10 ha, gering 10-100 ha, vrij gering 100-1000 ha, vrij groot 1000-10.000 ha.

* Groot 10.000-100.000 ha.

alternatief 'Groeidend Veen'

Ook in dit alternatief neemt het natuurareaal toe tot 100 % van het plangebied. De natuurdoelen van dit alternatief zijn uitgewerkt in tabel 3.4. Door het omvormen van agrarisch gebied naar natuur zal de natuurkwaliteit ten opzichte van de nulmeting toenemen. Ten opzichte van de nulmeting zijn er wel verschillen aan te wijzen tussen dit alternatief en de voorgenomen activiteit. Zo neemt in vergelijking met de voorgenomen activiteit het areaal botanisch en weidevogelgrasland af en de natte natuur toe. Met behulp van tabel 6.1 vertaalt zich dat in een toename van minder zeldzame natuur ten koste van meer zeldzame natuur. Daarnaast past de combinatie van natuurdoelen (relatief veel natte natuur in plaats van (soortenrijke) graslanden) minder bij de landschappelijke kenmerkendheid.

Omdat dit alternatief geheel gericht is op het tegengaan van bodemdaling voert men inrichtingsmaatregelen als dynamisch peilbeheer, plaggen of het toepassen van begreppeling niet uit (hoofdstuk 3). Zoals in de ecohydrologische systeemanalyse is aangetoond, voldoet hierdoor de trofiegraad (voedselrijkdom) niet aan de eisen van de natuurdoeltypen (bijlage 4). In veel gevallen levert dit in plaats van de gestelde natuurdoelen (bijvoorbeeld botanisch grasland) een niet gewenste, soortenarme en niet zeldzame vegetatie op, vaak gedomineerd door pitrus. Daarnaast bestaat de kans op eutrofiëringproblemen in het oppervlaktewater door de uitspoeling van fosfaat. Dit komt met name de diversiteit, kenmerkendheid en zeldzaamheid van de natuur niet ten goede.

Diversiteit wordt nog beïnvloed door plaggen en vergraven. Door het niet toepassen van deze inrichtingsmaatregelen zal de diversiteit in het plangebied niet toenemen. Er ontstaan minder verschillen in maaiveldhoogte en grondwaterstanden. Dit uit zich in een meer homogeen landschap met een lagere biodiversiteit ten opzichte van de nulmeting dan in de voorgenomen activiteit.

Tenslotte is er onder dit alternatief minder beheer mogelijk. De hoge grondwaterstanden maken het grote delen van het jaar moeilijk om met groot materiaal het gebied in te gaan. Dit is gunstig voor de natuurlijkeheidsgraad. De menselijke beïnvloeding neemt namelijk af.

Netto zal het alternatief Groeiend Veen op het thema Natuurkwaliteit minder positief scoren ten opzichte van de nulmeting dan de voorgenomen activiteit.

conclusie

In tabel 6.2 staan de beoordelingen van de alternatieven naast elkaar. Ten opzichte van de nulmeting nemen alle beoordelingscriteria in het nulalternatief licht toe. Het totaaloordeel is dan ook een beoordeeld met een '0/+'.

Alle beoordelingscriteria van de voorgenomen activiteit scoren ten opzichte van de nulmeting positief. De natuurkwaliteit verbetert door de inrichting van het gebied. Met name onder subalternatief 2 waarin de peilen optimaal afgestemd zijn op de natuurdoelen en de Groene Ruggengraat optimaal kan functioneren als robuuste verbindingszone. Subalternatief 1 zal op termijn steeds meer gaan lijken op het alternatief 'Groeidend Veen' en wordt daarom minder positief beoordeeld. Subalternatief 3 scoort minder goed dan subalternatief 2 door de vertraging in de realisatie van natuurdoelen als gevolg van het later in de tijd realiseren van de gewenste drooglegging. De natuurlijkeheidsgraad is gekoppeld aan de toepassing van (maai)beheer. Hoe natter een alternatief, hoe minder toegankelijk de natuur, hoe minder de invloed van (maai)beheer. Daarmee neemt de natuurlijkeheidsgraad toe.

Het effect op de natuurkwaliteit van alternatief 'Groeidend Veen' is ten opzichte van de nulmeting positief, maar minder positief dan onder de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'. Met name de hoge trofiegraad voorkomt het behalen van de gestelde natuurdoelen waardoor alle beoordelingscriteria met uitzondering van natuurlijkeheidsgraad minder hoog scoren. De toename van de natuurlijkeheidsgraad zal die afname echter niet compenseren. Het totaaloordeel is dan ook een '+'.

tabel 6.2. Effectentabel Natuurkwaliteit

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveldddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
maximalisatie van natuurkwaliteit ten aanzien van:						
- diversiteit	0	0/+	+/++	++	+/++	+
- zeldzaamheid	0	0/+	+/++	++	+/++	+
- kenmerkendheid	0	0/+	+/++	++	+/++	+
- natuurlijkheidsgraad	0	0/+	++	+	+/++	++
- ecologische samenhang (onder andere met Zuidplaspolder)	0	0/+	+/++	++	+/++	+
- omvang en levensvatbaarheid van populaties van te beschermen soorten	0	0/+	+/++	++	+/++	+
totaal oordeel	0	0/+	+/++	++	+/++	+

6.2. Realisatie Groene Ruggengraat

De nieuwe natuur in het plangebied gaat deel uitmaken van de robuuste ecologische verbinding tussen het Lauwersmeer en de Zeeuwse/Zuid-Hollandse Delta. Deze verbinding is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en is opgenomen in de nota ruimte. De provincies dienen deze verbinding te realiseren. Het doel is een vrije uitwisseling van flora en fauna tussen het Lauwersmeer en de Delta.

Een robuuste verbinding is opgebouwd uit diverse onderdelen. Voor het gemak kan men de robuuste verbinding voorstellen als een ketting bestaande uit knopen en schakels. Een knoop is dan een groter leefgebied. De schakels zijn de migratieverbindingen tussen deze knopen. In dit MER is als uitgangspunt gehanteerd dat de Groene Ruggengraat door de Krimpenerwaard functioneert als voldaan wordt aan de richtlijnen uit het Handboek Robuuste Verbindingen [LNV, 2001; Alterra, 2005]. Deze richtlijnen verschillen per ecosysteemtype. De robuuste Groene Ruggengraat moet voldoen aan een combinatie van de ecosysteemtypen 'Grasland met klein water' en 'Moeras, struweel en groot water' [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007]. De minimale breedte van een robuuste verbinding gecombineerd voor deze twee ecosysteemtypen bedraagt 200 m [Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard, 2007a]. In de Krimpenerwaard is een minimale breedte van 350 m gehanteerd. Bij deze ecosystemtypen horen specifieke natuurdoeltypen en doelsoorten (flora en fauna). De natuurdoeltypen zijn verwerkt in de natuurdoelen van de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeierend Veen' (zie tabel 6.1). Als de Groene Ruggengraat functioneert houdt dat in dat alle doelsoorten in de Groene Ruggengraat kunnen (over)leven en door de Groene Ruggengraat kunnen migreren.

De richtlijnen voor het goed functioneren van de robuuste Groene Ruggengraat in de Krimpenerwaard zijn uitgewerkt in bijlage 12 en hebben betrekking op:

- afstanden tussen knopen;
- oppervlakte en breedte van knopen en schakels;
- aanwezigheid van barrières als wegen of bebouwingslinten;
- aanwezigheid van specifieke natuurdoeltypen in de knopen en schakels;
- aanwezigheid van specifieke landschapselementen in de schakels;
- recreatief medegebruik.

De beoordelingscriteria worden aan de hand van deze kenmerken beoordeeld. De precieze inrichting van het gebied is nog onbekend, omdat het inrichtingsplan nog niet gereed is. De beoordeling kan daarom alleen kwalitatief uitgevoerd worden.

Verstoring door recreanten en verkeer komt in deze paragraaf zijdelings aan bod. Dit thema is in meer detail uitgewerkt als neveneffect in hoofdstuk 8.

nulmeting

In de nulmeting wordt niet aan de eisen van het handboek voldaan. Knelpunten zijn onder andere:

- het ontbreken van de juiste natuurdoeltypen;
- te grote afstanden tussen natuurgebieden;
- onvoldoende landschapselementen, zoals houtwallen en bosjes, voor schuilplaatsen en verspreidingsroutes;
- aanwezigheid van diverse soorten barrières (wegen, waterlopen, bebouwingslinten, stuwtjes, etc.);
- relatief hoge recreatiedruk.

nulalternatief

De knelpunten van de nulmeting zullen onder het nulalternatief onvoldoende verbeteren voor het goed functioneren van de Groene Ruggengraat, mede door de versnipperde ligging van de natuurgebieden. Voor soorten die zich makkelijk over grotere afstanden verspreiden (vogels en bepaalde zoogdieren) zal de ontwikkeling van nieuwe natuur positief uitwerken. Maar met name de kritische soorten (bepaalde vlinders, vissen en amfibieën), de soorten met een kleine overbruggingsafstand, moeten te grote afstanden afleggen om bij verderop gelegen natuurgebieden (leefgebieden) te komen. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat alle vereiste habitats voor overleving en vestiging van de doelsoorten goed tot ontwikkeling komen, omdat niet aan de abiotische randvoorwaarden (ontwatering en trofiegraad) wordt voldaan. Tenslotte bestaan er diverse barrières als provinciale wegen (N210 en N207), stuwtjes en bebouwingslinten en neemt de druk door recreatief medegebruik toe ten opzichte van de nulmeting. Dit is ongunstig voor het functioneren van de Groene Ruggengraat.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Bij de inrichting van Grutto en Otter en Groeiend Veen wordt ten aanzien van de Groene Ruggengraat rekening gehouden met de richtlijnen uit het Handboek Robuuste Verbindingen. De uitwerking van de Groene Ruggengraat op inrichtingsniveau conform deze richtlijnen vindt niet in dit MER plaats, maar in het kader van het Integraal Inrichtingsplan. Daarbij wordt het recreatieve medegebruik afgestemd op de natuurdoelstellingen.

De breedte van de Groene Ruggengraat in de Krimpenerwaard bedraagt 350 m. De begrenzing van de Groene Ruggengraat conform de plankaart (afbeelding 3.3) biedt hiervoor voldoende ruimte. Dit houdt in dat de Groene Ruggengraat in theorie binnen de begrenzing ook daadwerkelijk kan worden ingericht en kan functioneren als robuuste verbingszone. Bij de beoordeling is als uitgangspunt genomen dat in het Integraal Inrichtingsplan, binnen de begrenzing van de Groene Ruggengraat conform de plankaart, een inrichting zal worden vastgelegd die voldoet aan de richtlijnen van het Handboek Robuuste Verbindingen.

Binnen de Krimpenerwaard en aan de randen van de Krimpenerwaard is een aantal migratieknelpunten bekend. Voor een deel van deze knelpunten is reeds een oplossing uitgewerkt. Voor een ander deel kan op inrichtingsniveau een oplossing worden uitgewerkt. Tenslotte is voor een aantal migratieknelpunten, met name tussen de Krimpenerwaard en het buitengebied, nog geen concrete oplossing voorhanden. Concreet gaat het om de volgende knelpunten:

- knelpunten waarvoor reeds een oplossing of oplossingen zijn uitgewerkt:
 - kruising van de Groene Ruggengraat met de N210:
 - hiervoor is een oplossing uitgewerkt in de notitie 'Ecologische verbinding onder N210' [Ballast Nedam, 2008]. De aanleg van de passage is reeds vergund;

- kruising van de Groene Ruggengraat met de N207:
 - voor dit knelpunt is een voorgestelde ontwikkelingsinrichting uitgewerkt in de notitie 'Fauna-passage N207 Bilwijk-Het Beijersche, Schakel in robuuste ecologische verbindingszone Groene Ruggengraat' [Dienst Landelijk Gebied-Regio West, 2007]. Deze ontwikkelingsrichting dient als input voor het Integraal Inrichtingsplan, maar is nog niet vastgesteld en leidt ook nog niet tot een oplossing voor alle knelpunten;
- knelpunten waar nog geen concrete oplossingen voor zijn uitgewerkt, maar die in het kader van het Integraal Inrichtingsplan naar verwachting wel kunnen worden opgelost (ontwerpopgaven):
 - overbruggen van peilscheidingen, bijvoorbeeld door het realiseren van vispassages;
 - de passage van de Groene Ruggengraat door het Loetbos, bijvoorbeeld door de Loet integraal onderdeel te laten uitmaken van de Groene Ruggengraat;
- knelpunten waar nog geen oplossing voor voorhanden is:
 - primaire waterkering langs de Lek;
 - lintbebouwing;
 - beide knelpunten betreffen punten waar de Groene Ruggengraat de Krimpenervaard verlaat. Een oplossing voor deze knelpunten zal met name voor de matige en slechte verspreiders niet eenvoudig voorhanden zijn. Voor de goede verspreiders leveren beide knelpunten veel minder problemen op.

Voor het functioneren van de Groene Ruggengraat is het daarnaast de vraag in welke mate alle natuurdoeltypen die ontwikkeld moeten worden binnen de twee ecosysteemtypen, in goede kwaliteit tot ontwikkeling komen. Hierop is in paragraaf 6.1 reeds ingegaan. In subalternatief 2 is de kans op het bereiken van de benodigde natuurdoeltypen voor het goed functioneren van de Groene Ruggengraat het hoogst. De peilen en maatregelen (begreppeling, afplaggen) in dit subalternatief zijn optimaal afgestemd op de gewenste natuurdoeltypen. De op termijn hogere peilen dan een aantal van de natuurdoeltypen vereisen in subalternatief 1 hebben op termijn een negatief effect op de kwaliteit van deze natuurdoeltypen. Dit gaat ten koste van het functioneren van de Groene Ruggengraat, met name van het functioneren van de Groene Ruggengraat als verbinding voor het ecosysteemtype 'grasland met klein open water', omdat hier de eisen van natuurdoeltypen kritischer zijn. In subalternatief 3 zal het langer duren voordat de gewenste drooglegging wordt bereikt. Uiteraard zullen maatregelen als plaggen en vergraven in subalternatief 3 juist op die plekken ingezet worden waar de gewenste drooglegging het snelst bereikt moet worden.

Op grond van bovenstaande wordt verwacht dat de Groene Ruggengraat in het kader van het Integraal Inrichtingsplan zo kan worden uitgewerkt dat belangrijke knelpunten in het plangebied kunnen worden opgelost, zodat de Groene Ruggengraat binnen het plangebied zijn functie zal kunnen vervullen. Bovendien zal de Groene Ruggengraat, samen met de overige delen van het plangebied als zelfstandig natuurgebied functioneren. Met name voor de aansluitingen naar de delen van de Groene Ruggengraat buiten het plangebied is dat onduidelijk, maar ligt dit met name voor de matige en slechte verspreiders lastig. Dit is een leemte in kennis die in het kader van het integraal inrichtingsplan ingevuld zal worden.

alternatief 'Groeidend Veen'

Dit alternatief is te vergelijken met de voorgenomen activiteit met dit verschil dat de kans op de ontwikkeling van de benodigde natuurdoeltypen voor het ecosysteemtype 'grasland met klein open water' kleiner is. De peilen in dit alternatief zijn niet optimaal afgestemd op de natuurdoeltypen. Daarnaast wordt de nutriëntrijke toplaag niet afgeplagd. Hierdoor kan een aantal natuurdoeltypen minder goed tot ontwikkeling komen. Voor het ecosysteemtype 'moeras, struweel en open water' geldt dit in veel mindere mate. Omdat Groeidend Veen in mindere mate kan voldoen aan de eisen van het ecosysteemtype 'grasland met klein open water' en beide ecosysteemtypen zullen moeten worden gerealiseerd om voor alle doelsoorten te voldoen, zal de Groene Ruggengraat als geheel onder dit alternatief minder goed voldoen aan de eisen uit het Handboek Robuuste Verbindingen dan de voorgenomen activiteit.

conclusie

De beoordeling is samengevat in tabel 6.3. Het nulalternatief scoort ten opzichte van de nulmeting licht positief door een toename van het areaal natuur. Omdat op diverse punten niet voldaan wordt aan de richtlijnen van het handboek Robuuste verbindingen zal de Groene Ruggengraat niet goed functioneren.

De kans op het functioneren van de Groene Ruggengraat neemt toe in de voorgenomen activiteit en alternatief Groeiend Veen. De kans is het hoogst in subalternatief 2 van de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'. Naar verwachting zal de Groene Ruggengraat binnen het plangebied in dit subalternatief functioneren, omdat de natuurdoeltypen tot ontwikkeling kunnen komen en barrières binnen het plangebied passeerbaar zullen worden gemaakt. Dit subalternatief scoort veel beter dan de nulmeting, wat is beoordeeld met '++'. In subalternatief 1 zijn de peilen niet optimaal voor de diverse natuurdoeltypen. De score neemt daardoor af. Subalternatief 3 zal op termijn hetzelfde scoren als subalternatief 2, maar heeft hier een lagere score gekregen omdat de Groene Ruggengraat in de eerste periode nog niet optimaal zal functioneren.

Alternatief Groeiend Veen scoort ten opzichte van de nulmeting lager dan de voorgenomen activiteit. Dit om twee redenen: de peilen passen niet goed bij een deel van de natuurdoeltypen en door het niet afplaggen geldt dit ook voor de trofiegraad. Beide factoren zijn ongunstig voor de ontwikkeling van een deel van de gewenste natuurdoeltypen en daarmee voor het goed functioneren van de robuuste Groene Ruggengraat voor alle doelsoorten. Door de grote toename van het areaal natuur en door de aaneengeslotenheid van die natuur scoort dit alternatief wel positiever dan de nulmeting en het nulalternatief.

tabel 6.3 Effectentabel Groene Ruggengraat

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
realisering robuuste Groene Ruggengraat, dat wil zeggen het bieden van: - voldoende biotoop voor de doelsoorten van de Groene Ruggengraat - voldoende migratiemogelijkheden c.q. het opheffen van knelpunten - voldoende schuilmogelijkheden en habitat voor minder mobiele soorten	0	0/+	+/++	++	+/++	+

6.3. Optimaliseren ontwikkelingsbeheer

Voor het realiseren van de gewenste natuurdoeltypen worden inrichtingsmaatregelen genomen. Naast deze inrichtingsmaatregelen zal het gevoerde beheer in hoge mate bepalen langs welke weg en met welke kwaliteit de natuurdoeltypen zich zullen ontwikkelen. In tabel 6.4 is per natuurdoeltype een korte kenschets gegeven van het ontwikkelingsbeheer en de ontwikkelingsduur.

tabel 6.4. Ontwikkelingsbeheer en ontwikkelingsduur natuurdoeltypen [gebaseerd op Bal et al, 2001]

natuurdoel	natuurdoeltype	ontwikkelingsbeheer	ontwikkelingsduur
moerasnatuur	3.14a gebufferde poel	(uitgraven), verwijderen organisch materiaal, aanleg van afwisselend flauwe en steile oevers	tot 10 jaar
	3.15 gebufferde sloot	(gedeeltelijk en gefaseerd) verwijderen van organisch materiaal en beplanting	tot 10 jaar
	3.19 kanaal en vaart	verwijderen eventueel aanwezige beschoeiing, aanleg van plasbermen en natuurvriendelijke oevers	tot 10 jaar
	3.24 moeras	peilverhoging, vergraven, overige inrichtingsmaatregelen	10-25 jaar
	3.25 natte strooiselruigte	peilverhoging, afwegen blijven van maai- en begrazingsbeheer	25 jaar
	3.27 trilveen	zeer lange ontwikkelingstijd onder zeer specifieke omstandigheden	
	3.28 veenmosrietland	zeer lange ontwikkelingstijd onder zeer specifieke omstandigheden	
	3.55 wilgenstruweel	kan ontstaan als gevolg van successie bij afwezigheid van maai- en begrazingsbeheer	10-25 jaar
nat schraalland	3.62 laagveenbos	kan ontstaan als gevolg van successie bij afwezigheid van maai- en begrazingsbeheer	> 30 jaar
nat schraalland	3.29 nat schraalgrasland	opheffen van drainage, verwijderen van de vermete toplaag en het instellen van een verschrallingsbeheer (maaïen en/of extensieve beweiding)	25 jaar
	3.31 dotterbloemgrasland van veen en klei	verschrallingsbeheer (maaïen en/of beweiding, eventueel voorafgegaan door afplaggen)	25 jaar
weidevogelgrasland	3.38 bloemrijk grasland van het zand en veengebied	herstellen van de hydrologie en instellen van verschrallingsbeheer van maaïen en afvoeren	25 jaar
	3.32 nat, matig voedselrijk (weidevogel)grasland	vernatting en extensivering van bemesting en beweiding	10 jaar

In deze paragraaf wordt een beoordeling gegeven op twee beoordelingscriteria:

- de snelheid waarmee natuurdoelen in de alternatieven zullen worden gerealiseerd;
- de mogelijkheden die de alternatieven hebben om de successie in de gewenste richting te geleiden door beheermaatregelen.

Om het gewenste ontwikkelings- en instandhoudingsbeheer mogelijk te maken, zal de inrichting aan bepaalde randvoorwaarden moeten voldoen. Dit heeft in ieder geval betrekking op bereikbaarheid en berijdbaarheid van percelen voor machines en de aan- en afvoer van vee voor begrazing. In het kader van het Integraal Inrichtingsplan (of een daaraan gekoppeld beheerplan) zal het benodigde beheer verder moeten worden uitgewerkt, waarbij bereikbaarheid en bereidbaarheid een rol zullen moeten spelen.

nulmeting

In de huidige situatie zijn reeds gebieden ingericht ten behoeve van de natuur. Ook zijn plagproeven in de Krimpenerwaard gedaan. De vegetatieontwikkeling op geplagde percelen is beschreven in Kerkhof (2006). Vijf tot negen jaar na afgraven is het vegetatiedek vooral in de lagere delen, die in de winter langdurig onder water staan, nog niet gesloten. Hoger in de zonering begint het vegetatiedek te sluiten en winnen schraallandsoorten terrein, terwijl het aandeel van soorten van (zeer) voedselrijke omstandigheden afneemt. Na circa 7 jaar begonnen veenmossen in de vegetatie toe te nemen, wat duidt op zure omstandigheden.

nulalternatief

In het nulalternatief zullen op de gronden die in eigendom zijn van Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) inrichtingsmaatregelen worden genomen. Hier mogen vergelijkbare ontwikkelingen worden verwacht als beschreven zijn bij de huidige situatie.

alternatief 'Grutto en Otter'

In het alternatief 'Grutto en Otter' wordt het gehele plangebied ingericht als natuurgebied en worden de peilen optimaal afgestemd op natuur. De wijze waarop het optimale peil wordt bereikt verschilt per subalternatief. Binnen dit alternatief zijn er ook goede mogelijkheden voor natuurbeheer (door ZHL, particulieren en agrariërs). Dit betekent dat ook het beheer kan worden afgestemd op de eisen die de natuurdoelen daaraan stellen.

Voor een groot deel van de natuurdoelen is beheer noodzakelijk om de gewenste natuurdoelen te behalen en zo lang mogelijk te behouden. Menselijk ingrijpen is dus noodzakelijk en heeft onder andere als doel:

- tegengaan van verruiging van graslanden met botanische doelstellingen en weidevogel doelstellingen door een beheer van maaien en/of (na)beweiding;
- voorkomen van verruiging van (riet)moerassen en periodiek (verspreid in tijd en ruimte) terugzetten van verlandingsprocessen, zodat alle successiestadie in de verlandingsreeks tegelijkertijd (op verschillende locaties) in het plangebied aanwezig zijn;
- voorkomen van verbossing door maaibeheer en/of beweiding.

Zonder beheer (menselijk ingrijpen) kunnen natuurdoelen niet of slechts gedurende een bepaalde tijd gehaald worden, omdat voortschrijdende successie (in afwezigheid van grote grazers of natuurlijke catastrofes zoals overstromingen) zeker onder de relatief voedselrijke omstandigheden zal leiden tot verlanding, verruiging en verbossing van het natuurgebied.

Seizoensberging met flexibel peilbeheer kan een positieve bijdrage leveren aan het sturen van de successie in de gewenste richting. Met name voor de semi-aquatische fase (moerassen) en ondiep open water is een flexibel peilbeheer met relatief hoge waterstanden in de winter en lage waterstanden in de zomer gunstig. Dit komt onder andere door:

- droogval van delen van het moeras, waardoor riet kan kiemen en de bodem wordt belucht, wat weer gunstig is voor het vastleggen van fosfaat in de bodem;
- relatief lage waterstanden in het ondiep open water in het groeiseizoen, waardoor de hoeveelheid licht op de bodem toeneemt wat gunstig is voor de groei van waterplanten;
- verminderde inlaatbehoefte en daardoor vermindering van de belasting met voedingsstoffen via het inlaatwater.

Met het toepassen van begreppeling als maatregel om de relatie tussen oppervlaktewater (peil) en grondwaterstand in de percelen te vergroten zijn in het de Krimpenerwaard door het Zuid-Hollands Landschap goede ervaringen opgedaan. Begreppeling heeft als effect dat de drainageafstand wordt verkleind, waardoor in de zomer de grondwaterstand in de percelen zal stijgen ten opzichte van een situatie zonder begreppeling. Dit is gunstig voor het bereiken van de juiste vochttoestand voor de beoogde natuurdoelen, voor het voorkomen van verzuring en voor het verminderen van bodemdaling. In de ecohydrologische systeemanalyse (bijlage 4) wordt hier nader op ingegaan. Onderwaterdrainage wordt gezien als een technische maatregel die met name geschikt is voor percelen met een landbouwkundige functie en niet voor natuurgebieden. Bovendien zijn er nog onzekerheden over de gevolgen van onderwaterdrainage op de waterkwaliteit en waterbehoefte (zie paragraaf 3.3.3). Ten opzichte van onderwaterdrainage heeft begreppeling als belangrijk voordeel dat reliëf in de percelen wordt gecreëerd, wat leidt tot een toename van de variatie in standplaatsfactoren en dus kan leiden tot een meer diverse natuur. Het toepassen van onderwaterdrainage in natuurgebieden heeft dan weinig meerwaarde.

In het subalternatief 1 wordt de gewenste drooglegging direct gerealiseerd en wordt het peil vervolgens gefixeerd. De uitgangssituatie is in dit subalternatief dus goed en de natuurdoeltypen kunnen relatief snel tot ontwikkeling komen (ontwikkelingstijd circa 10-25 jaar). Op termijn wordt het echter natter, waardoor de mogelijkheden voor beheer en 'bijsturen' van de successie af gaan nemen. Mogelijk wordt dit subalternatief op termijn zo nat, dat natuurbeheer niet goed meer mogelijk is.

In subalternatief 2 wordt de gewenste drooglegging ook direct gerealiseerd, waarna het peil de maaivelddaling zal volgen. Ook hier kunnen de natuurdoeltypen snel tot ontwikkeling komen (10-25 jaar). De mogelijkheden voor beheer blijven in dit alternatief gelijk, doordat het peil de maaivelddaling volgt. Ook het begeleiden van de successie in de gewenste richting door beheer blijft in dit alternatief op termijn dus goed mogelijk. Overwogen kan worden op peilgebiedniveau enige vernatting toe te staan (en het peil dus niet meteen aan te passen) voor deelgebieden in een peilgebied waarvan het maaiveld relatief snel daalt of die relatief laag liggen. Peilaanpassing op een later moment vertraagt de snelheid van bodemdaling.

In subalternatief 3 wordt de gewenste drooglegging pas na verloop van tijd gerealiseerd. Ook de natuurdoeltypen zullen daarom later worden gerealiseerd. De mogelijkheden voor beheer zijn goed, omdat de drooglegging (ook later in de tijd) nog geschikt is voor het voeren van natuurbeheer.

alternatief 'Groeind Veen'

In dit alternatief wordt het peil direct verhoogd. In paragraaf 6.1 is reeds geconcludeerd dat de gewenste natuurdoeltypen in dit alternatief slechts beperkt tot ontwikkeling kunnen komen. Ook zijn de mogelijkheden voor natuurbeheer beperkter, omdat het gebied erg nat is. De mogelijkheden om de successie in de gewenste richting te begeleiden zijn dus ook beperkter.

conclusie

De mogelijkheden om de successie in de gewenste richting te sturen en de snelheid van realisatie van natuurdoeltypen zijn in de huidige situatie en het nulalternatief min of meer gelijk (beoordeling '0'). In subalternatief 1 en 2 van het alternatief 'Grutto en Otter' kunnen de natuurdoeltypen relatief snel tot ontwikkeling komen, omdat direct het gewenste peil wordt ingesteld (beoordeling '+'). In subalternatief 3 zal de ontwikkeling van natuurdoeltypen langer duren (beoordeling '+').

De beheermogelijkheden voor geleiding van de successie zijn het grootst in de subalternatieven 2 en 3 (beoordeling '+'). Subalternatief 1 wordt op termijn te nat (beoordeling '+'). Het alternatief 'Groeind Veen' biedt in vergelijking met alternatief 'Grutto en Otter' veel minder mogelijkheden voor de snelle realisatie van natuurdoeltypen en geleiding van de successie. Dit is beoordeeld met '0/+'.⁵

tabel 6.5. Effectentabel optimaliseren ontwikkelingsbeheer

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeind Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaivelddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
optimaliseren ontwikkelingsbeheer	0	0	+/++	++	+/++	0/+
onderverdeeld in:						
- zo snel mogelijke realisatie van natuurdoelen ⁵	0	0	++	++	+	0/+
- geleiding van successie	0	0	+	++	++	0/+

⁵ De na te streven natuurdoelen zijn randvoorwaardelijk voor het ontwerp. De realisatietermijn verschilt per alternatief.

7. EFFECTEN OP RECREATIE

7.1. Natuur- en recreatieve beleving

Er blijkt een positieve samenhang te bestaan tussen de waardering en het gebruik van een gebied. Naarmate een gebied meer gewaardeerd wordt, wordt het meer gebruikt voor recreatieve doeleinden [Van der Wulp et al, 2008]. Een landschap zal echter door diverse personen anders gewaardeerd of beleefd worden. Beleving is daarmee een subjectief begrip. Toch zijn er overeenkomsten in de wijze waarop mensen landschappen waarderen, gebaseerd op een aantal direct waarneembare kenmerken. Deze zijn universeel van invloed op de waargenomen schoonheid of aantrekkelijkheid van een omgeving. In de Monitor Nota Ruimte van het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau worden ruimtelijke ontwikkelingen gevolgd en in kaart gebracht. Om te achterhalen hoe deze ruimtelijke ontwikkelingen gewaardeerd worden, voeren de planbureaus een Belevingswaardenmonitor uit via enquêtes onder bewoners en bezoekers van bepaalde landschappen. Uit deze monitor blijkt dat de volgende kenmerken positief dan wel negatief meewerken aan de natuur- en recreatieve beleving van een landschap (zie ook bijlage 9):

- positieve kenmerken:
 - natuurlijkheid (er is maar weinig natuur in dit gebied versus er is heel veel natuur in dit gebied);
 - historische kenmerkendheid (modern, nieuw landschap met nauwelijks iets van vroeger versus er is in dit gebied veel van vroeger, het landschap heeft een sterk historisch karakter);
- negatieve kenmerken:
 - stedelijkheid (dit gebied is sterk verstedelijkt; er is veel bebouwing aanwezig versus dit gebied is nog erg landelijk);
 - horizonvervuiling (veel horizonvervuiling; er zijn veel dingen die als storend in het oog springen versus er is in dit gebied nergens horizonvervuiling of er zijn geen of heel weinig storende elementen (afbeelding 7.1));
- persoonlijk kenmerk:
 - leeftijd van een persoon (de waardering van het landschap neemt toe met de leeftijd).

Op basis van bovenstaande kenmerken is een empirische formule opgesteld die ook een voorspellende waarde heeft voor de beleving van nieuwe landschappen (zie bijlage 9 voor meer details). Uit de formule in bijlage 9 blijkt dat de kenmerken natuurlijkheid en historische kenmerkendheid het zwaarste meewegen in de beleving. Deze twee kenmerken en de formule zijn gebruikt om de natuur- en recreatieve beleving op een kwalitatieve manier te waarderen.

afbeelding 7.1. Landschapskenmerk horizonvervuiling (veel storende elementen: hoogspanningsmasten in Polder de Nesse; geen of heel weinig storende elementen: polder Den Hoek)



[Bron: Barend de Jong, 2009].

weidegang

De aanwezigheid van vee in het landschap blijkt positief bij te dragen aan de beleving van de natuurlijkheid en historische beleving van het landschap. Dit is in de beoordeling, naast zaken als natuurareaal, behoudt verkaveling en slotenpatroon, etc., meegenomen.

In de reguliere landbouw blijkt een trend aanwezig te zijn om meer koeien op stal te houden. De belangrijkste redenen voor het volledig opstallen van koeien zijn:

- schaalvergroting (de grootte van het huiskavel volstaat niet meer);
- constantheid van het voedselaanbod (zonder beweiding is meer controle op het voedselaanbod mogelijk, wat belangrijk is voor hoogproductieve koeien);
- trend tot automatisering van het melken (dit valt moeilijk te combineren met weidegang);
- controle/optimalisering van de mineralenboekhouding.

Naar verwachting zullen landelijk gezien in het jaar 2012 ongeveer 15-25 % van de bedrijven hun koeien het gehele jaar op stal houden. Dit zijn voornamelijk grote bedrijven. Het aantal koeien dat volledig opgestald blijft is naar verwachting 25-35 % [Van de Pol-van Dasselaar, et al, 2002].

Het is moeilijk om de mate van weidegang te kwantificeren in de nieuwe natuurgebieden. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft echter veel ervaring met het beheer van natuurgebieden in de Krimpenerwaard. De natuurdoelen die beheerd worden zijn vergelijkbaar met het alternatief 'Grutto en Otter'. Hun ervaring is dat gebieden met het natuurdoeltype grasland (weidevogel of botanisch) in vrijwel alle gevallen begrazing nodig hebben.

De periode en mate waarin is afhankelijk van het natuurdoeltype en de mate van bodemnatheid. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de volgende ervaringscijfers⁶:

- weidevogelgrasland: beweiding gedurende het jaar voor kortere (maaipercelen) of langere tijd (seizoen standweide percelen) 100 % van het areaal:
 - seizoen standweiden (april-oktober): 35 % beweiding met rundvee en/of schapen voor 1 juli: 1,5 GVE ha, na 1 juli: 3,0 GVE ha;
 - naweiden (na maaien bij mozaïekbeheer): 65 % beweiding met rundvee en/of schapen: 3,0 GVE ha;
- botanisch grasland: beweiding gedurende het jaar voor kortere (maaipercelen) of langere tijd (seizoen standweide percelen); 75-80 % van het areaal:
 - seizoen standweiden (april-oktober): 15-20 % beweiding met rundvee en/of schapen voor 1 juli: 1,5 GVE ha, na 1 juli: 3,0 GVE ha;
 - naweiden (na maaien bij mozaïekbeheer): 80-85 %; beweiding met rundvee en/of schapen: 3,0 GVE ha. Opgemerkt wordt dat bij de botanische doelstellingen en met name in de nattere doeltypen als nat schraalgrasland de beweidingperiode vroeger in het najaar zal worden beëindigd;
- Groene Ruggengraat: beweiding gedurende het jaar voor kortere (maaipercelen) of langere tijd (seizoen standweide percelen): 20-35 % van het areaal:
 - seizoen standweiden (april-oktober): 5-10 % beweiding met rundvee en/of schapen voor 1 juli: 1,0 GVE ha, na 1 juli: 2,0 GVE ha;
 - naweiden (na maaien in mozaïekbeheer): 25 %; beweiding met rundvee en/of schapen: 2,0 GVE ha.

Op basis van deze gegevens kan aangenomen worden dat de weidegang en dus de hoeveelheid koeien in de wei, in het alternatief 'Grutto en Otter' vergelijkbaar is met het nulalternatief. In het alternatief Groeiend Veen zal de weidegang en dus de hoeveelheid koeien in de wei afnemen, omdat er veel minder graslandnatuur wordt gerealiseerd en de moerasnatuur (incl. bos) veel minder geschikt is voor weidegang. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat hoe meer vee in de wei, hoe hoger de score is.

nulmeting

De Krimpenerwaard is een sterke landschappelijke entiteit, waarop het langdurige landbouwkundige gebruik zijn stempel heeft gedrukt. Kernkwaliteiten die daardoor zijn ontstaan zijn authenticiteit, ruimte en rust. Overige gebiedskenmerken zijn:

- landschapswaarden en natuurwaarden zoals weidevogelgebieden, eendenkooien en (voormalige) boezems;
- agrarisch cultuurlandschap met koeien in de wei;
- nabij grote steden zoals Gouda en Rotterdam;
- omgeven door de rivieren Lek, Hollandsche IJssel, de Nieuwe Maas en de Vlist.

De precieze waardering van de Krimpenerwaard op basis van de hierboven genoemde kenmerken is niet bekend. Wel is bekend dat de waardering van de laagveengebieden van West-Nederland (waaronder de Krimpenerwaard) ongeveer gelijk is aan de gemiddelde waardering van alle landschapstypen in Nederland, een 7,3 [Van der Wulp et al, 2008].

nulalternatief

Op basis van de beschrijving van het nulalternatief (hoofdstuk 3) kan gesteld worden dat het landschap in 25 jaar enigszins zal veranderen, omdat er in het nulalternatief meer natuur komt. Landbouwgebied blijft voor het grootste deel landbouwgebied, inclusief de historische kenmerkendheid (koeien in de wei, verkavelingspatroon, bebouwingslinten, etc., zie hoofdstuk 4), maar neemt in areaal af, zodat ook het aantal koeien in de wei zal afnemen. Het aantal koeien neemt daarnaast nog af door de trend om meer koeien op stal te zetten (zie 'weidegang' hierboven).

⁶ GVE = Groot Vee Eenheid. Een koe telt voor 1 GVE, een pink voor 0,5 en een kalf voor 0,25.

Het areaal natuur in het plangebied neemt toe, maar grote woningbouwprojecten (stedelijkheid en horizonvervuiling) zijn vooral buiten de Krimpenerwaard gelokaliseerd (Gouda, Waddinxveen en Zuidplaspolder).

De gemiddelde leeftijd wijzigt wel. De bevolkingsprognoses voor de Krimpenerwaard voor het jaar 2032 ontbreken. Voor heel Nederland blijkt op basis van gegevens van het CBS (2008) dat de gewogen gemiddelde leeftijd van 2007 tot 2032 zal toenemen met 4 jaar. Volgens de gebruikte formule zal de waardering van het landschap dan toenemen met 0,1. Ten opzichte van de nulmeting is dit een toename van 1,7 %. Vertaald naar de Krimpenerwaard en omgeving (recreatie komt niet alleen uit de Krimpenerwaard zelf) wordt uitgegaan van een lichte toename van de waardering. Hoe groot de toename precies is, blijft onduidelijk. Hiermee is de natuur- en recreatieve beleving onder het nulalternatief ten opzichte van de nulmeting beoordeeld met '0/+'.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Net als onder het nulalternatief zullen de kenmerken stedelijkheid en horizonvervuiling niet substantieel wijzigen. Ook de leeftijd zal licht toenemen. Meer belangrijke wijzigingen voor het alternatief Grutto en Otter zijn de veranderingen van de kenmerken natuurlijkheid en historische kenmerkendheid.

Het areaal natuur zal ten opzichte van de nulmeting flink toenemen, respectievelijk 100 % van het plangebied ten opzichte van 8 % van het plangebied (zie paragraaf 6.1). Het realiseren van grotere natte natuurgebieden op een aantal locaties zal ten koste gaan van de historische kenmerkendheid van de Krimpenerwaard als agrarisch veenweidegebied. Tegelijkertijd wordt met de ontwikkeling van extensief beheerde botanische en weidevogelgraslanden het historisch agrarisch landschap van begin vorige eeuw weer beter benaderd. Voor het beheer van het natuurgebied zal gebruik worden gemaakt van begrazing (door runderen). De koeien verdwijnen dus niet uit de wei. Wel neemt hun aantal af, vergelijkbaar met het nulalternatief (zie kopje 'weidegang' hierboven). Daarnaast zullen typische kenmerken als ontginningspatroon, aanwezigheid van sloten, bosjes en houtwallen en de openheid van het landschap niet verdwijnen. De grote, waardevolle weidevogelgebieden zullen echter ook een beperking betekenen voor de recreatieve mogelijkheden aangezien broedende weidevogels zeer gevoelig zijn voor verstoring, maar ook de vogels die het gebied in de winter bezoeken (wintergasten) gevoelig zijn voor verstoring.

Het verschil tussen de subalternatieven is het instellen van de peilen. Dit is belangrijk voor de te behalen kwaliteit van de natuur. Subalternatief 2 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldafvaling volgt' is het meest toegespitst op de randvoorwaarden voor de gewenste natuurdoelen, die passen bij het historisch agrarisch landschap van begin vorige eeuw (botanische en weidevogelgraslanden, weidevogelgraslanden). Dit levert een positieve bijdrage aan historische kenmerkendheid. Op de lange termijn zal subalternatief 1 'directe peilrealisatie met peilfixatie' op alternatief 'Groeiend Veen' gaan lijken, en daardoor minder gaan scoren op historische kenmerkendheid en meer op natuurlijkheid. Subalternatief 3 'ingroeimodel' gaat op termijn steeds meer lijken op subalternatief 2.

alternatief 'Groeiend Veen'

In dit alternatief wordt een gelijk natuurareaal als in 'Grutto en Otter' gerealiseerd, maar de invulling verschilt doordat er in 'Groeiend Veen' meer natte natuur is en het peil gefixeerd wordt. Dit alternatief scoort daardoor beter op het criterium natuurlijkheid en minder op historische kenmerkendheid. Wel zullen er minder koeien in de wei te zien zijn, vanwege het grote areaal natte natuur zodat de mogelijkheden voor medegebruik door particulieren en agrariërs in dit alternatief beperkter zijn. Omdat de effecten niet allemaal dezelfde kant op wijzen en niet gekwantificeerd kunnen worden, is het niet goed mogelijk om aan te geven of 'Groeiend Veen' hoger gewaardeerd wordt dan 'Grutto en Otter'.

conclusie

De nulmeting, het nulalternatief en de twee alternatieven worden in deze paragraaf kwalitatief beoordeeld (tabel 7.1). Het nulalternatief is beoordeeld met een 0/+. De gemiddelde leeftijd stijgt mogelijk licht in de Krimpenerwaard en dit is van invloed op de beleving van het landschap (bijlage 9).

De alternatieven van 'Grutto en Otter' van 'Groeiend Veen' kennen een grote toename van het areaal natuur, maar met een andere invulling. Zo zal 'Grutto en Otter' beter scoren op historische kenmerkendheid en 'Groeiend Veen' beter op natuurlijkheid. Er wordt ingeschat dat netto de toename van de waarde van de landschapsbeleving door de natuurontwikkeling groter is dan de afname van de waarde door vermindering van historische kenmerkendheid om de volgende redenen:

- natuurlijkheid wordt iets beter gewaardeerd dan historische kenmerkendheid (zie bijlage 9);
- er worden grote arealen weidevogelgraslanden en botanische graslanden gemaakt en deze graslanden lijken op zoals het vroeger was.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de beleving is dat veel recreanten (in de huidige situatie) juist naar de Krimpenerwaard komen om het veenweidelandschap met de historische kenmerken te beleven.

Op basis hiervan zal de netto waardering van beide alternatieven ten opzichte van de nulmeting positief zijn. Hoe de onderlinge verschillen uitpakken is op grond van de hier gegeven kwalitatieve analyse moeilijk in te schatten.

tabel 7.1 Effectentabel Natuur- en recreatieve beleving

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeiend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
natuur- en recreatieve beleving	0	0/+	+	+	+	+

7.2. Uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen

Randvoorwaarde voor beleving van het landschap is de aanwezigheid van recreatieve routes, voorzieningen en knooppunten zodat men ook daadwerkelijk in het landschap kan recreëren. In deze paragraaf wordt kwalitatief beoordeeld in hoeverre het nulalternatief en de alternatieven verschillen van de nulmeting wat betreft handhaafbaarheid of kansen voor de uitbreiding van bestaande recreatieve routes, voorzieningen (mogelijkheden voor recreatief medegebruik) en knooppunten.

nulmeting

Knooppunten vormen de verbindingen tussen de Krimpenerwaard en de omgeving. Deze knooppunten zijn geconcentreerd op een aantal plaatsen waar bruggen liggen en veerboten aanleggen. Deze punten zijn de entrees van de Krimpenerwaard. De knooppunten zijn verbonden door de ringdijk om de Krimpenerwaard die daarmee een belangrijke uitvalsbasis is naar binnen- en buitendijkse gebieden waaronder het plangebied. In de Visie recreatie Krimpenerwaard worden de knooppunten als onvoldoende aantrekkelijk beoordeeld. Gemist worden goede recreatieve informatie en standaardvoorzieningen als een plattegrond van de Krimpenerwaard, picknickbanken en prullenbakken (afbeelding 7.2) eventueel aangevuld met horeca, sanitair, fietsverhuur of een openbare fietspomp. Daarnaast zijn voldoende parkeerplaatsen nodig (afbeelding 7.2).

afbeelding 7.2. Standaardvoorzieningen bij natuurgebied Bilwijk en parkeerplaats bij natuurgebied Berkenwoudse Driehoek




[Bron: Barend de Jong].

De Krimpenerwaard zelf biedt diverse mogelijkheden voor (met name) extensieve vormen van recreatie en toerisme. Twee belangrijke recreatiegebieden zijn het Loetbos en het Krimpenerhout. Beiden zijn buiten het plangebied gelegen. Het Loetbos is een polderbos langs het veenweideriviertje de Loet, geschikt voor wandelen, fietsen of kanoën. Het ligt ten noorden van de provinciale weg van Krimpen aan de IJssel naar Bergambacht (afbeelding 7.3). Het Krimpenerhout is een recreatiegebied met recreatieplas en fiets- en wandelmogelijkheden. Het ligt ten zuidwesten van de Loet, tussen Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek (niet op kaart). In de nulmeting trekken de recreatiegebieden in de Krimpenerwaard één miljoen bezoekers per jaar. Dit leidt in de Krimpenerwaard tot een zonering, waarbij het westen en noorden meer gebruikt worden voor recreatie dan het oosten en zuiden. Er bestaan daarnaast verschillende wandel- en fietsroutes (afbeelding 7.3) en mogelijkheden voor kano- en roeibootverhuur en vissen.

Het huidige wegennetwerk (afbeelding 7.3) is met name gericht op het landbouwkundige gebruik van de Krimpenerwaard. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wegen of paden voor niet recreatief, mede recreatief of puur recreatief gebruik. Alle verkeer gaat dus over dezelfde weg. Daarnaast liggen er weinig verbindingen tussen de diverse knooppunten, komen er relatief veel doodlopende wegen voor, heeft het netwerk een grote maaswijdte en wisselen verharde en onverharde trajecten elkaar af. Voor recreatie zijn er zo weinig keuzemogelijkheden om het landschap te kunnen beleven. Een breder gebruik stelt heel andere eisen aan infrastructuur. In 2007 is er in de hele Krimpenerwaard meer dan 20 kilometer wandelpad beschikbaar en 209 kilometer aan fietsmogelijkheden. Dit is echter onvoldoende om aan de vraag tegemoet te komen [NRK, 2007], met name in het noorden en westen van de Krimpenerwaard.

Op dit moment bestaan er twee officiële kanoroutes in de Krimpenerwaard (afbeelding 7.3): de Loetroute (Stolwijkersluis (bij Gouda)-Loetbos-Krimpen aan den IJssel, 22 km) en de Vlistroute (Haastrecht-Schoonhoven, 10 km). De routes vormen geen aaneengesloten netwerk en liggen grotendeels buiten het plangebied.

afbeelding 7.3. Wegennetwerk en kanoroutes



Legenda

- Plangebied
- Natuur
- Provinciale wegen
- Verharde wegen/paden
- Onverharde wegen/paden
- Kanoroute Loet
- Kanoroute Vlist

InrichtingsMER Krimpenerwaard

Recreatie

schaal: 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 km

projectcode: GV774-5
 versie: definitief
 datum: 09-06-2009
 getekend: B. de Jong
 gecontroleerd: L. Turlings
 gedrukt: L. Turlings

Witteveen **Bos**

afbeelding 7.4. Fietsroute door de Krimpenerwaard (kruising Schaapjes zijde - Lange Tiendweg)



[Bron: Barend de Jong].

nulalternatief

Zoals in de beschrijving van het nulalternatief (hoofdstuk 3) is aangegeven, is er een groot tekort aan paden voor de meest populaire vormen van recreatie: wandelen en fietsen. Dit tekort zal alleen maar toenemen. Voor de Krimpenerwaard geldt een capaciteitstekort in 2020 voor wandelen van 60 % van de benodigde capaciteit. Voor fietsen is het tekort 34 % [NRK, 2007]. Daarnaast is er stijgende behoefte aan uitbreiding van de mogelijkheden voor kanoën en paardrijden. Ook is er een grote behoefte aan recreatiemogelijkheden met een sterke belevingscomponent. In het nulalternatief zullen de huidige voorzieningen blijven bestaan

Voor sommige boeren kan het interessant zijn om naast (of in plaats van) hun agrarische activiteiten andere activiteiten uit te voeren waaronder activiteiten gericht op recreatie en toerisme [Tolkamp et al., 2007]. Te denken valt aan rondvaarttochten met fluisterboten, logies met ontbijt, winkelen bij de boer of campingmogelijkheden (SVR-campings). Samenwerking met ondernemers in de regio vindt in de Krimpenerwaard plaats binnen de stichting Weidehof Krimpenerwaard. In lijn met de landelijke opgaande trend kan gesteld worden dat de recreatieve of toeristische activiteiten ook in de Krimpenerwaard toenemen.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Volgens de Visie Recreatie Krimpenerwaard is het goed mogelijk om aan de grote vraag naar recreatiemogelijkheden te voldoen. Hierbij geeft de visie een aantal maatregelen. Van belang voor het plangebied zijn:

- complete, logische recreatieve netwerken te realiseren op basis van de huidige landschapsstructuur. Uitbreiding van wandelmogelijkheden met minimaal 32 kilometer en maximaal 70 kilometer (met name in natuurgebieden en dus binnen het plangebied) en uitbreiding van fietsmogelijkheden met minimaal 43 kilometer (voor de gehele Krimpenerwaard). Voor kanoërs een verbinding maken tussen de twee bestaande kanoroutes en het beperken van barrières;
- de recreatieve druk medebepalend te laten zijn voor de inrichting van natuurgebieden.

Binnen de ontwikkeling van het alternatief Grutto en Otter wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden voor recreatief medegebruik door fietsers, kanoërs en wandelaars. De te realiseren natuurdoelen leggen beperkingen op aan de mogelijkheden van recreatief medegebruik.

Daarom is op basis van de te realiseren natuurdoelen een recreatiezonering opgesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 3 en bijlage 11. Weidevogelgrasland stelt de grootste beperkingen aan recreatief medegebruik, met name in het broedseizoen. Met de verschuiving van landbouw naar natuur vindt daarmee tegelijkertijd een verschuiving plaats van niet toegankelijke landbouwgronden naar meer openbaar toegankelijke natuurgebieden. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor recreatief gebruik van de Krimpenerwaard, waar een grote behoefte aan is. Daarmee voldoet het alternatief aan beide maatregelen en nemen de kansen voor het uitbreiden van bestaande netwerken en voorzieningen nog meer toe.

alternatief 'Groeind Veen'

Voor Groeind Veen geldt hetzelfde als voor 'Grutto en Otter'. Omdat er in dit alternatief minder verstoringsevoelig weidevogelgrasland is ingepland dan in 'Grutto en Otter' nemen de mogelijkheden voor recreatief medegebruik toe.

conclusies

Concluderend kan gesteld worden dat in de nulmeting het aanbod van recreatieve routes, voorzieningen en knooppunten onvoldoende is afgestemd op de vraag. In het nulalternatief zullen de huidige voorzieningen blijven bestaan en worden diverse initiatieven uitgevoerd om de vraag beter te bedienen. Mogelijk dat ook initiatieven van derden in de Krimpenerwaard zorgen voor een toename van recreatieve voorzieningen. Netto zal de beoordeling daarom mogelijk positiever uitvallen dan de nulmeting. Dit is beoordeeld met een '0/+'.

De kansen voor recreatief medegebruik in beide alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeind Veen' nemen toe. De mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de verschillende natuurdoelen bepalen het verschil tussen de alternatieven. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, stellen weidevogelgebieden de hoogste eisen aan recreatief medegebruik. Aangezien het areaal aan weidevogelgebieden voor het alternatief 'Groeind Veen' het kleinste is, zijn de kansen voor uitbreiding van het bestaande netwerk in dat alternatief het grootst, dit is beoordeeld met een '++'. De kleinere kansen van alternatief 'Grutto en Otter' zijn beoordeeld met een '+'.

tabel 7.2. Effectentabel Uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeind Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
handhaafbaarheid c.q. kansen voor uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen (mogelijkheden voor recreatief medegebruik) en knooppunten	0	0/+	+	+	+	++

8. NEVENEFFECTEN

8.1. Archeologie

In de Krimpenerwaard zijn veel gebieden met een grote kans op archeologische sporen in de bodem. Door de herinrichting van de Krimpenerwaard worden functies van gebieden gewijzigd, peilen gewijzigd en graslanden afgeplagd en afgegraven. Dit zijn activiteiten die de archeologische waarden in de bodem kunnen aantasten [provincie Zuid-Holland, 2005]. Overigens kunnen archeologische sporen ook aangetast worden door peilverlaging of peilaanpassing. In afbeelding 8.1 staat aangegeven welke gebieden een redelijke tot grote of een grote tot zeer grote kans op archeologische sporen hebben. Tevens is in afbeelding 8.1 aangegeven welke gebieden met een grote kans op archeologische sporen binnen het plangebied zijn gelegen. In deze gebieden worden archeologische sporen aangetast als er dieper dan 30 cm beneden maaiveld wordt afgegraven [provincie Zuid-Holland, 2007], maar de meeste van de geulen die zijn ingetekend op afbeelding 8.1 liggen diep (enkele meters) onder maaiveld. In gebieden aangegeven op de Archeologische Monumenten Kaart (de zogenaamde archeologische vindplaatsen, zie afbeelding 8.2) kunnen ook archeologische sporen aangetroffen worden in de toplaag, dus het deel boven de 30 cm onder het maaiveld. Hierbij wordt opgemerkt dat de archeologische sporen in de toplaag door landbouwkundige bewerkingen in de meeste gevallen reeds verstoord zullen zijn.


mogelijke verstoringen

De volgende activiteiten uit de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeiend Veen' kunnen een verandering van het bodemprofiel en daarmee een verstoring van de archeologische vindplaatsen veroorzaken:

- het verlagen van het waterpeil. Het verlagen van het peil zorgt voor het verhogen van de kans op het verstoren van de archeologische waarden omdat hierdoor archeologische waarden die voorheen onder de grondwaterstand bevonden nu boven de grondwaterstand terecht kunnen komen. Deze archeologische sporen kunnen daardoor oxideren en aangetast worden;
- het afgraven van percelen;
- het inrichten van natuurgebieden. Bij het inrichten van natuurgebieden wordt in sommige delen bos ontwikkeld. De wortels van de bomen verstoren het bodemprofiel en daarmee archeologische waarden.

Toch zal naar verwachting de invloed op archeologie beperkt zijn. De woonheuvels liggen bijna allemaal in de bebouwingslinten en daar worden geen maatregelen getroffen. Het afplaggen van de percelen heeft geen effect op de verstoring van de archeologische waarden, want bij het afplaggen wordt de bodem dieper dan 30 cm onder maaiveld niet verstoord en deze toplaag zal in de meeste gevallen al door het landbouwkundig gebruik verstoord zijn. Bovendien wordt in de alternatieven de bodemdaling geremd ten opzichte van het nulalternatief, zodat archeologische waarden minder snel aan de lucht worden bloot gesteld.

afbeelding 8.1. Gebieden met trefkans archeologische waarden en locaties van de woonheuvels [provincie Zuid-Holland, 2008]



Legenda

★ woonheuvels

archeologische waarden

- Geen kans op archeologische sporen
- Kleine kans op archeologische sporen
- Redelijke tot grote kans op archeologische sporen
- Zeer grote kans op archeologische sporen
- Plangebied

Archeologie

Kans op archeologische sporen

schaal: 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 km


projectcode: GV744-5
 versie: definitief
 datum: 10-06-2009
 getekend: ir. P.H. Roelofs
 goedgekeurd: ir. E.P. de Bruijne

Witteveen **Bos**

nulalternatief

In het nulalternatief wordt een deel van het plangebied ingericht als natuurgebied, maar worden de percelen niet afgegraven. Bij het inrichten van de natuurgebieden wordt weinig of geen bos ontwikkeld waardoor de kans heel klein is op verstoring van de archeologische waarden. Daarnaast wordt in de natuurpercelen de bodemdaling geremd ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt als licht positief beoordeeld.

afbeelding 8.2. Archeologische vindplaatsen in het plangebied [RACM, 2008]



Legenda

Z gebieden op AMK

Plangebied

Archeologische Monumenten

Gebieden op de Archeologische Monumenten Kaart

schaal: 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 km

projectcode: GV744-5
 versie: definitief
 datum: 10-06-2009
 gecoördineerd: E.P. de Bruijn
 geadviseerd: E.P. de Bruijn

Witteveen **Bos**

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In het alternatief 'Grutto en Otter' wordt het gehele plangebied natuur en wordt indien nodig de bovenste laag verwijderd door het af te plaggen of af te graven.

Het inrichten van de natuurgebieden verhoogt de kans op verstoring van de archeologische waarden door het ontwikkelen van bos in het plangebied. Overigens zal slechts in een heel klein percentage van het plangebied (circa 2 %) nieuw bos ontstaan.

Hoe de peilen en daarmee de grondwaterstand in de percelen wijzigen is afhankelijk van welk subalternatief van 'Grutto en Otter' beschouwd wordt. In het subalternatief 'directe peilrealisatie met peilfixatie' zakt de waterstand niet mee met de bodemdaling. In dit subalternatief komt de grondwaterstand niet onder de grondwaterstand in de huidige situatie te liggen. Hierdoor wordt kans op verstoring van de archeologische waarden verkleind. In het subalternatief 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveldddaling volgt' wordt de drooglegging in stand gehouden en zakt het peil mee met de maaiveldddaling. Op de lange termijn kan de grondwaterstand dan wel onder de huidige grondwaterstand komen te liggen. Hierdoor neemt de kans op verstoring van de archeologische waarden op lange termijn toe, maar het gaat langzamer dan in het nulalternatief. Voor het subalternatief 'ingroeimodel' geldt hetzelfde.

alternatief 'Groeind Veen'

In het alternatief 'Groeind Veen' wordt het plangebied natuur en wordt er een drooglegging van 15 cm gerealiseerd. In dit alternatief wordt er niet afgeplagd. Doordat de peilen niet mee zakken met de maaiveldddaling, blijft de grondwaterstand boven de grondwaterstand in de huidige situatie. Er komen daardoor minder archeologische waarden boven de grondwaterstand te liggen dan in de huidige situatie. De kans op verstoring van de archeologische waarden wordt daardoor verkleind. Het te ontwikkelen bos in het plangebied is de enige activiteit waardoor de kans op verstoring van de archeologische waarden wordt verhoogd.

conclusie

De kans op verstoring van archeologische waarden is in het nulalternatief vanwege de snelle bodemdaling het grootste. Daarom wordt de kans op verstoring van de archeologische waarden in het nulalternatief als licht negatief ('0/-') beoordeeld. In de subalternatieven van de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' neemt de kans op verstoring van de archeologische waarden af door dat de bodemdaling afneemt. Echter door afplaggen en het beperkt ontwikkelen van bos in het plangebied neemt deze kans toe. Daarom wordt de kans op verstoring van archeologische waarden als neutraal ('0') beoordeeld. In het alternatief 'Groeind Veen' wordt het peil opgezet en gefixeerd. Dit verlaagt de kans op verstoring van de archeologische waarden. De kans op verstoring van archeologische waarden wordt deels verhoogd door het te ontwikkelen bos. Omdat het bos slechts in beperkte delen van het plangebied ontwikkeld wordt, wordt de kans op verstoring van de archeologische waarden positief beoordeeld ('+').

tabel 8.1. Effectentabel Archeologie

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeind Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveldddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
kans op verstoring archeologische waarden	0	0/-	0	0	0	+

mitigerende maatregelen

Om de schade aan archeologische vindplaatsen te minimaliseren zijn daar de volgende mitigerende maatregelen mogelijk:

- niet afplaggen waar archeologische vindplaatsen dicht onder het oppervlak zitten. Hier kan rekening mee gehouden worden bij de inrichting van de natuurgebieden;
- geen bos aanleggen waar archeologische vindplaatsen dicht onder het oppervlak zitten. Hier kan rekening mee gehouden worden bij de inrichting van de natuurgebieden;
- peilfixatie waar archeologische vindplaatsen mogelijk zijn; bij maaiveldddaling geen peilverlaging doorvoeren.

8.2. Bodem

In deze paragraaf worden de volgende (neven)effecten op de bodem besproken:

- de grondbalans;
- het saneren van slootdempingen;
- het op de kant zetten van bagger.

grondbalans

Een gesloten grondbalans is om meerdere redenen wenselijk. Het aan- of afvoeren van grond buiten het plangebied wordt als zeer negatief beoordeeld vanwege de kosten en milieuschade. Daarnaast dienen de kwetsbare wegen van de Krimpenerwaard zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van zwaar bouwverkeer. Er is grond benodigd in het plangebied voor het saneren van slootdempingen, het ophogen van wegen en het aanleggen van dammen en bermen. Grond komt vrij bij de reguliere baggerwerkzaamheden en bij het afgraven en afplaggen dat in het kader van de natuurontwikkeling plaatsvindt.

slootdempingen

Tussen 1950 en 1980 zijn er in de Krimpenerwaard ruim 5.650 sloten gedempt. Hiervoor zijn ook bodemverontreinigende materialen gebruikt, zoals shredder (afval van scheepswerven en autosloperijen), bouw- en sloopafval, industrieel, lompen, huishoudelijk en bedrijfsafval. Deze materialen bevatten (sterk) verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen zoals bijvoorbeeld zware metalen (cadmium, lood). Deze bodemverontreinigingen vormen een groot milieuprobleem, maar belemmeren ook de grondbiliteit. Daarom is in 1998 door de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard een programma gestart om deze slootdempingen te saneren. Het programma loopt tot 2018 (actief saneren). Daarna vindt er nazorg plaats door handhaving op de saneringsmaatregelen. Overeenkomstig het Bodembeheerplan [Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard, 2005] vinden de saneringen plaats door de deklaag op de locaties aan te vullen tot een bestendige laag van 40 cm schone grond. Afdekken met een verhardingslaag of (gerijpte) bagger behoort ook tot de mogelijkheden.

De stichting Bodembeheer Krimpenerwaard verwacht dat er tot het jaar 2018 nog ongeveer 510.000 m³ grond nodig is voor 85 % van de saneringen en daarna nog eens 65.000 m³ voor de nazorg in de eerste vijf jaar na 2018 [stichting Bodembeheer Krimpenerwaard, 2007]. Het verwachte totaal is dus 575.000 m³, waarmee 85 % van de slootdempingen gesaneerd kan worden. Als 100 % van de slootdempingen gesaneerd wordt, is in totaal 620.000 m³ benodigd. Deze getallen zijn voor de Krimpenerwaard als geheel. Hierbij is rekening gehouden met 30 % verlies bij het verwerken van veengrond.

Het plangebied betreft circa 20 % van de totale Krimpenerwaard, waarbinnen ongeveer 1.130 slootdempingen worden verwacht. De geschatte lengte van deze slootdempingen is 135 km (20 % van totaal aantal slootdempingen in de Krimpenerwaard), daarnaast zijn er nog ongeveer 1,7 ha grote gedempte wateren aanwezig in het gebied (6 % van totaal). Van de geraamde 1130 dempingen in het plangebied zijn er circa 452 potentieel ernstig verontreinigd en waarvan 180 gesaneerd moeten worden. Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van een verontreinigde demping van invloed is op het gehele kavel ten gevolge van sanering en/of nazorg. Dit vergroot de problematiek tot het totale oppervlak van 452 kavels binnen het plangebied.

Het is waarschijnlijk dat de daling van het maaiveld ter plaatse van dempingen (sterk) zal verschillen van het omliggende maaiveld op de percelen. Bepalende factoren zijn de samenstelling van het dempingsmateriaal, het (gemiddelde) volumieke massa en de draagkracht van de ondergrond. Met dit verschijnsel zal bij het opstellen van de inrichtingsplannen rekening moeten worden gehouden.

Het verlagen van het maaiveld door afplaggen zal ter plaatse van verontreinigde dempingen niet mogelijk zijn. Hierdoor zal de sanerende deklaag worden aangetast of zelfs het dempingsmateriaal worden vergraven. Hiermee zal bij het opstellen van de inrichtingsplannen én tijdens de uitvoering rekening moeten worden gehouden.


Een stijging van de grondwaterstand treedt ook op in de dempingen. De effecten en de gevolgen van inundatie van het maaiveld op stoffen in dempingen, zoals het uitlooggedrag, is nog niet bekend. Op grond van studies wordt ervan uitgegaan dat in het veengebied nauwelijks sprake is van stroming van het grondwater. Op enkele plaatsen is echter wel verticale verspreiding van enkele verontreinigende stoffen naar het diepere grondwater geconstateerd

Het uitgangspunt bij het bepalen van het effect van de alternatieven is dat in het plangebied alle 1.130 slootdempingen in overeenkomst bij de stichting kunnen komen en zonodig gesaneerd zullen worden. In de huidige situatie zal dat slechts voor 85 % van deze gevallen gebeuren omdat de eigenaar zich op vrijwillige basis aan moet melden voor het programma van de stichting. De projectalternatieven hebben dus als positief neveneffect dat niet 85 %, maar 100 % van de slootdempingen in het plangebied bij de stichting in beheer komen en zonodig gesaneerd kunnen worden.

De saneringen vinden plaats door de locaties af te dekken met schone grond, zodat na enige jaren gegarandeerd nog een bestendige 40 cm over is van de afdekking. Dit betekent een ophoging van de grond over een geraamd oppervlak van 27 ha, wat 1,1 % is van het oppervlak van het plangebied (2.450 ha). Daarmee zijn de slootdempingen verwaarloosbaar in relatie tot de problematiek van de bodemdaling en het behalen van de natuurdoelen.

.

afbeelding 8.3. Locatie slootdempingen in plangebied



Legenda

- slootdempingen (sloot)
- begrenzing
- slootdempingen (vlak)
- Plangebied

Slootdempingen	
Slootdempingen in het plangebied	
schaal: 0 1 2 3 km	
projectcode: GV774-5	definitief02
versie: 10-06-2009	ir. E.P. de Bruijne
groteind: dr. Ir. R.L.J. Nieuwkamer	gedgekeurd: dr. Ir. R.L.J. Nieuwkamer



baggeren

De gemiddelde jaarlijkse baggeraanwas in de Krimpenerwaard is zo'n 3 tot 4 cm. Uitgaande van circa 300 kilometer hoofdwatgangen met een gemiddelde breedte van 7 meter, is de gemiddelde baggerhoeveelheid 73.500 m³ per jaar in de hoofdwatgangen. Het plangebied is grofweg 1/5 van de totale Krimpenerwaard, zodat de gemiddelde baggeraanwas in de hoofdwatgangen van het plangebied grofweg 15.000 m³ bedraagt. Hiernaast zal bagger uit de overige watgangen moeten worden verwijderd. Uitgaande van 15 % open water in de gehele Krimpenerwaard is de baggeraanwas 635.250 m³ per jaar voor de overige watgangen in de gehele Krimpenerwaard⁷. Voor het plangebied gaat het om 156.500 m³ uit de overige watgangen per jaar⁸. De kwaliteit van de bagger is niet bekend omdat het bepalen hiervan niet noodzakelijk is in agrarisch gebied. Alle bagger wordt daardoor automatisch beoordeeld als verspreidbare bagger en mag verwerkt worden op het land (website hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard). Er wordt vanuit gegaan dat de hoeveelheid bagger niet toe- of afneemt door de herinrichting.

natuureffecten van bagger op de kant zetten

Het op de kant zetten van bagger is ongewenst in natuurgebieden die voedselarm moeten zijn (botanisch grasland en natte natuur). Het op de kant zetten van bagger kan juist positief werken voor weidevogelgraslanden en intensief gebruikte agrarische weilanden vanwege de toevoer van voedingsstoffen. Het beeld is dus genuanceerd. De natuureffecten van bagger op de kant zetten blijven beperkt als de volgende uitgangspunten bij de uitwerking van het beheer in acht worden genomen:

- de bagger is niet verontreinigd (verspreidbare bagger);
- de bagger wordt niet op de kant gezet op botanisch grasland of natte natuur, vanwege de voedselrijkdom van de bagger.

nulmeting

In de huidige situatie komt er alleen grond vrij bij het baggeren van waterbodems. Deze bagger kan gebruikt worden bij het saneren van slootdempingen als deze nabij gelegen zijn. Anders wordt de bagger verspreid over het land. Als er geen bagger beschikbaar is voor slootdempingen, wordt er grond aangevoerd van buiten de Krimpenerwaard. Dit komt in de huidige situatie voor.

nulalternatief

In het nulalternatief krijgt 40 % van de natuur een eigen peilvak. Voor het realiseren van de peilvakken worden gronddammen aangelegd. Voor de aanleg van dammen is grond nodig. Het raamplan [provincie Zuid-Holland, 2007c] geeft aan dat voor de aanleg van de gronddammen 275.000 m³ grond benodigd is. In het nulalternatief wordt voor 14 %⁹ van het plangebied een nieuw peilvak ingericht. Aangenomen wordt dat voor de aanleg van de gronddammen in het nulalternatief 14 % van 275.000 m³ nodig is. Verder is voor de grondbalans aangenomen dat er geen waterlopen gegraven worden en er niet geplagd wordt in het nulalternatief.

Voor de sanering van de slootdempingen is 520.000 m³ (100 %) benodigd. De Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard gaat echter uit dat door klink-, oxidatie- en transportverliezen circa 50 % van het oorspronkelijke veenvolume overblijft voor verwerking in de saneringen. Er is in dat geval 1.040.000 m³ nodig voor de saneringen. De saneringen lopen over ongeveer 10 jaar, dus per jaar is er circa 104.000 m³ bagger nodig voor de saneringen. Hiervoor is binnen het plangebied alleen de bagger beschikbaar en geen vaste grond. Het jaarlijkse baggervolume voor de Krimpenerwaard is circa 700.000 m³ (zie de berekeningen hierboven). Dit is echter bagger in de waterloop gemeten. Voor het afdekken van bodemverontreinigingen moet gerekend worden met ingedroogde of gerijpte bagger.

⁷ 15 % van 13.500 ha = 2.025 ha * 3,5cm = 708.750 m³ minus 73.500 m³ uit de hoofdwatgangen = 635.250 m³ per jaar.

⁸ 20 % van 2.450 ha = 490 ha * 3,5 cm = 171.500 m³ minus 15.000 m³ uit de hoofdwatgangen = 156.500 m³ per jaar.

⁹ In het nulalternatief wordt 35 % van het plangebied natuur. Van deze natuur krijgt 40 % een eigen peilvak. Dit betekent dat 15 % van het plangebied een eigen peilvak krijgt.

Dan blijft er nog maar 20 tot 25 % over van de gebaggerde hoeveelheid; 140.000 tot 175.000 m³, zodat het aannemelijk is dat een deel (en niet alles) van de sanering gedekt kan worden door de bagger uit het plangebied of andere delen van de Krimpenerwaard.

De bagger wordt echter ongeschikt geacht voor het opwerpen van dammen. Er dient grond aangevoerd te worden van buiten het plangebied voor de gronddammen (40.000 m³).

tabel 8.2. Grondbalans Nulalternatief (exclusief bagger)

	benodigde grond in m ³	vrijkomende grond in m ³
waterlopen	0	0
plaggen in reservaatgebieden	0	0
grond dammen (bruto)	40.000	0
benodigd voor sanering slootdempingen	520.000	0
totaal	560.000	0
aan te voeren grond		560.000*

* Naar verwachting deels op te lossen door bagger te benutten. Per jaar kan 140.000 tot 175.00 m³ gerijpte bagger vrij komen in de Krimpenerwaard.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Bij het alternatief 'Grutto en Otter' is er voor de grondbalans geen verschil in de eindsituatie van de verschillende subalternatieven, omdat de subalternatieven alleen verschillen in peilbeheer. Dit heeft effect op de drooglegging van wegen, waardoor het mogelijk is dat sommige wegen opgehoogd moeten worden. De kosten hiervan worden in de volgende paragraaf over infrastructuur berekend. Er is ongeveer 35.000 m³ grond nodig om de wegen op te hogen [Witteveen+Bos, 2007a]. Voor de aanleg van dammen is ook grond nodig. Deze hoeveelheid is nog onbekend en zal nader uitgewerkt worden in het kader van het integraal inrichtingsplan. In dit MER wordt er daarom vanuit gegaan dat de benodigde hoeveelheid ongeveer even groot is als de totale hoeveelheid die bepaald is bij het raamplan (275.000 m³). Wel moet opgemerkt worden dat dit mogelijk een onderschatting betreft voor grond dammen, omdat in het Raamplan veel is uitgegaan van afdammen met betonnen schotten en er mogelijk meer grond moet worden ingezet voor dammen dan toen werd aangenomen. Voor het saneren van slootdempingen is 520.000 m³ (100 %) grond benodigd.

In het alternatief 'Grutto en Otter' wordt ongeveer 600 ha van het plangebied afgeplagd, waarbij 0,15 m van de toplaag af wordt gehaald [Witteveen+Bos, 2007]. Hierbij komt 930.000 m³ grond vrij. Bij het graven van extra water komt nog eens 140.000 m³ grond vrij (zie tabel 8.3). Er komt dus meer grond vrij dan nodig is voor het ophogen van wegen en het saneren van slootdempingen. Er dient 240.000 m³ grond afgevoerd te worden. Deze grond kan ook gebruikt worden om een eventueel tekort aan grond voor dammen op te lossen.

tabel 8.3. Grondbalans voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' (exclusief bagger)

	benodigde vaste grond in m ³	vrijkomende vaste grond in m ³
waterlopen	0	140.000
plaggen in reservaatgebieden	0	930.000
ophogen wegen	35.000	0
grond dammen (bruto)	275.000	0
benodigd voor sanering slootdempingen	520.000	0
totaal	830.000	1.070.000
af te voeren grond	240.000	

alternatief 'Groeidend Veen'

In het alternatief 'Groeidend Veen' wordt de toplaag niet afgeplagd. Ook komt er geen extra water gegraven. Hierdoor komt er dus geen grond vrij voor het ophogen van wegen, voor het aanleggen van dammen en voor het saneren van slootdempingen. Alleen de bagger is beschikbaar. Hiermee kan (een deel van) de sanering van slootdempingen worden uitgevoerd. Aandachtspunt is wel dat dit pas kan na 'rijping' van de bagger en dat kost minimaal 2 jaar hetgeen gevolgen heeft voor de voortgang van de sanering van de slootdempingen in de Krimpenerwaard. De bagger wordt echter ongeschikt geacht voor het ophogen van wegen of het opwerpen van dammen. De overige termen van de grondbalans blijven hetzelfde als in het alternatief 'Grutto en Otter'. Om de grondbalans sluitend te maken dient er grond aangevoerd te worden van buiten het plangebied voor de wegen en gronddammen (310.000 m³). De grondaanvoer voor de saneringen kan verminderd worden door het gebruik van bagger.

tabel 8.4 Grondbalans alternatief 'Groeidend Veen' (exclusief bagger)

	benodigde vaste grond in m ³	vrijkomende vaste grond in m ³
waterlopen	0	0
plaggen in reservaatgebieden	0	0
ophogen wegen	35.000	0
grond dammen (bruto)	275.000	0
benodigd voor sanering slootdempingen	520.000	0
totaal	830.000	0
aan te voeren grond		830.000*

* Naar verwachting deels op te lossen door bagger te benutten voor de sanering van slootdempingen. Per jaar kan 140.000 tot 175.00 m³ gerijpte bagger vrij komen in de Krimpenerwaard.

conclusie

Tabel 8.5 geeft het overzicht van de beoordeling van de grondbalans. De beoordeling van 'Grutto en Otter' is positief, omdat de grondbalans nagenoeg sluitend is. De bij het plaggen vrijkomende grond kan benut worden voor het saneren van de slootdempingen. Er blijft dan zelfs grond over. In de 'Autonome Ontwikkeling' (het nulalternatief) komt geen vaste grond vrij, maar kan bagger worden gebruikt om de slootdempingen te saneren. Voor de aanleg van grond dammen moet vaste grond van buiten het plangebied aangevoerd worden. De beoordeling van 'Groeidend Veen' is negatief, omdat in dit alternatief vaste grond van buiten het plangebied moet worden aangevoerd. Aanbevolen wordt om het baggerprogramma en saneringsprogramma op elkaar af te stemmen (werk met werk maken). Problemen met het op de kant zetten van bagger zijn te verwachten in natuurgebieden die voedselarm moeten zijn, zoals botanisch grasland en natte natuur. Dit speelt zowel in 'Grutto en Otter' als in 'Groeidend Veen'. Overigens zijn de getallen in tabel 8.4 indicatief en zal in het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard de grondbalans verder uitgewerkt worden (voor het gekozen voorkeursalternatief) waarbij ook rekening gehouden zal worden met de gevolgen van nieuw beleid, bijvoorbeeld op het gebied van verspreidbaarheid van bagger.

tabel 8.5. Effectentabel Bodem

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peil-fixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maai-veld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
benodigde gerijpte bagger (m ³)		520.000	0	0	0	520.000
van buiten het gebied aan te voeren vaste grond (m ³)		40.000	0	0	0	310.000
gesloten grondbalans	0	0	++	++	++	-

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeiend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maai-veldddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
mogelijkheden voor saneren slootdempingen	0	0	++	++	++	0
problemen van op de kant zetten van bagger	0	0	-	-	-	-

mitigerende maatregelen

De bagger wordt op een smalle strook langs de sloten op de kant gezet en niet over het hele perceel verspreid bij botanische graslanden. Bij natte natuur kan het uitgangspunt zijn om baggeren zoveel mogelijk te beperken en alleen te baggeren om verlanding tegen te gaan om het karakteristieke verkalingspatroon te beschermen. Risico is wel dat dit kan leiden tot problemen met betrekking tot de waterkwaliteit (met name sulfaat) die kunnen optreden in doodlopende sloten (ook in natuurgebieden).

8.3. Infrastructuur

Ten aanzien van de infrastructuur worden de gevolgen van het inrichten van het natuurgebied op wegen, bruggen, kabels en leidingen beschouwd. Om dit te bepalen is gebruik gemaakt van de notitie Wegenplan natuurgebieden Krimpenerwaard van Witteveen+Bos (2007a).

wegen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hanteert bij reconstructieplannen voor de wegen in de Krimpenerwaard een droogleggingseis van minimaal 60 cm in de maatgevende periode. Deze droogleggingseis is gebaseerd op de CROW-richtlijn voor het voorkomen van schade als gevolg van vorstindringing. De maatgevende periode is daarmee het winterseizoen. De droogleggingseis wordt zodoende gebaseerd op het toekomstig winterpeil.

De gevolgen voor de wegen van het inrichten van de natuurgebieden worden bepaald door per wegvak te bepalen of er voldaan wordt aan de droogleggingseis van het hoogheemraadschap. In welke mate voldaan wordt aan de droogleggingseis is afhankelijk van de mate van peilopzet in de winterperiode. In subalternatief 1 en 2 van 'Grutto en Otter' wordt het peil opgezet tot een drooglegging van ongeveer 20 cm in de winter is bereikt en in 'Groeiend Veen' wordt het peil opgezet tot een drooglegging van ongeveer 15 cm is bereikt. In het subalternatief 'ingroeimodel' van 'Grutto en Otter' wordt het peil minder ver opgezet. Mocht blijken dat er niet aan de droogleggingseis wordt voldaan dan zullen maatregelen moeten worden getroffen om er voor te zorgen om wel aan de droogleggingseis te voldoen.

bruggen

Voor het onderhouden van hoofdwatgangen wordt door het hoogheemraadschap een maaiboot gebruikt. Daarom stelt het hoogheemraadschap een eis aan de doorvaarthoogte van bruggen in de hoofdwatgangen. De geëiste minimale doorvaarthoogte is 65 cm. Door het opzetten van het waterpeil kunnen veel bruggen in de hoofdwatgangen niet meer aan de eis van de minimale doorvaarthoogte voldoen. Als een brug niet meer aan deze eis voldoet kan een keuze gemaakt worden tussen het opheffen van de brug of het verwijderen van de brug. Het verwijderen van een brug kan alleen als er binnen circa 500 m een andere brug gesitueerd is. De optie bestaat om een nieuwe brug hiervoor in de plaats aan te leggen met de minimale doorvaarthoogte van 0,65 m. Voor de verschillende alternatieven en het nulalternatief is een inschatting gemaakt van het aantal bruggen dat opgehoogd, verwijderd of aangelegd dient te worden om aan de eis van de minimale doorvaarthoogte van 65 cm te voldoen.


kabels en leidingen

Dit onderwerp is behandeld in paragraaf 3.3.5.


nulmeting (huidige situatie)

In afbeelding 8.4 staan de wegvakken inclusief verhardingssoort in het plangebied weergegeven. In het plangebied ligt 38,5 km weg. Hiervan heeft ongeveer 27,9 km een toplaag van asfalt, 4,1 km een toplaag van puin en 6,4 een toplaag van gras, gras en puin en gras en asfalt. In afbeelding 8.5 staat de drooglegging per wegvak in de huidige situatie aangegeven. In de huidige situatie voldoet 20 km niet aan de droogleggingseis van het hoogheemraadschap van 0,60 m. In het plangebied liggen door het uitgebreide slotennetwerk veel bruggen voor het bereiken van de landbouwpercelen en bruggen in wegen.

afbeelding 8.4. Onderscheiden wegvakken en verhardingssoort per wegvak huidige situatie



afbeelding 8.5. Drooglegging per wegvak huidige situatie



nulalternatief

In de huidige begroting van het hoogheemraadschap is geld gereserveerd voor het ophogen van de wegen in het plangebied om te voldoen aan de droogleggingseis. Hierdoor kan voor het nulalternatief er van worden uitgegaan dat de wegen in het plangebied gaan voldoen aan de droogleggingseis. Echter, in een deel van het plangebied (14 %) wordt het peil opgehoogd. Wegen die in deze delen gelegen zijn, moeten worden opgehoogd of anders geïsoleerd worden. Dit leidt tot extra kosten. Omdat niet bekend is in welke delen van het plangebied een kleinere drooglegging wordt gerealiseerd, kan nog geen inschatting worden gegeven welke maatregelen getroffen moeten worden om aan de droogleggingseis te voldoen.


In het nulalternatief wordt 14 % van het plangebied natuur met een eigen peilvak. De overige peilvakken blijven ongewijzigd. Er hoeft daarom slechts een beperkt deel van de bruggen in het plangebied opgehoogd of verwijderd te worden. Een eerste indicatie van het aantal bruggen dat aangepast moet worden, wordt gedaan op basis van het percentage van het plangebied waar het peil wordt opgezet en het totaal aantal bruggen dat aangepast dient te worden in de (sub)alternatieven, dit zijn 165 perceelsbruggen, 14 wegenbruggen en 3 landbouwbruggen.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In de subalternatieven 'directe realisatie met peilfixatie' en 'directe realisatie waarbij het peil de maai-veldddaling volgt' wordt in het winterseizoen een drooglegging van ongeveer 20 cm gerealiseerd. Hierdoor voldoet zonder het nemen van maatregelen minder dan 10 km van de 38 km wegvak nog aan de droogleggingseis van 60 cm. Om er voor te zorgen dat de betreffende wegvakken weer voldoen aan de droogleggingseis worden verschillende maatregelen getroffen. De maatregelen in de notitie Wegenplan [Witteveen+Bos, 2007] variëren van het isoleren van wegvakken tot het ophogen van het wegdek. In totaal moet voor meer dan 28 km aan weg maatregelen getroffen worden om deze te laten voldoen aan de droogleggingseis.

In het subalternatief 'ingroeimodel' wordt in het winterseizoen een drooglegging variërend van 19 tot 36 cm gerealiseerd. Dit is een grotere drooglegging dan de drooglegging in de andere subalternatieven van 'Grutto en Otter'. Hierdoor blijven er meer wegen voldoen aan de droogleggingseis van 60 cm. In het alternatief 'ingroeimodel' voldoet ongeveer 14 km van de 38 km aan de droogleggingseis. Voor meer dan 24 km moeten maatregelen getroffen worden om de wegen aan de droogleggingseis te laten voldoen.

afbeelding 8.6. Drooglegging per wegvak in 'Grutto en Otter'



Tabel 8.6 geeft het aantal bruggen dat aangepast dient te worden. In het subalternatief 'ingroeimodel' wordt een grotere drooglegging gerealiseerd dan in de andere subalternatieven, omdat het waterpeil in eerste instantie minder hoog wordt opgezet. Hierdoor is het aantal bruggen dat aangepast moet worden in het 'ingroeimodel' iets kleiner. Daarbij is wel uitgegaan van het winterpeil dat circa 15 cm hoger ligt dan het zomerpeil.

tabel 8.6. Schatting van het aantal bruggen dat aangepast dient te worden

type brug	huidige situatie	voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'			'Groeidend Veen'
		subalternatief 1 'directe realisatie met peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveld daling volgt'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
perceelsbrug	23	165	165	157	165
wegenbrug	2	14	14	14	14
landbouwbrug	0	3	3	3	3

alternatief 'Groeidend Veen'

Voor het alternatief 'Groeidend Veen' wordt ook een drooglegging van 15 cm in de winter ingesteld. Dit is gelijk aan de drooglegging van de subalternatieven 1 en 2 van 'Grutto en Otter'. Hierdoor zijn de effecten op wegen en bruggen in 'Groeidend Veen' gelijk aan de effecten van deze subalternatieven.

Er worden geen graafwerkzaamheden uitgevoerd of percelen afgeplagd in het alternatief 'Groeidend Veen'. Hierdoor bestaat er geen kans op beschadiging van kabels of leidingen of het verkleinen van de gronddekking.

conclusie

Door het opzetten van het peil voldoen de wegen niet overal meer aan de droogleggingseis van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de bruggen niet meer aan de minimale doorvaarthoogte. Zelfs in het nulalternatief moeten al enkele bruggen worden aangepast omdat in een deel van het plangebied het peil wordt opgezet. Het nulalternatief scoort daardoor al licht negatief ten opzicht van de huidige situatie. Het 'ingroeimodel' van 'Grutto en Otter' scoort minder negatief dan de andere alternatieven, omdat het peil minder wordt opgezet. Overigens wordt opgemerkt dat de beoordeling op infrastructuur dubbel is met dat van de kosten, omdat de kosten van infrastructuuraanpassingen in de kosten zijn meegenomen.

tabel 8.7. Effectentabel Infrastructuur

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
gevolgen peilverhoging op wegen, bruggen, kabels en leidingen	0	0/-	--	--	-	--

mitigerende maatregelen

1. Als niet voldaan wordt aan de minimum drooglegging van 60 cm in de winter kunnen wegen worden opgehoogd of hydrologisch geïsoleerd worden. Om aan de minimale doorvaarthoogte te voldoen kunnen bruggen worden weggehaald of worden opgehoogd. Als mitigerende maatregelen kan in overleg met de kabel- of leidingbeheerder een kabel of leiding eventueel worden verplaatst of verdiept.
2. In het ingroeimodel kan er door het hoogheemraadschap voor gekozen worden om het onderhoud van de watergangen en wegbermen alleen plaats te laten vinden in die periodes dat het waterpeil het laagst is. Dat past ook bij de huidige aanpak; het meeste onderhoud vindt voornamelijk plaats in de periode waarin peilen normaliter lager zijn. In dat geval hoeven er in het ingroeimodel geen bruggen opgehoogd te worden en dus ook minder kosten te worden gemaakt. De beoordeling van het ingroeimodel zou in dat geval wijzigen naar '0/-'.

8.4. Kosten

De kosten worden beschouwd vanuit het perspectief van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Het gaat hier dus om een schatting van de kosten die tegen de baten van de natuurontwikkeling kunnen worden afgezet. Dit perspectief betekent dat de grondverwervingskosten buiten beschouwing worden gelaten. Een grondtransactie is immers een uitruil van grond en geld. De overheid wordt geld armer, maar krijgt daar grond voor in de plaats. De grondeigenaar verliest grond, maar krijgt daar geld voor terug. Voor de maatschappij als geheel is er dus sprake van een herverdeling van eigendom (grond en geld), zonder dat er fysiek in het landschap iets verandert. Voor de maatschappelijke kosten-batenanalyse valt dit tegen elkaar weg en is het effect nul. Om die reden zijn hier alleen de kosten van fysieke ingrepen geraamd.

Voor de kostenraming zijn de investeringskosten en de onderhoudskosten voor het grondwerk, de infrastructuur, de waterhuishouding en het natuurbeheer in beschouwing genomen (zie bijlage 7). De kosten van de sanering van slootdempingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Samenvattend zijn in tabel 8.8 de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de alternatieven en het nulalternatief in euro's weergegeven. De investeringen benodigd voor het inrichten van de nieuwe peilgebieden zijn hierin nog niet opgenomen, omdat ze nog onbekend zijn. Deze kosten kunnen worden geraamd als het watergebiedsplan is uitgewerkt en zijn daarom nog op PM gezet. Hier wordt bewust niet een eerste globale schatting gemaakt, omdat deze kosten sterk kunnen fluctueren afhankelijk of er wel of niet een gemaal moet komen, of er wel of niet stuwen moeten worden vervangen, et cetera. De absolute omvang van de PM-post is daarom moeilijk te schatten. Echter, de peilvakindeling is voor alle subalternatieven van 'Grutto en Otter' en van 'Groeidend Veen' gelijk, zodat er weinig verschil in kosten voor herinrichting van het watersysteem zijn te verwachten. Deze kosten hebben daarom geen invloed op de keuze van het voorkeursalternatief. Daarnaast zullen er in het nulalternatief in de toekomst extra kosten moeten worden gemaakt vanwege de effecten van de bodemdaling op de infrastructuur en het onderhoud dat als gevolg hiervan uitgevoerd moet worden. Deze kosten zijn moeilijk te kwantificeren en zijn niet meegenomen in tabel 8.8 waardoor deze een vertekend beeld kan geven voor de kosten van het nulalternatief.

conclusie

Ten aanzien van de projectalternatieven zijn de investeringen voor het alternatief 'Groeidend Veen' het laagst omdat er in dit alternatief weinig grondwerk wordt uitgevoerd. De kosten voor de subalternatieven 'directe peilrealisatie met peilfixatie' en 'directe peilrealisatie waarbij het peil de maaiveldindaling volgt' zijn het hoogst. Dit komt omdat in deze subalternatieven van 'Grutto en Otter' het grootste aantal mitigerende maatregelen genomen moet worden voor de infrastructuur.

Aandachtspunt is verder dat de kosten voor ophogen wegen en bruggen bij het 'ingroeimodel' waarschijnlijk enigszins zijn overschat. Er zit namelijk een kostenverhogende niet-lineaire factor in de kostenraming voor het ophogen van wegen. Als het (toekomstige) verschil tussen het wegniveau en het winterpeil tussen 0,45 m en 0,60 m bedraagt kan worden volstaan met het aanbrengen van een extra laag asfalt. Dit is relatief goedkoop. Zodra het verschil echter kleiner wordt dan 0,45 m en er meer dan 0,15 m moet worden opgehoogd zijn veel duurdere maatregelen nodig zoals amoveren wegdek, aanbrengen nieuwe fundering, plaatsen lichte of juist zware beschoeiingen. In de kostenramingen in 2007 is per wegvak bekeken welk type ophoging en beschoeiing noodzakelijk zal zijn. Naarmate de benodigde ophoging toeneemt nemen ook de kosten toe. Deze toename is niet lineair. De kostenraming per wegvak is van diverse factoren afhankelijk:

- wegfunctie;
- wegbreedte;
- verhardingssoort;
- toplaag;
- bermbreedte.

Bij een nieuwe kostenraming voor het ingroeimodel moet dit allemaal opnieuw per wegvak worden bekeken.

De onderhoudskosten variëren vooral door het areaal natuurgebied en of er wel of niet geplagd wordt. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud voor het alternatief 'Groeidend Veen' het hoogst en in de huidige situatie het laagst. De onderhoudskosten tussen het nulalternatief en de projectalternatieven, verschillen met name als gevolg van het areaal natuur dat onderhouden moet worden. Bij het landschapsbeheer door de landbouw zijn er geen aparte beheerskosten, omdat die in de agrarische bedrijfsvoering zijn opgenomen.

De kostenramingen zijn nog relatief onnauwkeurig, omdat er nog geen inrichtingsplan beschikbaar is. Hiermee is de kostenraming dus vergelijkbaar met die van een verkenningsfase c.q. vroege planfase. Rijkswaterstaat hanteert voor deze fasen een nauwkeurigheid van 30 % (planstudie). Op een investering van EUR 14.800.000,00 van de subalternatieven 1 en 2 is de onzekerheid ongeveer EUR 4.500.000,00.

tabel 8.8. Effectentabel kosten

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
investeringen (EUR)	0,--	3.300.000,-- + PM	14.882.000,-- + PM	14.882.000,-- + PM	12.060.000,-- + PM	9.302.000,-- + PM
onderhoud (EUR/jaar)	713.200,--	1.014.000,--	2.599.000,--	2.599.000,--	2.599.000,--	3.031.000,--
contante waarde van investeringen en onderhoud samen voor een oneindig lange periode bij 5,5 % discontovoet (in miljoenen EUR)	13	22	62	62	59	64

mitigerende maatregelen

In het ingroeimodel kan er door het hoogheemraadschap voor gekozen worden om het onderhoud van de watergangen en wegbermen alleen plaats te laten vinden in die periodes dat het waterpeil het laagst is. Dat past ook bij de huidige aanpak; het meeste onderhoud vindt voornamelijk plaats in de periode waarin peilen normaliter lager zijn. In dat geval hoeven er in het ingroeimodel geen bruggen opgehoogd te worden en dus ook minder kosten te worden gemaakt.

8.5. Landbouw

De volgende effecten op landbouw worden beschouwd: mogelijkheden voor medegebruik door particulieren en agrariërs, opbrengstderving als gevolg van vernatting, schade door ganzen en onkruid en ziekte bij vee door vernatting.

mogelijkheden voor medegebruik van natuurgebieden door particulieren en agrariërs

Bij dit aspect wordt bekeken in welke mate agrariërs, als deelnemer aan particulier natuurbeheer of grondgebruiker van grond in eigendom van een natuurbeherende organisatie, kunnen profiteren van het nieuw in te richten natuurgebied. Het medegebruik van natuurgebieden door particulieren en agrariërs kan bestaan uit het laten grazen van vee in het natuurgebied en het maaien of hooien van gras voor zover dit past binnen het voor het natuurdoeltype benodigde beheer.

opbrengstderving als gevolg van vernatting


Het opzetten van het peil in het plangebied leidt tot een verhoging van de freatische grondwaterstand. Door deze verhoging van de freatische grondwaterstand kan in de omringende landbouwgebieden enige vernatting optreden. Dit is vooral het geval indien de ontwatering van het landbouwperceel beperkt is. Een hogere grondwaterstand in het plangebied kan zo tot enige opbrengstderving in het omringende landbouwgebied leiden. Echter, door het uitgebreide slotennetwerk dat in de Krimpenerwaard aanwezig is, worden de gevolgen van de vernatting beperkt, maar dit kan bij landbouwgebieden direct grenzend aan het plangebied niet met zekerheid worden gesteld. Hier kan enige opbrengstderving door hogere grondwaterstanden optreden. Wanneer sprake is van stijging van de grondwaterstand, wordt de opbrengstderving veroorzaakt door minder gewasopbrengst door natschade en minder draagkracht van de grond [Boland, 1994; Cultuurtechnisch Vademecum, 1988]. Bij de meeste peilgrenzen zal dit risico verminderd worden omdat er direct naast het peilvak een watergang op landbouwpeil gelegen is.

Door het ontbreken van een grondwatermodel¹⁰ kunnen deze aspecten slechts kwalitatief bepaald worden. De mate van opbrengstderving door wateroverlast wordt gerelateerd aan de drooglegging en het peilverschil tussen de verschillende (peil)gebieden.

schade door ganzen

Het aantal ganzen in Nederland is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit geldt ook voor het aantal en de omvang van pleisterplaatsen. De belangrijkste ganzenpleisterplaatsen bevinden zich in laag Nederland en het riviereengebied. Ganzen foerageren vooral op grasland. De bemesting van grasland zorgt voor eiwitrijk gras en een lang groeiseizoen [Planbureau voor de Leefomgeving, 2008, website]. Onderscheid wordt gemaakt tussen effecten van zomer- en winterganzen. Bij zomerganzen kan overlast ontstaan doordat in het natuurgebied broedgebied voor ganzen wordt gecreëerd (met name door moerasontwikkeling) en deze ganzen op de agrarische percelen buiten het natuurgebied foerageren. Bij winterganzen kan overlast ontstaan doordat het natuurgebied minder aantrekkelijk wordt als foerageergebied, omdat dit anders wordt ingericht en minder wordt bemest. Hierdoor wordt de foerageerdruk op agrarische percelen buiten het plangebied groter. Voor zowel zomer- als winterganzen kan worden gesteld dat hoe groter het natuurgebied is, hoe meer ganzen verblijven op de omliggende graslanden waardoor de landbouw meer schade ondervindt door ganzen.

afbeelding 8.7. Toename ganzen in Nederland en hun pleisterplaatsen [PBL, 2008]



¹⁰ Een computerprogramma waarmee grondwaterstromingen en grondwaterstanden worden berekend. Voor de Krimpenerwaard is in het verleden geen rekenmodel gebouwd waarmee de ondiepe grondwaterstromingen kunnen worden berekend.

schade door onkruid

Door het inrichten van de natuurgebieden kan zich onkruid ontwikkelen en vervolgens zich verspreiden naar omliggende landbouwgebieden. Onkruid kan zich onder andere verspreiden via de lucht of via het water. De afstand door de lucht is slechts beperkt. Veel zaden van soorten verspreiden zich over afstanden binnen een straal van 6 meter (Soons et al, 2005). Als de zaden zich via het water verspreiden kan een veel grotere afstand worden afgelegd. Voorbeelden van deze onkruiden zijn ridderzuring en Haagwinde. Omdat de onkruiden open water nodig hebben voor het verspreiden van hun zaden wordt gesteld dat hoe meer open water in het plangebied wordt gerealiseerd hoe groter de kans dat zaden verspreid worden via het open water. Hieruit volgt dat hoe hoger het percentage open water hoe groter de verspreidingsmogelijkheden van de zaden en hoe groter de schade door onkruid. Door de waterstaatkundige scheiding van landbouw- en natuurgebieden in de alternatieven, worden de kansen op verspreiding via water beperkter. Dit is in de beoordeling meegenomen.

De drooglegging heeft ook invloed op onkruid. Echter, dit kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken voor onkruid. Vernatting heeft dus netto gezien geen effect [Kempenaar et al, 2003].

ziekte van vee door vernatting

In het natuurgebied worden gebieden vernat door het verkleinen van de drooglegging. Zoals hierboven reeds beschreven kan dit ook leiden tot enige vernatting van de landbouwpercelen aan de randen van het natuurgebied. Dit leidt tot een grotere kans op voorkomen van veeziektes. De bacterie die rotkreupel veroorzaakt kan zich in natte omstandigheden langer handhaven. Hierdoor neemt de kans op verspreiding van deze ziekte toe. Ook de parasiet leverbot kan zich in natte omstandigheden beter verspreiden [STOWA, 2003]. Omdat zowel binnen als (in een smalle strook) buiten het plangebied vernatting op kan treden, kan de kans op ziekte door vee door vernatting ook zowel binnen als buiten het plangebied toenemen.

nulmeting

In de huidige situatie wordt er nog geen gebruik gemaakt van particulier natuurbeheer. Er zijn wel agrariërs die met stichting Het Zuid-Hollands Landschap afspraken hebben om hun vee te weiden op de gronden die nu al in eigendom zijn van stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

In de huidige situatie is in het grootste deel van het plangebied sprake van lichte kwel of wegzijging. Beide zijn in de orde van 0,10 mm per dag. Alleen een smalle strook aan de noordzijde van het plangebied kent een grotere wegzijging, tot 1,5 mm per dag. In de directe omgeving van het plangebied is de grootte van kwel en wegzijging in dezelfde orde als in het plangebied zelf. De peilgebieden in het plangebied zijn onderdeel van grotere peilgebieden. Hierdoor zijn er slechts beperkt peilverschillen tussen het plangebied en gebieden die buiten het plangebied zijn gelegen.

De Krimpenerwaard bestaat overwegend uit grasland en is dus geschikt als ganzenpleisterplaats. Door het hoge percentage open water, 15 %, kunnen onkruiden met zaden die zich via het water verspreiden, zich goed verspreiden.

Er zijn in de aangeleverde literatuur geen bruikbare gegevens over het voorkomen van veeziektes in de Krimpenerwaard gevonden.

nulalternatief

In het nulalternatief mogen we ervan uitgaan dat particulier natuurbeheer of grondgebruik van grond in eigendom van een natuurbeherende organisatie in de Krimpenerwaard niet of nauwelijks van de grond zal komen. Er komen namelijk niet of nauwelijks gronden beschikbaar waarop dit beheer kan plaatsvinden.

In een beperkt deel van het plangebied wordt het peil opgezet. Dit heeft vooral gevolgen voor gebieden direct gelegen aan peilgebieden met een verhoogd peil.

In gebieden verder van deze peilgebieden wordt de kwel veroorzaakt door het opzetten van het peil afgevangen door sloten en vernatten deze gebieden niet. Hierdoor neemt ook de kans op ziekte bij vee slechts toe bij de graslanden direct gelegen aan gebieden met een verhoogd peil.

In een beperkt deel van het plangebied wordt van de graslanden natuurgebieden gemaakt. Met het realiseren van de natuurgebieden wordt het aantal peilgebieden vergroot, wordt het peil opgezet en worden de graslanden niet meer bemest. Het percentage open water verandert naar verwachting niet, waardoor er geen toename van de schade van onkruid wordt verwacht.

Door de geschetste autonome ontwikkeling (nulalternatief) is een deel van de graslanden minder geschikt voor ganzen. Hierdoor neemt met name de schade door ganzen die in de winter op deze graslanden foerageren op de overige graslanden toe.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In het Natuurgebiedsplan (dat gericht is op het alternatief 'Grutto en Otter') is meer dan 900 hectare aangegeven als zoekgebied voor particulier natuurbeheer. In deze gebieden behoort natuurbeheer door particulieren en agrariërs dus tot de mogelijkheden. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wil, afhankelijk van het natuurdoeltype, begrazing door runderen gaan toepassen in het natuurgebied, maar wil dit met name door vee van agrariërs laten uitvoeren. Met name voor de weidevogelgraslanden en de botanische graslanden, waar begrazingsbeheer binnen het beheer past, zijn er in de Krimpenerwaard daarom goede mogelijkheden voor particulier natuurbeheer en beweiding van natuurgebieden door runderen in het alternatief 'Grutto en Otter'. De verwachting is ook dat deze mogelijkheden deels benut zullen gaan worden. In het alternatief 'Grutto en Otter' zal echter ook op grote schaal (naar verwachting meer dan 600 ha) de met de nutriënten verzadigde bovenlaag afgeplagd worden. Afplaggen heeft de volgende gevolgen voor de mogelijkheden van agrarisch medegebruik:

- minimaal 1 jaar na afplaggen zal de grond niet stevig genoeg zijn voor beweiding;
- direct na afplaggen zal een populatie van pionierplanten ontstaan die vaak niet geschikt is voor begrazing, maar wel gebruikt kan worden voor ruwvoer. Dit effect zal op den duur verdwijnen;
- in de botanische graslanden zal op termijn een nutriëntarmere vegetatie ontstaan die minder voedsaam is voor vee. Door afplaggen zal dit stadium eerder bereikt worden.

De eerste twee punten hebben een licht negatief effect in de ontwikkeltijd naar de nieuwe natuur. Op termijn verdwijnt dat effect. Het laatste punt speelt wel licht negatief door, ook op de langere termijn.

In de subalternatieven van 'Grutto en Otter' worden er nieuwe peilgebieden gecreëerd. De indeling van de peilgebieden zijn in de subalternatieven gelijk en volgen de grens van het plangebied. Hierdoor ontstaan peilverschillen tussen het plangebied en de omringende gebieden. Aan de hand van de ingestelde drooglegging kan ingeschat worden in welke mate opbrengstderving door vernatting kan ontstaan. In tabel 8.9 is per (sub)alternatief de drooglegging in 2033 weergegeven, zoals die in hoofdstuk 5 bepaald zijn. Een kleinere drooglegging leidt tot een groter peilverschil en een groter effect op de grondwaterstand over een groter gebied. Hierdoor is de mogelijke opbrengstderving door vernatting het grootst bij het subalternatief 'directe realisatie met peilfixatie'. Echter, de verschillen zijn klein, zeker bezien over een periode van 25 jaar.

tabel 8.9. Gemiddelde drooglegging van de subalternatieven van 'Grutto en Otter' in 2033

subalternatief	drooglegging (cm)
1. directe realisatie met peilfixatie	29
2. directe realisatie waarbij het peil de maaiveldaling volgt	34
3. ingroeimodel	34

In de subalternatieven van 'Grutto en Otter' wordt het gehele plangebied natuurgebied. In het natuurgebied worden de graslanden minder bemest en zijn daardoor minder geschikt als foerageergebied voor ganzen. Dit zorgt ervoor dat de graslanden buiten het plangebied die in landbouwkundig gebruik zijn, zwaarder worden belast en er op deze graslanden meer schade door ganzen ontstaat. Bovendien zal door de ontwikkeling van natte natuur in dit alternatief geschikt broedgebied voor ganzen ontstaan. Hierdoor zullen in de zomer meer ganzen aanwezig zijn en zal ook hierdoor de graasdruk op de omliggende landbouwpercelen toenemen.

Doordat in het gehele plangebied het peil wordt opgezet neemt het percentage open water toe. Dit leidt tot meer open water en daardoor kunnen zaden die zich via water verspreiden zich beter verspreiden. Hierdoor neemt de kans op schade door onkruid toe. De peilvakken van de natuurgebieden zullen echter wel gescheiden worden van de agrarische peilvakken waardoor de kans op schade door onkruid weer afneemt.

De peilverhoging in het plangebied leidt tot beperkte vernatting in graslanden direct gelegen aan het plangebied. Hierdoor neemt buiten het plangebied niet of nauwelijks de kans op ziekte bij vee door vernatting toe. In het plangebied neemt de kans op ziektes op vee toe door de combinatie van vernatting en de inzet van runderen voor begrazing van het natuurgebied.

alternatief 'Groeidend Veen'

Ook in het alternatief 'Groeidend Veen' zal in het Natuurgebiedsplan een zoekgebied voor particulier natuurbeheer worden opgenomen. In deze gebieden behoort natuurbeheer door particulieren en agrariërs dus tot de mogelijkheden. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wil, afhankelijk van het natuurdoeltype, begrazing door runderen gaan toepassen in het natuurgebied, maar wil dit met name door vee van agrariërs laten uitvoeren. De beheerspakketten zijn voor Groeidend Veen echter lastiger in te passen in particulier natuurbeheer (minder hectares weidevogelgebied en botanisch grasland, waar particulier natuurbeheer goed kan worden toegepast). De verwachting is dan dat er in 'Groeidend Veen' minder gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden van particulier natuurbeheer en beweiding van natuurgebieden door runderen.

In 'Groeidend Veen' wordt dezelfde indeling van peilgebieden als in de subalternatieven van 'Grutto en Otter' gerealiseerd. Het verschil met 'Grutto en Otter' is de te realiseren drooglegging. De gemiddelde drooglegging in 'Groeidend Veen' is 14 cm. De kleine drooglegging leidt tot een groter peilverschil met de omliggende landbouwgebieden en daardoor tot een grotere kans op schade door vernatting.

Ook in het alternatief 'Groeidend Veen' wordt het areaal voor ganzen geschikt grasland om te foerageren door het verminderen van de bemesting verkleind en wordt meer geschikt broedgebied voor ganzen gecreëerd door moerasontwikkeling dan in de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'. Hierdoor neemt de druk van de ganzen op de overige graslanden toe. Dit leidt tot meer schade door ganzen dan in het nulalternatief.

Doordat het peil wordt opgezet neemt het percentage open water toe. Hierdoor kunnen zaden die zich via water verspreiden zich beter verspreiden en neemt de kans op schade door onkruid in de landbouwgebieden toe. De peilvakken van de natuurgebieden zullen echter wel gescheiden worden van de agrarische peilvakken waardoor de kans op schade door onkruid weer afneemt.

Het ophogen van het peil in het plangebied leidt tot beperkte vernatting in graslanden direct gelegen aan het plangebied. Hierdoor neemt de kans op ziekte bij vee door vernatting niet of nauwelijks toe. In het plangebied neemt de kans op ziektes op vee toe door de combinatie van vernatting en de inzet van runderen voor begrazing van het natuurgebied. Omdat beheer door middel van begrazing in het alternatief 'Groeidend Veen' waarschijnlijk minder goed mogelijk is dan in het alternatief 'Grutto en Otter', zal de kans op ziektes bij vee binnen het natuurgebied in totaal ook geringer zijn, maar zal de kans op ziekte per individu groter zijn.

conclusie

De mogelijkheden voor medegebruik van natuurgebieden door particulieren en agrariërs zijn het grootst in het alternatief 'Grutto en Otter', doordat hier veel hectares beschikbaar zijn voor particulier natuurbeheer en de natuurdoelen geschikt zijn voor beweiding door runderen. De kleine negatieve effecten op medegebruik wegen niet op tegen het grote positieve effect van het beschikbaar komen van het grote areaal (900 ha) aan zoekgebied voor particulier natuurbeheer. De mogelijkheden zijn het grootst in de subalternatieven 2 en 3 (beoordeeld met '++'). Subalternatief 1 wordt mogelijk op termijn te nat. Dit is beoordeeld met '+'. In het alternatief 'Groeiend Veen' zullen er wel hectares beschikbaar zijn, maar zijn de pakketten minder geschikt. Dit is beoordeeld met '0/+'. In de huidige situatie en autonome ontwikkeling (nulalternatief) zal er niet of nauwelijks sprake zijn van medegebruik van natuurgebieden door particulieren en agrariërs, omdat er veel minder natuurgebied gerealiseerd zal worden. Dit is beoordeeld met '0'. In deze beoordeling is alleen gekeken naar de mogelijkheden van medegebruik binnen natuurgebieden. Anders zouden de nulmeting en het nulalternatief veel hoger scoren, omdat hierin minimaal 65 % van het grondgebied de primaire landbouwbestemming heeft.

De opbrengstderving door vernatting wordt in de nulmeting neutraal ('0') beoordeeld. Omdat het aantal peilgebieden in het nulalternatief toeneemt, neemt het peilverschil tussen verschillende gebieden toe. Dit beïnvloedt de kwel en wegzijging en leidt in gebieden met een lager peil, die direct gelegen zijn aan gebieden met een verhoogd peil, mogelijk tot enige opbrengstderving door vernatting. Daarom wordt het nulalternatief licht negatief beoordeeld ('0/-'). In de (sub)alternatieven worden de peilgebieden aan het plangebied aangepast en het peil in het plangebied opgezet en/of gefixeerd. Hierdoor ontstaan er peilverschillen tussen de gebieden binnen en buiten het plangebied. Door het uitgebreide slotennetwerk wordt het effect hiervan beperkt tot gebieden direct gelegen aan het plangebied. Het leidt in deze gebieden mogelijk tot enige opbrengstderving door vernatting. In de varianten van het subalternatief 'Ingroeimodel' wordt het peil slechts beperkt opgezet en daardoor worden deze licht negatief ('0/-') beoordeeld. Het subalternatief 'directe peilrealisatie, meezakken met maaiveld' wordt negatief ('-') beoordeeld omdat hier het peil verschil tussen de gebieden gehandhaafd blijft en daardoor de opbrengstderving beperkt blijft. Het subalternatief 'directe peilrealisatie, peil handhaven' en 'Groeiend Veen' worden negatief ('-') beoordeeld omdat de peilen gehandhaafd blijven en daardoor het peilverschil groter worden. Dit veroorzaakt daardoor meer opbrengstderving.

De schade door ganzen en onkruid wordt in de nulmeting als neutraal ('0') beoordeeld. In het nulalternatief wordt een deel van de graslanden in het plangebied omgevormd tot natuurgebied en minder bemest. Dit zorgt ervoor dat een deel van de graslanden minder aantrekkelijk wordt als foerageergebied voor ganzen. Daarnaast zal in het natuurgebied geschikt broedgebied voor ganzen worden gecreëerd. Hierdoor neemt de druk van ganzen op de overige graslanden in het landbouwgebied toe. Dit leidt tot meer schade. Naast het minder bemesten van de graslanden wordt in een aantal gebieden het peil opgezet en het percentage open water verhoogt. Dit zorgt voor betere verspreidingsmogelijkheden voor onkruiden die hun zaden via het water verspreiden. Hierdoor neemt de kans op schade door onkruid toe. Omdat slechts een deel van het plangebied wordt omgevormd tot natuurgebied wordt het nulalternatief licht negatief ('0/-') beoordeeld. In de (sub)alternatieven wordt het gehele plangebied natuurgebied en wordt het percentage open water verhoogd voor de (sub)alternatieven van 'Grutto en Otter' en voor het alternatief 'Groeiend Veen'. De aantrekkelijkheid van graslanden voor ganzen neemt in het gehele plangebied af, maar de weidevogelgraslanden blijven naar verwachting redelijk aantrekkelijk voor ganzen door de lichte bemesting en natte omstandigheden. Netto wordt verwacht dat de druk op andere graslanden toeneemt en zo ook de schade door ganzen. Enerzijds worden de verspreidingsmogelijkheden voor onkruid die hun zaden via het water verspreiden, vergroot door meer open water. Anderzijds zullen de peilvakken van de natuurgebieden gescheiden worden van de agrarische peilvakken waardoor de kans op schade door onkruid weer afneemt. Hierdoor neemt de kans op schade door onkruid licht toe. Dit leidt voor de subalternatieven van 'Grutto en Otter' en het alternatief 'Groeiend Veen' tot een negatieve ('-') beoordeling voor de schade door onkruid en ganzen.

De kans op ziekte bij vee door vernatting wordt in de nulmeting neutraal beoordeeld. In het nulalternatief vernattingen de graslanden direct gelegen aan de peilgebieden waar het peil wordt opgezet nauwelijks. Daardoor is het aantal graslanden dat vernatting beperkt. Hierdoor is de kans op ziekte bij vee door vernatting ook beperkt en wordt het nulalternatief licht negatief ('0/-') beoordeeld. In de (sub)alternatieven wordt het peil in het gehele plangebied verhoogd. Ook hier treedt nauwelijks vernatting op bij landbouwgebieden direct gelegen aan het plangebied. Daardoor treedt bij de rand van het plangebied een licht verhoogde kans op ziekte bij vee door vernatting op. Doordat het gebied waar het peil wordt opgezet in de alternatieven veel groter is dan bij het nulalternatief worden de (sub)alternatieven negatief ('-') beoordeeld.

tabel 8.10. Effectentabel Landbouw

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeiland Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
mogelijkheden voor medegebruik van natuurgebieden door particulieren en agrariërs	0	0	+	++	++	0/+
opbrengstderving door vernatting	0	0/-	-	-	0/-	-
schade door ganzen en onkruid	0	0/-	-	-	-	-
ziekte bij vee door vernatting (onderscheid in natuurgebied en landbouwgebied)	0	0/-	-	-	-	-

mitigerende maatregelen

Mogelijke mitigerende maatregelen zijn:

- gebieden met een verhoogd peil afschermen van gebieden met een landbouwfunctie, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er een watergang op landbouwpeil naast de peilscheiding ligt;
- voor winterganzen is in 2008 in de Krimpenerwaard een foerageergebied begrensd. Binnen dit gebied kunnen agrariërs een 6 jarige overeenkomst afsluiten, waarmee ze een jaarlijkse basisvergoeding per ha krijgen en een schadevergoeding op basis van een taxatie van de schade. Het is wettelijk toegestaan winterganzen in agrarisch gebied buiten de foerageergebieden te verjagen naar de aangewezen foerageergebieden. Indien er toch schade ontstaat door winterganzen in agrarisch gebied buiten de foerageergebieden, dan kan deze via het faunafonds worden getaxeerd en vergoed;
- bevorderen gebruik van vee dat minder gevoelig is voor natte omstandigheden.

8.6. Muggen en knutten

Muggen en knutten kunnen overlast veroorzaken. In dit inrichtingsMER worden de mogelijke effecten beschreven van overlast door:

- steken en het eventueel overdragen van ziekten op mensen door steekmuggen;
- bijten en het eventueel overdragen van ziekten op vee (blauwtong en Afrikaanse paardenpest) door knutten.

Door ontwikkeling van nieuwe natte natuur verbeteren de leefomstandigheden voor muggen en knutten bijlage 8; [Verdonschot, 2008]). Als gevolg daarvan kunnen zij in aantal toenemen. Van overlast is echter pas sprake wanneer zich in een gebied een explosieve ontwikkeling van muggen of knutten voordoet en er daarnaast huizen of stallen in de directe nabijheid aanwezig zijn (binnen een straal van minimaal 60 meter; [Verdonschot, 2008]).

De omstandigheden waaronder zich explosieve ontwikkelingen voordoen zijn, zeker voor steekmuggen, redelijk goed bekend. Daardoor kan er bij de inrichting van nieuwe natte natuur rekening mee worden gehouden om overlast door muggen en knutten te voorkomen.

In bijlage 8 van het bijlagenrapport is achtergrondinformatie opgenomen over dansmuggen, vedermuggen, steekmuggen en knutten en de overlast die zij kunnen veroorzaken. De volgende risicofactoren en -processen zijn relevant voor de Krimpenerwaard, hebben positieve effecten op de ontwikkeling van muggen- en knuttenpopulaties en kunnen daardoor de kans op overlast vergroten:

- afwezigheid van predatoren:
 - muggen en knutten zijn gebaat bij verstoring van het milieu. In situaties van droogval of sterke wisseling van temperatuur en zuurstofgehaltes overleven de muggen eerder dan de predatoren en kunnen de muggenpopulaties sterk groeien. Geschikte habitats zijn droogvallende oevers of stilstaande, ondiepe wateren/plasjes zonder predatoren (waterkevers en vis), en die niet in verbinding staan met grotere wateren (bijvoorbeeld greppels, microreliëf in het landschap door bijvoorbeeld berijding/plaggen/pootafdrukken vee). Vaak zijn deze situaties van korte duur en herstelt de populatie predatoren zich later weer;
- inundatie:
 - wanneer gedurende langere tijd (> 10 dagen) water in een terrein achterblijft, biedt dit een semi-permanent milieu dat geschikt is voor de ontwikkeling van steekmuggen. Het moment in de tijd (voorjaar, zomer of winter), de frequentie en de duur van inundatie in samenhang met het terreinreliëf zijn sterk bepalend voor de permanentie van achterblijvende wateren;
- geen waterbeweging:
 - steekmuggen zijn voor de ontwikkeling van larven en poppen afhankelijk van stilstaand water (geen stroming/weinig wind). Dit geldt minder voor dans- of vedermuggen en knutten;
- opslag van bomen en struiken:
 - opgaande begroeiing is aantrekkelijk door een hogere luchtvochtigheid dan in de omgeving en de mogelijkheid om te schuilen tegen predatoren en wind. Begroeiing kan zo ook fungeren als corridor waarlangs of waardoor muggen en knutten zich door het landschap kunnen verplaatsen;
- verlanding:
 - verlanding is gunstig voor de ontwikkeling van dichte submerse (ondergedoken) en emergente (planten die boven water uitsteken) watervegetaties. Deze vegetatie biedt goede schuil- en ontsnapingsmogelijkheden voor de larven van muggen en knutten. Daarnaast warmen ondiepe wateren sneller op, wat gunstig is voor de ontwikkelingssnelheid van de muggen- en knuttenpopulaties;
- eutrofiëring:
 - muggen en knutten zijn voor hun voeding afhankelijk van algen en plantenresten. Hoe voedselrijker (eutrofer) het systeem, hoe meer voedsel er beschikbaar is voor muggen en knutten. Daarnaast werkt een hoge eutrofiëeringsgraad zuurstofloosheid in de hand. Omdat muggenlarven via een ademhalingsbuis zuurstof uit de atmosfeer halen, zijn muggen in zuurstofloze situaties in het voordeel ten opzichte van hun predatoren.

Naast bovenstaande factoren heeft ook het beheer effect op de muggen- en knuttenpopulaties. Zo veroorzaakt beweiding extra terreinreliëf (pootafdrukken) waar water in kan blijven staan. Aan de andere kant gaat begrazing de ontwikkeling van opgaande begroeiing tegen. Dit is weer negatief voor steekmuggen. In dit kader is ook het maaibeheer van belang. Het effect van baggeren is duidelijker. Dit heeft een negatieve invloed op de populatie van de dans- of vedermug. De larven van deze muggen leven namelijk een groot deel van hun larvenstadia in de bodem. Omdat niet duidelijk is hoe het beheer in de alternatieven precies vorm krijgt en welk netto effect dat uiteindelijk heeft op de risico's op overlast, is het beheer in de beoordeling van de alternatieven niet meegenomen.

Het effect van bovenstaande factoren op het risico op muggen- en knuttenoverlast is samengevat in tabel 8.1 in het bijlagenrapport. Aan de hand hiervan is een kwalitatieve inschatting en beoordeling gemaakt van de kans op overlast door muggen en knutten in de verschillende alternatieven.

nulmeting

Specifieke gevallen van overlast door muggen en knutten in de Krimpenerwaard in de huidige situatie zijn niet bekend. Ook is voor zover bekend bij huidige natuurontwikkelingsprojecten in de Krimpenerwaard geen sprake geweest van overlast door muggen en knutten.

nulalternatief

In het nulalternatief verandert het landschap weinig ten opzichte van de nulmeting. De overlast door muggen en knutten als gevolg van een verandering van het landschap verandert daardoor ook niet of nauwelijks. Nieuwe natte natuur die ontwikkeld wordt op terreinen die reeds in het bezit zijn van stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Bureau Beheer Landbouwgronden (in totaal circa 850 ha), zal afhankelijk van de inrichting en de afstand tot bebouwing de kans op overlast wel doen toenemen.

Klimaatverandering leidt tot uitbreiding van geschikte leefmilieus voor steekmuggen en knutten. Dit komt doordat het warmere klimaat en de nattere winters en heftige zomerbuien tijdens droge, warme zomers bijdragen aan versterkte wisseling van waterpeilen. Als gevolg hiervan kan de kans op overlast door muggen en knutten toenemen.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Voor muggen en knutten zal de ontwikkeling van met name de natuurdoelen botanisch grasland en natte natuur bijdragen aan het creëren van nieuwe habitats. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

- hogere peilen;
- natuurlijke peilen (hoog in de winter en het voorjaar, laag in de zomer) en daardoor meer stagnerend water op de percelen in de winter en in het voorjaar;
- meer water in het algemeen en meer ondiep water met weinig waterbeweging;
- meer opgaande begroeiing;
- meer terreinreliëf en microreliëf (bijlage 8).

Een ongunstige ontwikkeling voor de muggen is het verminderen van eutrofiëring, de mogelijkheid tot stroming in de watergangen en het tegengaan van opgaande begroeiing (regelmatig maaien). Omdat stroming niet overal mogelijk is en vaak maaien niet voor alle natuurdoelen wenselijk of mogelijk is, wordt ingeschat dat netto in het alternatief 'Grutto en Otter' het aantal muggen en knutten mogelijk zal toenemen. Of deze netto ontwikkeling ook direct tot meer overlast leidt, hangt af van de mogelijkheid tot explosieve aantalsontwikkeling enerzijds en de afstand van de habitats tot de bebouwing anderzijds. Een zone van minimaal 60 meter ongeschikt habitat rondom bebouwing kan voldoende zijn om overlast te voorkomen. In sommige gevallen, zoals bij grote oppervlakten stilstaand water, zal er echter een grotere afstand moeten worden gehandhaafd [VWS, 2002]. Bij de precieze inrichting van het plangebied kan men hiermee rekening houden. Het gaat dan om de inrichting rondom de bebouwing van Opperduit, Den Hoek, Achterbroek, Het Beijersche, Goudseweg, Goudarak, Beijersewegje, Oudelandseweg, Haastrecht, Goudarakse en Nesse Tiendweg.

alternatief 'Groeidend Veen'

Voor de risicoverhogende factoren en processen geldt in alternatief Groeiend Veen hetzelfde als voor de voorgenomen activiteit. Met dit ongunstige verschil dat:

- het oppervlak aan natte natuur (water, moeras en natte ruigte) groter is;
- eutrofiëring niet vermindert, maar mogelijk zelfs toeneemt;
- er meer gunstige habitats voor muggen en knutten in de nabijheid van bebouwing komen te liggen.

De instelling van een niet-natuurlijk, vast peil werkt ten opzichte van een natuurlijk peil risicobeperkend voor muggenoverlast.

Dit weegt echter niet op tegen de risicoverhogende factoren en processen. Met name de combinatie van het hoge peil in het groeiseizoen en het extensievere beheer kan leiden tot meer situaties waarbij explosieve aantalsontwikkeling kan optreden. Ook de mogelijkheid van dekking in ruigte en struweel neemt toe.

Hierdoor zal het risico op overlast in dit alternatief ten opzichte van de nulmeting groter zijn dan in de voorgenomen activiteit.

conclusie

De ontwikkeling van natuur in de autonome situatie leidt mogelijk tot een lichte toename van het aantal muggen en knutten. Toename van overlast treedt echter alleen op wanneer er omstandigheden ontstaan waarin de muggen en knutten zich explosief kunnen ontwikkelen én wanneer de geschikte habitats in de nabijheid van bebouwing liggen (minimaal 60 m of meer). De basis voor de beoordeling in tabel 8.11 is het uitgangspunt dat hoe natter het alternatief is, hoe meer kans er is op overlast.

tabel 8.11. Effecttabel kans op overlast door muggen en knutten

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
overlast door muggen	0	0/-	--	-	-	--

mitigerende maatregelen

Mogelijke mitigerende maatregelen zijn:

- voorkomen van het ontstaan van geschikte habitats voor de ontwikkeling van muggen en knutten in de nabijheid van bewoning (afstand van minimaal 60 m of meer) (ontwerpopgave);
- verbeteren van de omstandigheden voor predatoren.

8.7. Wateroverlast voor lintbebouwing

Hier worden alleen de lintbebouwingen die in het plangebied liggen beschouwd, omdat daar de peilen daadwerkelijk veranderen. Het gaat om twee locaties, zie tabel 8.12. Het peil in deze twee peilvakken wordt verhoogd in de alternatieven. Het oppervlak open water neemt weliswaar toe in het plangebied, maar dit weegt niet op tegen de afname van de berging door het opzetten van het peil, waardoor de kans op inundatie toeneemt. Daarnaast zal ook de kans op grondwateroverlast toenemen door het hogere peil. Er zijn op dit moment nog geen situaties bekend van grondwateroverlast. Het is niet bekend of er onderbemalingen aanwezig zijn bij deze gebieden.

tabel 8.12. Locatie lintbebouwing en waterpeilen in plangebied

lintbebouwing	peilvak	huidig peil (m +NAP)	maaiveldhoogte ¹ (m +NAP)
westelijk deel Achterbroek (ca. 25 percelen)	De Nesse en Kattendijksblok	-2.59	circa -2,0
tussen Oudelandseweg en Berkenwoude (ca. 5 percelen)	Oudeland en Berkenwoudse driehoek	-2,26	circa -1,7

¹ Bron: RPS-BCC concept kaart maaiveldhoogte 2008, kaart 6 d.d. 18 december 2008[.

nulmeting

De aanwezige lintbebouwing in het plangebied is niet opgehoogd of hydrologisch geïsoleerd door middel van onderbemalingen of hoogwatervoorzieningen.

nulalternatief

In de autonome situatie neemt de drooglegging van de lintbebouwing en directe omgeving niet af. De peilen worden geïndexeerd en zakken met het maaiveld mee. De (grond)wateroverlast neemt daarom niet toe of af.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

De wateroverlast bij lintbebouwing neemt naar verwachting toe omdat het peil opgezet wordt. De drooglegging neemt met 10 tot 25 cm af bij Oudelandseweg (flexibel peil) en 15 tot 30 cm bij Kattendijksblok. De wateroverlast is afhankelijk van de drooglegging en dus scoren de subalternatieven met de kleinste drooglegging het slechtste.

alternatief 'Groeierend Veen'

De wateroverlast bij lintbebouwing neemt naar verwachting toe omdat het peil opgezet wordt. De drooglegging neemt met 25 cm af bij Oudelandseweg en 30 cm bij Kattendijksblok.

tabel 8.13. Effecttabel wateroverlast lintbebouwing

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
wateroverlast voor lintbebouwing	0	0	--	-	0/-	--

mitigerende maatregel

Om de kans op wateroverlast te verkleinen kan bijvoorbeeld de bebouwing hydrologisch geïsoleerd worden (onderbemaling). In het watergebiedsplan voor de Krimpenerwaard [Osté, 2010] is verder uitgezocht voor welke bebouwing dit noodzakelijk is en waar de peilscheiding moet worden gelegd om de kans op wateroverlast te minimaliseren.

8.8. Vernieuwend ondernemerschap

Vernieuwend ondernemerschap is een veelomvattend begrip waarbij gedacht kan worden aan recreatie, zorg, natuur- en landschapsbeheer, nieuwe vormen van landbouw, etc. In en rond de nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard wordt vooral gedacht aan inkomsten uit recreatie. In de nieuwe natuur is ruimte voor recreatie waar geen verstoringgevoelige natuur aanwezig is. Voor de beoordeling is weidevogelgrasland als verstoringgevoelig aangemerkt en de andere natuur als minder verstoringgevoelig. In beide gebieden zijn onder voorwaarden recreatieve ondernemingen toegestaan. Daarnaast is de verwachting dat het aantal fietsers toeneemt door de aanleg van meer fietspaden. De locatie van nieuwe paden is nog niet bekend en wordt daarom niet meegenomen in de beoordeling. Een ligging aan een huidige weg wordt positief beoordeeld omdat het aantal fietsers daar naar verwachting ook toeneemt.

negatieve beïnvloeding door directe nabijheid van natuur

De ontwikkelingsmogelijkheden van (agrarische) bouwkavels kunnen worden beperkt als gevolg van natuurontwikkeling in de directe nabijheid. Voor de onderbouwing van deze beperking wordt verwezen naar paragraaf 8.9 over het bedrijventerrein Veerstaalblok waarvoor ook een beperking door de natuurontwikkeling ontstaat. De mogelijke beperking voor agrarisch gebruik is hier niet verder beoordeeld, omdat de gewenste vernieuwende agrarische ontwikkeling nog onbekend is.

nulmeting

De inwoners hebben beperkte inkomsten uit recreatie. Bedrijven worden niet beperkt door aangrenzende natuurgebieden.

nulalternatief

Er wordt 35 % van het plangebied omgezet in natuur. Dit biedt kansen voor vernieuwend ondernemerschap. De recreatieve ontsluiting blijft echter achter bij de natuurontwikkeling waardoor deze kansen klein blijven.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

De natuur rond de bebouwing is niet sterk verstoringsgevoelig. De bebouwingslinten zijn bovendien gesitueerd aan doorgaande wegen waardoor deze goed te bereiken zijn voor recreanten.

alternatief 'Groeiend Veen'

De natuur rond de bebouwing is deels niet sterk verstoringsgevoelig (Groene Ruggengraat, mogelijkheden voor bijvoorbeeld wandelen en kanoën) en is deels weidevogelgrasland en daardoor wel verstoringsgevoelig. In het tweede geval zijn er weinig kansen voor vernieuwend ondernemerschap, omdat er in het weidevogelgebied weinig recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden, zullen worden aangelegd. Het is niet aannemelijk dat de ligging van de natuurdoelen gevolgen zullen hebben op de mogelijkheden voor vernieuwend ondernemerschap op de bouwvlakken.

conclusie

De kansen voor vernieuwend ondernemerschap liggen vooral in het alternatief 'Grutto en Otter' omdat de bebouwing langs weinig verstoringsgevoelige natuur is gelegen (beoordeling '+'). Bij 'Groeiend Veen' ligt het grootste deel van de bebouwing nabij weidevogelgrasland en zijn er weinig tot geen kansen voor recreatief ondernemerschap, omdat er weinig recreatieve voorzieningen zullen worden gerealiseerd in de weidevogelgebieden dichtbij de bebouwing (beoordeling '0'). Daarnaast moet nog opgemerkt worden dat de realisatie van natuur en dus de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeiend Veen' ook een positief effect heeft op de leefbaarheid en waardering van de woon- en werkplek. Wonen en werken in of nabij een natuurgebied wordt meestal als zeer positief ervaren. Dit kan een extra impuls betekenen voor de leefbaarheid van het plangebied in het algemeen en vernieuwend ondernemerschap in het bijzonder.

tabel 8.14. Effecttabel vernieuwend ondernemerschap

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeiend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
kansen voor vernieuwend ondernemerschap	0	0	+	+	+	0

8.9. Bedrijventerrein Veerstaalblok

In de polder Veerstaalblok waren aanvankelijk een bedrijventerrein van 9 ha en een ringweg gepland. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is echter uitgesteld tot 2012. Om deze reden worden eventuele effecten voor de mogelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein slechts meegenomen bij de neveneffecten van de natuurontwikkeling. Het effect van de natuurontwikkeling op de mogelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt beoordeeld. Voor deze beoordeling is van belang dat in de huidige situatie het plangebied van het beoogde bedrijventerrein grenst aan de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) waar de natuurontwikkeling in plaatsvindt en dat de gehele Krimpenerwaard deel uitmaakt van het nationaal landschap 'Groene Hart'. In het streekplan staat vermeld dat voor de PEHS sprake is van externe werking. Hiervoor geldt dat activiteiten in de nabijheid van de PEHS niet toegestaan zijn als die een bedreiging vormen voor de kwaliteiten en kenmerken van deze gebieden, tenzij er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en van het ontbreken van alternatieven [provincie Zuid-Holland 2003]. Het bedrijventerrein is echter in dat streekplan al voorzien en daar is deze afweging al gemaakt.

Omdat zowel het natuurgebied als het beoogde bedrijventerrein in het Streekplan al zijn voorzien, is de eerste afweging inzake effecten reeds gemaakt (onder meer in het planMER behorende bij het de partiële herziening Streekplan Zuid-Holland Oost-Krimpenerwaard [provincie Zuid-Holland, 2008]. Dat het natuurgebied nu daadwerkelijk wordt ontwikkeld maakt dat niet anders en heeft dus geen invloed voor wat betreft de status van (P)EHS.

In de nota ruimte is opgenomen dat voor nationale landschappen het 'ja, mits'-regime geldt. Dit houdt in dat ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap blijven behouden of worden versterkt. Zowel het nieuwe natuurgebied als het beoogde bedrijventerrein zijn gelegen in het nationale landschap. Omdat de EHS al is opgenomen in de nota ruimte heeft de status nationaal landschap geen effect op de realisatie van nieuwe natuur. Voor het bedrijventerrein geldt dat dit wel is opgenomen in het streekplan maar nog niet feitelijk ontwikkeld is, daardoor kan de status nationaal landschap effect hebben op het ontwikkelen van het bedrijventerrein. Dit is echter niet het gevolg van de realisatie van nieuwe natuur.

Het bovenstaande neemt niet weg dat er vanuit de soortenbescherming (Flora- en faunawet) wel beperkingen kunnen gelden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein als gevolg van de ontwikkeling van het natuurgebied. Dit is onder meer afhankelijk van welke natuur bij de eerdere afweging was voorzien, welke natuur nu wordt beoogd en hoe de natuur zich in het gebied ontwikkelt.

Uit bovenstaande volgt dat er weliswaar beperkingen gelden voor het bedrijventerrein vanuit de PEHS en de status nationaal landschap, maar dat dit geen negatief effect van de voorgenomen natuurontwikkeling is, omdat de planologische status van het gebied (beschermde natuur) in de huidige situatie al geldt en niet verandert. Wel kunnen er extra beperkingen optreden vanuit de Flora- en faunawet. Daarom wordt een alternatief licht negatief (0/-) beoordeeld als er natuur wordt ontwikkeld in de buurt van het toekomstige bedrijventerrein.

conclusie

Het bedrijventerrein Veerstablok is gepland naast de huidige EHS en heeft daarom beperkingen bij de realisatiemogelijkheden vanwege de bestemmingen die in het streekplan staan aangegeven. Deze beperkingen bestaan nu al op basis van het reeds vastgestelde streekplan, terwijl de natuurontwikkeling nog niet daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit geldt voor alle alternatieven zodat er geen onderscheid te maken is in de beoordeling. De beperkingen uit het streekplan worden licht negatief beoordeeld voor het bedrijventerrein.

tabel 8.15. Effecttabel realisatiemogelijkheden voor het bedrijventerrein Veerstablok

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
effecten van natuurontwikkeling op realisatiemogelijkheden voor het bedrijventerrein Veerstablok	0	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-

8.10. Milieu

8.10.1. Externe veiligheid

Het transport, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen brengen risico's met zich mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke lading vrij kan komen. De discipline externe veiligheid houdt zich bezig met het beheersen van de hieraan verbonden risico's voor mensen die zich in de nabijheid van gevaarlijke stoffen bevinden. Externe veiligheid maakt onderscheid tussen risicobronnen en risico-ontvangers. De risicobronnen zijn in twee groepen te verdelen:

- transportassen, zoals wegen en spoorwegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
- inrichtingen waarin productie, gebruik, verstrekking en/of opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gericht op de bescherming van individuen die zich bevinden in beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten¹¹. Om richting en structuur te geven aan de manier waarop de gemeenten omgaan met de beleidsvrijheid die de regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt, hebben de gemeenten in Midden-Holland een Omgevingsvisie externe veiligheid opgesteld. De Krimpenerwaard ligt in de regio Midden-Holland. De toetsingscriteria zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Onderzocht zal worden of de varianten voor de inrichting van de nieuwe natuurgebieden invloed hebben op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Ten eerste zal worden beoordeeld of er sprake zal zijn van een wijziging van de externe veiligheid voor beide aspecten. Hier wordt een waardeoordeel aan gegeven.

Verder zal ook geconcludeerd worden of deze effecten leiden tot een overschrijding van de normen voor het plaatsgebonden risico en oriëntatiewaarde van het groepsrisico.

het **plaatsgebonden risico (PR)** is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Hoe dichterbij de bron, hoe groter het plaatsgebonden risico.

het **groepsrisico (GR)** is de kans per jaar dat, in het geval van een ongeval met gevaarlijke stoffen, in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt. Hoe meer mensen nabij de bron, hoe groter het groepsrisico.

nulmeting

In afbeelding 8.8 worden locaties van de objecten en de ligging van leidingen weergegeven welke leiden tot een verhoogd risico ten aanzien van externe veiligheid. Nabij het plangebied liggen diverse risicovolle objecten. Dit zijn met name propaantanks, een zwembad (ons polderbad) en ook twee LPG-tankstations, te weten:


- Autofood, Stolwijk (PR 10-6: 35 m);
- Texaco Bergambacht (PR 10-6: 110 m).

Daarnaast liggen er buisleidingen in het plangebied. Deze leidingen zijn in gebruik bij de Gasunie. De grootste kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door graafwerkzaamheden. Diameter en druk zijn onbekend. In Midden-Holland wordt geanticipeerd op het toekomstige beleid. Zo wordt in de gevallen dat er sprake is van een risicorelevante buisleiding in een plangebied een berekening gemaakt van het PR en het GR. De uitkomsten hiervan worden op dezelfde manier gewogen als dat voor het transport van gevaarlijke stoffen gebeurt (Omgevingsvisie externe veiligheid Midden-Holland, 2008). Buiten het plangebied ligt een risicovol object dat invloed kan hebben op de externe veiligheid binnen het plangebied, te weten de Brzo-inrichting Den Hartog BV (gemeente Liesveld).

¹¹ Een onderscheid tussen beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten is gegeven in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen [Bevi, staatssecretaris van VROM, 2005].

Er is nu geen informatie beschikbaar over de contouren van het bedrijf (kan bij de gemeente worden opgevraagd), maar ligt aan de andere kant van de Lek, zodat aangenomen wordt dat er geen recreatieve routes komen.

afbeelding 8.8. Objecten en leidingen die leiden tot een verhoogd risico [bron: risicokaart.nl]



Op basis van de risico-inventarisatie en het risicobeleid, zoals dat onder andere is vastgelegd in het Bevi, de Provinciale nota Risico's in balans en de transportwetgeving kan worden geconcludeerd dat er thans geen knelpunten zijn voor wat betreft het plaatsgebonden risico in de regio Midden-Holland [Omgevingsvisie externe veiligheid Midden-Holland, 2008].

Binnen de regio Midden-Holland is het groepsrisico op een aantal plaatsen significant groot. Dit geldt met name voor delen langs het spoorvak Rotterdam-Utrecht. Dit geldt echter niet voor de Krimpenerwaard. In de Krimpenerwaard is sprake van een lage personsdichtheid en verspreide en activiteiten met een relatief laag risico. Het groepsrisico vormt in de huidige situatie geen knelpunt.

nulalternatief

In het externe veiligheidsbeleid wordt gesteld dat de kans om te verongelukken door een ongeval met gevaarlijke stoffen niet groter dan één op een miljoen mag zijn. Dit betreft het plaatsgebonden risico en heeft vooral betrekking op de veiligheid van de risicovolle activiteit zelf. Het groepsrisico heeft naast de risicovolle activiteit ook betrekking op het aantal personen in de omgeving van die activiteit. Dit beleid geldt voor inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), hogedruk aardgastransportleidingen en transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Wanneer wordt voldaan aan de wet- en regelgeving zal de kans om te verongelukken buiten de inrichting van de risicovolle activiteit door een ongeval met gevaarlijke stoffen niet groter zijn dan één op de miljoen.

Aan deze wet- en regelgeving moet voor 2010 voldaan worden. Het groepsrisico zal, naast door verandering van de risicovolle activiteit vooral toenemen ten gevolge van een toename van het aantal personen in de omgeving van risicovolle activiteiten.

voorgenomen activiteit alternatief 'Grutto en Otter'

Tussen de subalternatieven zijn ten aanzien van de milieuaspecten geen verschillen. Het aantal recreanten in het plangebied neemt toe. Hierdoor zou het groepsrisico toe kunnen nemen. Dit is echter afhankelijk van de locatie, verblijftijd en aantal personen. Het is niet waarschijnlijk dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden.

alternatief 'Groeind Veen'

Tussen de alternatieven 'Groeind Veen' en 'Grutto en Otter' zijn er voor de externe veiligheid geen verschillen in de effectbeschrijving.

conclusie

De norm voor het plaatsgebonden risico zal in geen van de alternatieven worden overschreden. Het is niet waarschijnlijk dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico zal worden overschreden bij de diverse alternatieven. Er zal slechts sprake zijn van een marginale verhoging van het groepsrisico. Ten aanzien van de externe veiligheid is de huidige situatie neutraal ('0') beoordeeld. De verschillende alternatieven worden eveneens neutraal ('0') beoordeeld, omdat:

1. de ontwikkelingen geen invloed hebben op de risicovolle activiteiten zelf;
2. de verhoging van het aantal personen in het plangebied het groepsrisico iets kan laten toenemen, maar dit zal echter zeer gering zijn.

Dit maakt dat deze ontwikkeling ook neutraal wordt beoordeeld.

tabel 8.16. Overzicht effecten externe veiligheid


criterium	nulalternatief (huidige situatie)	autonome ontwikkeling	grutto en otter (voorgenomen activiteit)	groeind veen
overschrijding 10^{-6} PR	nee	nee	nee	nee
effectbeoordeling PR	0	0	0	0
overschrijding OW GR	onwaarschijnlijk	onwaarschijnlijk	onwaarschijnlijk	onwaarschijnlijk
effectbeoordeling GR	0	0	0	0

8.10.2. Geluid en licht

nulmeting geluid

Het huidige geluidsniveau in het plangebied ligt onder het niveau wat als hinderlijk wordt beschouwd. Geluidshinder wordt ervaren bij geluiden boven de 50 decibel [RIVM, 2008, website]. In de Krimpenerwaard zijn stiltegebieden aanwezig, deze zijn aangegeven op afbeelding 8.9.

afbeelding 8.9. Ligging provinciaal stiltegebieden in Krimpenerwaard



nulmeting lichthinder

Er zijn in de huidige situatie weinig activiteiten welke lichthinder veroorzaken.

tabel 8.17. Aantal kilometer beschikbare weg voor recreatief verkeer

type weg	huidige situatie	toename aantal kilometer alle alternatieven ¹²	procentuele toename ten opzichte van huidige situatie (%)
wandelpad	21	32 - 70	150 - 330
fietspad	209	43	21

nulalternatief

De algemene trend ten aanzien van geluid en licht is een toename. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het wegverkeer. Hieruit wordt gesteld dat in het nulalternatief er een toename van het geluidsniveau plaatsvindt in het plangebied. Naast geluidsoverlast veroorzaakt het wegverkeer ook lichthinder. Daarom wordt in het nulalternatief een toename van lichthinder in het plangebied verwacht [PBL, 2008].

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' en alternatief 'Groeidend Veen'

Mogelijk leidt het uitbreiden van recreatiemogelijkheden met verlichte fietspaden tot meer lichthinder. Voor het beoordelen van de mate van lichthinder wordt daarom de uitbreiding van het aantal kilometer fietspaden beschouwd. Overigens is het nu nog niet bekend of de nieuwe fietspaden in de natuurgebieden daadwerkelijk verlicht zullen worden. Met het inrichten van het plangebied als natuurgebied wordt een extra impuls beoogd voor de recreatie in de Krimpenerwaard.

¹² Dit is een wens vanuit de recreatievisie waarvan het ten eerste maar de vraag is of deze gerealiseerd kan worden en ten tweede geldt voor de gehele Krimpenerwaard en niet alleen het plangebied (20% van de gehele Krimpenerwaard).

Dit leidt tot extra recreatie in de Krimpenerwaard en tot extra geluid ten gevolge van recreatie. Het aanleggen van fiets- en wandelpaden leidt tot meer recreatief verkeer en tot een hoger geluidsniveau. De mate van de toename van het geluidsniveau wordt daarom gekoppeld aan het aantal kilometer uitbreiding van fiets- en wandelpaden. Echter door het ontbreken van gegevens over het geluidsniveau veroorzaakt door fiets- en wandelpaden kan de toename van het geluidsniveau niet kwantitatief bepaald worden en alleen maar een indicatie gegeven worden. Hierdoor kan ook de invloed van geluid op de provinciale stiltegebieden slechts beperkt beschouwd worden.

De toename van het aantal kilometer fiets- en wandelpaden is hetzelfde in de verschillende subalternatieven. De toename staat aangegeven in tabel 8.17. De toename van het aantal kilometer paden beschikbaar voor recreatief verkeer leidt tot een hoger geluidsniveau en mogelijk tot lichthinder (fietspaden). Daarnaast is het denkbaar dat de geluidsproductie door verkeer dat in de huidige situatie verbonden is met de agrarische functie van het gebied (trekkers en bevoorravingsverkeer) afneemt. In welke mate is onbekend.

8.10.3. Atmosferische depositie

Depositie wordt veroorzaakt door de uitstoot van stikstof door veestallen, industrieën en het bemesten van land. De depositie op een bepaalde locatie wordt veroorzaakt door lokale en niet-lokale bronnen. Door het wegnemen van lokale bronnen wordt depositie verminderd tot de achtergrondwaarde.

Het wegnemen van bronnen kan dus lokaal effect hebben en de depositie verminderen. Dit betreft vooral bronnen van ammoniak, omdat ammoniak op geringe hoogte wordt uitgeworpen en een hoge depositiesnelheid heeft [PBL, 2008a]. Daarnaast draagt het bij tot het verminderen van de algehele uitstoot van stikstof en leidt daarmee tot een vermindering van de achtergrondwaarde. Het wegnemen van ammoniakbronnen wordt daarom als positief beschouwd.

nulmeting

In de huidige situatie is de jaarlijkse depositie in de Krimpenerwaard gelijk aan 30,8 kg/ha ammoniak [PBL, 2008]. Dit is vergeleken met gebieden in de omgeving van de Krimpenerwaard licht hoger. De verhoging wordt veroorzaakt door een hogere ammoniakuitstoot dan in gebieden in de omgeving van de Krimpenerwaard. De uitstoot van ammoniak wordt voor 90 % veroorzaakt door de landbouw. Deze uitstoot vindt plaats bij het uitrijden van mest, het gebruik van kunstmest, de stallen en de opslag van mest en de beweiding. De emissie door het uitrijden van mest, stallen en opslag van mest ligt significant hoger dan de emissie van beweiding en het gebruik van kunstmest.

nulalternatief

In het nulalternatief neemt de uitstoot van ammoniak af doordat het landbouwareaal wat bemest wordt, kleiner wordt.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' en alternatief 'Groeierend Veen'

Ten aanzien van depositie is er geen verschil tussen de verschillende (sub)alternatieven. Door het omvormen van landbouwgebieden in natuurgebieden neemt de depositie in het plangebied verder af. De uitstoot van stikstof door het bemesten van de percelen wordt sterk gereduceerd.

8.10.4. Lucht

Ten aanzien van de luchtkwaliteit spelen twee effecten:

- de mate van fijnstofafvang door planten en bomen;
- de verandering van de CO₂-uitstoot als gevolg van veenoxidatie.

Door het realiseren van natuur kan het fijnstofgehalte afnemen doordat begroeiing fijnstof kan afvangen. De capaciteit om fijnstof af te vangen is afhankelijk van het type natuur dat ontwikkeld wordt. In tabel 8.18 wordt de capaciteit van het afvangen van fijn stof gegeven voor diverse typen natuur. Een grotere capaciteit voor het afvangen van fijnstof wordt positief beoordeeld.

tabel 8.18. Capaciteit fijnstofafvang per natuurtype [Witteveen+Bos, 2006]

natuurtype	fijnstofafvang (kg stof per ha per jaar)
grasland	niet van toepassing
riet/ ruigte	10
loofbos	110 - 190

Bij het oxidatieproces van veen komt het broeikasgas CO₂ vrij. Dit wordt ten aanzien van de klimaatsverandering als negatief ervaren. Door het veranderen van de drooglegging wordt de mate van veenoxidatie beïnvloed. Hoe groter de drooglegging hoe meer veen oxideert (Van der Meulen et al, 2006) en hoe meer CO₂ vrijkomt [Goosen et al, 1996]. Het verkleinen van de drooglegging zorgt voor minder veenoxidatie en leidt daardoor tot minder uitstoot van CO₂. Een vermindering van de drooglegging wordt zodoende als positief beschouwd ten aanzien van CO₂ uitstoot van veenoxidatie.

Bij de afbraak van organisch materiaal onder zuurstofarme omstandigheden zoals afbraak van veen onder water ontstaat methaan (CH₄). Methaan is een sterker broeikasgas dan CO₂ en het opwarmings-effect van 1 kg methaan is 23 keer sterker dan van 1 kg CO₂. In het onderzoeksprogramma 'Klimaat voor Ruimte' is onderzocht welk gevolg peilopzet en (natuur)beheer hebben op de productie van methaan. Uit het onderzoek blijkt dat er geen toename is van methaan op weidevogelgraslanden met een flexibel peil (vergelijkbaar met de situatie van de weidevogelgraslanden in het alternatief 'Grutto en Otter'). Uit onderzoek in een moerasnatuurgebied, vergelijkbaar met de natte delen van de Groene Ruggengraat in het alternatief 'Grutto en Otter' en grote delen van het plangebied in het alternatief 'Groeiend Veen') bleek dat de uitstoot van methaan gecompenseerd werd door de verminderde uitstoot van CO₂ [Woestenburg, 2009].¹³

nulmeting

Het fijnstofgehalte in de Krimpenerwaard bedraagt tussen de 25 en 30 µg/m³. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 25 µg/m³, maar beneden de grenswaarde van 40 µg/m³ [PBL, 2008]. Het huidige grasland kan dit fijnstof niet afvangen.

In de huidige situatie is de gemiddelde drooglegging in het plangebied 48 cm (zie paragraaf 5.1). Deze drooglegging leidt tot een significante bodemdaling door veenoxidatie. Bij de veenoxidatie komt CO₂ vrij.

nulalternatief

Een deel (35 %) van het plangebied wordt omgezet van landbouwgebied in natuurgebied. Dit is circa 850 ha. Hiermee wordt de fijnstofafvangcapaciteit van het plangebied verhoogd. In het nulalternatief zal vooral botanisch en weidevogelgrasland ontwikkeld worden in de natuurgebieden. Hierdoor neemt de fijnstofafvangcapaciteit waarschijnlijk beperkt toe. 14 % van het plangebied krijgt eigen peilvak met 'natuurpeil'. Daardoor is er dus een kleine afname van de veenoxidatie.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Het verschil in drooglegging tussen de subalternatieven leidt tot een andere mate van oxidatie van veen en daarmee tot een andere uitstoot van CO₂. In tabel 8.9. is per subalternatief de gemiddelde drooglegging aangegeven.

De capaciteit voor het afvangen van fijnstof is voor de subalternatieven aan elkaar gelijk. Dit komt doordat de inrichting van het plangebied voor de subalternatieven niet van elkaar verschillen. De fijnstofafvangcapaciteit voor de voorgenomen activiteit wordt op basis van de oppervlaktes in tabellen 3.3 en 3.4 en capaciteit fijnstofafvang vermeld in tabel 8.18 ingeschat op 18.000 kg/jaar.

¹³ In dit MER is geen rekening gehouden met de productie van methaan.

alternatief 'Groeidend Veen'

Tussen het alternatief 'Groeidend Veen' en de voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' is voor de aspecten depositie, geluid, lichthinder en externe veiligheid geen verschil in de effectbeschrijving. Alleen ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit zijn er verschillen met de voorgenomen activiteit.

Dit betreft zowel de fijnstofafvangcapaciteit als de CO₂-uitstoot als gevolg van veenoxidatie. Door het ontwikkelen van andere typen natuur in het plangebied is de fijnstofafvangcapaciteit hoger dan bij de subalternatieven van 'Grutto en Otter'. De jaarlijkse fijnstofafvang voor het alternatief 'Groeidend Veen' is met behulp van kentallen berekend op 19.000 kg/jaar. Dit komt doordat er meer ruigte worden gecreëerd.

De CO₂-uitstoot door oxidatie van veen neemt fors af door de zeer kleine drooglegging in dit alternatief, de gemiddelde drooglegging is namelijk 14 cm.

conclusie

Door het beperkt ontwikkelen van het natuurgebied wordt de atmosferische depositie in het plangebied in het nulalternatief niet beïnvloed. Echter, de uitstoot van stikstof wordt wel beïnvloed door het niet meer bemesten van de percelen. Daarom wordt het nulalternatief licht positief ('0/+') beoordeeld en de projectalternatieven positief ('+').

Door het beleid van de overheid wordt de externe veiligheid verhoogd en daarom wordt het nulalternatief positief ('+') beoordeeld. Door het verhogen van het aantal personen in het plangebied neemt het risico van reeds aanwezige activiteiten in het plangebied toe. Dit maakt deze positieve ontwikkeling in het nulalternatief ongedaan. Hiertoe worden de projectalternatieven als neutraal ('0') beoordeeld.

Ten aanzien van geluid en licht wordt door de autonome toename van het wegverkeer het nulalternatief als licht negatief (0/-) beoordeeld. De projectalternatieven worden negatief ('-') beoordeeld omdat door het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden het recreatief verkeer in het plangebied toeneemt.

Het fijnstofgehalte in de huidige situatie ligt boven het landelijk gemiddelde en de fijnstofafvang van de huidige begroeiing is zeer klein. Daarnaast is de drooglegging groot en daarmee de mate van veenoxidatie en de CO₂-uitstoot door veen hoog. In het nulalternatief neemt de fijnstofafvang door het beperkt ontwikkelen van natuur iets toe. De drooglegging en daarmee de CO₂-uitstoot door veen, vermindert iets. Dit heeft tot gevolg dat de beoordeling van het nulalternatief licht positief ('0/+') wordt. Bij de verschillende sub(alternatieven) varieert de beoordeling tussen positief en zeer positief. Het subalternatief 'directe realisatie met peilfixatie' en het alternatief 'Groeidend Veen' worden zeer positief ('++') beoordeeld. In deze (sub)alternatieven wordt de afvang van fijnstof verhoogd door het ontwikkelen van het natuurgebied en de CO₂-uitstoot wordt sterk verminderd door het instellen van een kleine drooglegging. De overige subalternatieven worden positief ('+') beoordeeld omdat de afvang van fijnstof verhoogd wordt, maar de drooglegging slechts beperkt wordt verkleind.

tabel 8.19. Effectentabel Milieu

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
atmosferische depositie	0	0/+	+	+	+	+
externe veiligheid	0	+	0	0	0	0
geluid (invloed op provinciaal stiltegebied)	0	0/-	-	-	-	-
lichthinder	0	0/-	-	-	-	-
luchtkwaliteit (fijnstofafvang, CO ₂ uitstoot door veen)	0	0/+	++	+	+	++

mitigerende maatregelen

Mogelijke mitigerende maatregelen zijn:

- maaisel dat niet als ruwvoer wordt gebruikt kan mogelijk worden ingezet als grondstof voor bio-brandstof.

8.11. Natuur

8.11.1. Aantasting actuele natuurwaarden

Het ontwikkelen van natuur is één van de hoofddoelstellingen van de in dit MER beoordeelde alternatieven. Omdat de projectalternatieven primair gericht zijn op het ontwikkelen van natuur, zijn effecten veelal in meer of mindere mate positief beoordeeld.

De alternatieven kunnen in potentie echter ook negatieve effecten op actuele natuurwaarden hebben. Dit is in deze paragraaf beoordeeld aan de hand van effecten op door de Flora- en faunawet zwaar beschermde soorten (zogenaamde tabel 3 soorten) die voorkomen in de Krimpenerwaard. Effecten op minder zwaar en licht beschermde soorten (tabel 1 en 2-soorten) zijn hier niet beschouwd, omdat ze (in aanvulling op zwaar beschermde soorten) niet onderscheidend zullen zijn bij de beoordeling van alternatieven. Tabel 2-soorten dienen bij de beoordeling of een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig is overigens wel te worden meegenomen. Overige effecten op natuur, zoals effecten op weidevogels en weidevogelgebieden en effecten op wintergasten, zijn reeds in hoofdstuk 4 behandeld.

Negatieve effecten op deze beschermde soorten kunnen optreden wanneer:

- er habitats van beschermde soorten verdwijnen, doordat een ander type natuur wordt ontwikkeld dan in de huidige situatie aanwezig is;
- de inrichtingswerkzaamheden (tijdelijk) negatieve effecten hebben op de in het gebied voorkomende (beschermde) soorten.

De effecten op bestaande agrarische gebieden met hoge weidevogelwaarden zijn reeds opgenomen in hoofdstuk 6.

nulmeting

In tabel 8.20 zijn de soorten opgenomen die in tabel 3 van de Flora- en faunawet of bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan en voorkomen in de Krimpenerwaard. Deze soorten vallen onder het zware beschermingsregime van de Flora- en faunawet. De soortenlijst is gebaseerd op gegevens van de provincie Zuid-Holland.

tabel 8.20. Zwaar beschermde soorten in de Krimpenerwaard. Per soort is aangegeven of deze is opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet of bijlage IV van de Habitatrichtlijn, wat de status van de soort op de Rode lijst is, of de soort in het plangebied is waargenomen of buiten het plangebied (maar wel in de Krimpenerwaard) en welke habitats voor de soort van belang zijn

soort	tabel 3 Flora- en faunawet / bijlage IV Habitatrichtlijn	Rode lijst	voorkomen binnen of buiten plangebied	habitats
bever	HR		buiten	water en moeras
waterspitsmuis	3	kwetsbaar	binnen	water en moeras
watervleermuis	HR		buiten	water en moeras, verblijfplaats in bomen
meervleermuis	HR		buiten	water en moeras, verblijfplaats in gebouwen
gewone dwergvleermuis	HR		binnen	water, moeras, bos, stedelijke omgeving, verblijfplaats in gebouwen
ruige dwergvleermuis	HR		binnen	water, moeras, bos, stedelijke omgeving, open gebied, verblijfplaats in gebouwen en bomen
laetvlieger	HR		binnen	water, moeras, bos, stedelijke omgeving, open gebied, verblijfplaats in gebouwen
rosse vleermuis*	HR		binnen	water, moeras, bos, open gebied, verblijfplaats in bomen
gewone grootvleermuis	HR		binnen	water, moeras, bos, stedelijke omgeving, verblijfplaats in gebouwen en bomen
rugstreepd	HR		binnen	zandige terreinen, veengebieden, ondiepe snel opwarmende wateren
ringslang (uitgezet)	3	kwetsbaar	binnen	water en moeras
bittervoorn	3	kwetsbaar	binnen	plantenrijk water met zoetwatermosselen
groene glazenmaker	HR	bedreigd	binnen	water met krabbenscheervegetatie
riwierrombout	HR	ernstig bedreigd	buiten	rivieren en grote beken, vooral op plaatsen waar zand of slib is afgezet
platte schijfhoen	HR		binnen	voedselrijk en plantenrijk stilstaand water

* Er bestaat onduidelijkheid of de rosse vleermuis daadwerkelijk voorkomt in de Krimpenerwaard.

nulalternatief

In het nulalternatief vindt geen grootschalige verandering van de habitats van de voorkomende zwaar beschermde soorten plaats. De inrichting van de reeds verworven natuurgebieden zal per saldo geen negatieve en voor de meeste soorten positieve effecten hebben op het voorkomen van deze soorten, omdat het areaal geschikt habitat wordt uitgebreid. Tijdens de inrichting van deze terreinen vinden werkzaamheden plaats, waaronder graafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk negatieve effecten op beschermde soorten hebben, bijvoorbeeld doordat soorten worden verstoord of verblijfplaatsen worden vernietigd. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het voorkomen van beschermde soorten op de locatie van de werkzaamheden moet hiervoor mogelijk een ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd. De verwachting is dat deze ontheffing kan worden verkregen, omdat de duurzame staat van instandhouding van de soorten niet in gevaar komt.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In dit alternatief zal in de Groene Ruggengraat onder andere open water en moeras ontwikkeld worden. Dit heeft positieve effecten op soorten van open water en moeras zoals bever en waterspitsmuis. Ook op andere soorten heeft de inrichting van de Groene Ruggengraat positieve effecten, zoals ringslang, groene glazenmaker en bittervoorn.

Een deel van deze soorten is ook doelsoort waar het ontwerp voor de Groene Ruggengraat op wordt gebaseerd. Realisatie van de Groene Ruggengraat heeft voor deze soorten dus positieve effecten. Net als in het nulalternatief geldt ook hier dat, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden voor de inrichting van het natuurgebied, mogelijk wel een ontheffing nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. De verwachting is ook hier dat deze ontheffing kan worden verkregen, omdat de duurzame staat van instandhouding van de soorten naar verwachting niet in gevaar komt of zelfs wordt verbeterd.

Effecten op vleermuizen zijn met name te verwachten wanneer oude holle bomen, gebouwen of opgaande lijnvormige elementen worden verwijderd. Geen van deze maatregelen zullen bij inrichting van het natuurgebied in dit alternatief worden genomen, waardoor hier geen negatieve effecten optreden. Een aantal soorten heeft baat bij open gebieden, waaronder de meervleermuis (open water) en de laatvlieger. De realisatie van de Groene Ruggengraat zal de openheid van het plangebied beperken. Bij de realisatie van de Groene Ruggengraat wordt echter de hoeveelheid lijnvormige opgaande begroeiing vergroot, evenals het wateroppervlak. Per saldo wordt hiervan een positief effect verwacht op genoemde soorten.

Voor vogels geldt met name dat broedende vogels niet mogen worden verstoord. De werkzaamheden ten behoeve van de inrichting zullen hier op moeten worden aangepast. Nesten van vogels die elk jaar opnieuw worden gebruikt, worden voor de Flora- en faunawet gezien als vaste rust- en verblijfplaats. Voor het vernietigen van deze nesten is een ontheffing nodig. Vernietigen is hier echter niet aan de orde, omdat het verwijderen van bomen of gebouwen waar deze nesten zich in kunnen bevinden niet aan de orde is.

alternatief 'Groeierend Veen'

Voor dit alternatief geldt een soortgelijke redenering als bij Grutto en Otter. Dit wil zeggen dat ook de inrichting van het alternatief 'Groeierend Veen' een positieve bijdrage zal hebben aan het voorkomen van (zwaar) beschermde soorten in de Krimpenerwaard.

In paragraaf 6.1 is gemotiveerd dat de kwaliteit, variatie en zeldzaamheid van de te ontwikkelen habitats of natuurdoeltypen in dit alternatief lager zijn dan in het alternatief Grutto en Otter. Met name voor de meer kritische soorten zoals groene glazenmaker kan dit een minder positief effect hebben in het alternatief Groeierend Veen.

Voor vleermuizen worden niet of nauwelijks verschillen tussen Grutto en Otter en Groeierend Veen verwacht, omdat er geen belangrijke verschillen zitten in de landschapselementen die door deze dieren worden benut in de beide alternatieven.

conclusie

In het nulalternatief treden licht positieve effecten voor zwaar beschermde soorten op door de inrichting van reeds verworven natuurerreinen. In het alternatief Grutto en Otter treden positieve effecten op door ontwikkeling van geschikte habitats voor de aanwezige zwaar beschermde soorten, onder andere door realisatie van de Groene Ruggengraat. In het alternatief Groeierend Veen treden licht positieve effecten op, doordat wel geschikte habitats zullen worden ontwikkeld, maar deze een lagere kwaliteit zullen hebben dan in het alternatief Grutto en Otter (zie hiervoor ook paragraaf 6.1). Met name voor de meer kritische soorten heeft dit een minder positief effect.

8.11.2. Invloed op Vogel- en habitatrictlijngebieden ten noorden en zuiden van de Krimpenerwaard

In de omgeving van de Krimpenerwaard liggen drie Natura 2000-gebieden (afbeelding 8.10):

- Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein:
 - Het gebied ligt in een nat graslandgebied met klei-op-veengronden. Polder Stein, in de nabijheid van Reeuwijk, herbergt momenteel het laatste belangrijke restant in West-Nederland van de hier ooit wijd verspreid voorkomende hooilanden met wilde kievitsbloem. Het open water en de graslanden dienen als foerageer- en rustgebied voor watervogels, met name kleine zwaan en smient. Daarnaast is het gebied van enige betekenis voor krakeend en slobend (Broekvelden/Vettenbroek).
- Boezems Kinderdijk:
 - Het gebied omvat de hoge boezems van de Nederwaard, de Overwaard en Nieuw-Lekkerland alsmede delen van de aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-Lekkerland. De boezems bestaan uit open water, riet- en zeggemoerassen, ruigten, grienden, struwelen en boezemkaden. De polders bestaan uit wei- en hooilanden, doorsneden door sloten. Het gebied is een belangrijk broedgebied van soorten van rietmoeras (purperreiger en snor) en is van enig belang als broedgebied voor de porseleinhoen, een broedvogel van geïnundeerde kruidenvegetaties. Daarnaast zijn de boezems van enige betekenis als overwinterings- en rustgebied voor grondeleenden (smient, krakeend en slobend).
- Donkse laagten:
 - Het gebied bestaat uit vochtige en natte voedselrijke graslanden die deels als cultuurgrasland, deels als halfnatuurlijk grasland in gebruik zijn. Kleine delen van het gebied zijn ingericht als schraalgraslanden, gelegen in de nabijheid van een zandopduiking (donk). De graslanden worden doorsneden door een boezemkanaal (Grote of Achterwaterschap). Het gebied is vooral van belang als slaapplek voor kolganzen die zowel in het gebied als in de wijde omgeving voedsel zoeken.

Het is gebruikelijk om bij de beoordeling van effecten op Natura 2000-gebieden te kijken naar de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen die voor een gebied zijn opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in bijlage 10.

afbeelding 8.10. Natura 2000-gebieden in de omgeving van de Krimpenerwaard met: 1) Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein; 2) Boezems Kinderdijk; 3) Donkse laagten



[Google Maps pro].

nulmeting

Het is zeer onwaarschijnlijk dat processen in de Krimpenerwaard een negatieve invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. De afstanden tussen het plangebied en de Natura 2000-gebieden zijn te groot om een directe invloed te hebben op bijvoorbeeld de peilen of de waterkwaliteit in de betreffende gebieden. De knelpunten- en kansanalyse van Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ondersteunt dit [Kiwa Water Research/EGG-consult, 2007]. Knelpunten blijken voor dit gebied vooral in of in de directe nabijheid van het gebied zelf te liggen. Mogelijk negatief is de bijdrage van het plangebied aan de stikstofdepositie in de omgeving van de Krimpenerwaard door de aanwezigheid van stikstofbronnen zoals bijvoorbeeld veestallen en bemeste akkers. Depositiewaarden boven een bepaalde kritische grens zijn schadelijk voor bepaalde habitats. De meest kritische habitats uit de instandhoudingsdoelstellingen zijn de soortenrijke, vochtige graslanden blauwgrasland en glanshaver- en vossenstaart-hooilanden met een kritische depositie van $10\text{--}20 \text{ N kg ha}^{-1} \text{ jr}^{-1}$ [Alterra, 2008]. Het is echter onwaarschijnlijk dat het plangebied significant bijdraagt aan het wel of niet overschrijden van deze kritische depositiewaarde. In Nederland bedraagt de gemiddelde depositie nu circa $30,81 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ jr}^{-1}$ [PBL, 2008], veel hoger dan de kritische depositie. Daarnaast kan stikstof (NH_x , NO_x) over meer dan honderd kilometer getransporteerd worden en alsnog neerslaan [PBL, 2008]. Het aandeel van het plangebied als stikstofbron is daarom veel kleiner dan het totale brongebied van een Natura 2000-gebied.

De purperreigers die broeden in het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk foerageren onder andere in het westelijk deel van de Krimpenerwaard (Van der Winden et al., 2004).

nulalternatief

Voor het nulalternatief geldt hetzelfde als voor de nulmeting. Het plangebied zal weinig veranderen. Significante effecten op Natura 2000-gebieden kunnen daarom worden uitgesloten.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Ook in dit alternatief zullen er geen significant negatieve effecten optreden. Door het ontwikkelen van 2450 ha nieuwe natuur in het plangebied is het wel mogelijk dat er een uitwisseling op gang komt tussen de Natura 2000-gebieden en het plangebied. Met name voor organismen met een grote verspreidingsmogelijkheid, zoals vogels. Dit is juist de bedoeling van de natuurontwikkeling en met het oog op de instandhoudingsdoelstellingen voor de diverse vogels ook positief te waarderen. Ingeschat wordt dat met name door ontwikkeling van natte natuur, waaronder ondiep open water, de foerageermogelijkheden voor purperreiger zullen verbeteren.

alternatief 'Groeiend Veen'

Significant negatieve effecten worden niet verwacht. Het ontwikkelen van 2450 hectare natuur kan wel positief zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden, zoals beschreven bij het alternatief 'Grutto en Otter'. In dit alternatief wordt meer natte natuur ontwikkeld dan in het alternatief 'Grutto en Otter'. Wellicht leidt dit tot een meer positieve bijdrage aan de instandhoudingsdoelstellingen dan in het alternatief 'Grutto en Otter'. Omdat de verschillen naar verwachting klein zijn, zijn beide alternatieven gelijk beoordeeld.

conclusie

Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zijn in alle alternatieven uitgesloten. Dit is beoordeeld met een '0'. De ontwikkeling van 2450 hectare natuur kan een positieve bijdrage leveren aan de instandhoudingsdoelstellingen, met name voor vogels zoals de purperreiger. Dit is beoordeeld met een '+'.

8.11.3. Overlast door exoten

Onder exoten worden planten en dieren verstaan die door toedoen van de mens in ons land voorkomen. De laatste decennia komen in toenemende mate exoten ons land binnen. Een klein aantal daarvan is plaagvormend wat verstrekkende ecologische en economische gevolgen kan hebben.

Een exoot die aandacht verdient, is de grote waternavel. Deze matvormende drijfplant kan voor grote overlast zorgen in met name watergangen en natuurgebieden. De planten kunnen inheemse plantensoorten wegconcurreren en kunnen in korte tijd een watergang dichtgroeien. Hierdoor belemmeren ze de doorstroming en het functioneren van stuwtjes. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar is door de verkoop als vijverplant in de Nederlandse wateren terechtgekomen. Intussen wordt de plant in vele wateren in Nederland aangetroffen en maken de waterschappen gezamenlijk jaarlijks vele miljoenen kosten om de overlast ervan te beperken. Er worden pogingen gedaan de planten lokaal uit te roeien. De discussie hoe dat het beste kan en of dat wel kan is nog niet afgesloten. Nieuwe vindplaatsen worden echter nauwelijks meer ontdekt nadat in 2002 de handel, maar ook het bezit van de soort is verboden onder de Flora- en faunawet. Wel blijft de kans bestaan dat de plant zich vanuit bestaande populaties zal verspreiden. Zoals de meeste exoten vermeerdert grote waternavel zich niet via zaad, maar via stukjes plant die op de knopen weer uitlopen. Een stukje stengel van een paar centimeter kan wegdrijven of door een watervogel meegenomen worden en op een nieuwe plek in een week tijd weer een plantje vormen. Regelmatige controle van de watergangen blijft daarom nodig.

Naast grote waternavel heeft de muskusrat in de Krimpenerwaard de aandacht. Door het voorkomen van zeer grote populaties in 2004 heeft de bestrijding van muskusratten in de afgelopen jaren extra aandacht gehad. Onder andere als gevolg van MKZ was het gewenste bestrijdingsniveau niet haalbaar. Als gevolg hiervan steeg de muskusrattenpopulatie flink. In 2004 werden er in totaal 75.676 dieren gevangen (2,75/uur). Met inzet van mensen en middelen is dit teruggebracht naar 9.563 dieren in 2007 (0,47/uur; [HHSK, 2007]). Bestrijding is bij wet verplicht. Het plangebied moet daarom toegankelijk blijven voor muskusrattenvangers. Daarnaast wil men een situatie als in 2004 voorkomen.

Muskusratten leven in de nabijheid van stilstaande en stromende waterlopen, vijvers en moerassen. Zij veroorzaken overlast door het graven van gangen en holen in oevers en dijk- of wegtaluds. Zij veroorzaken hiermee verzakkingen en vormen een risico voor berijding van oevers en voor dijkdoorbraken.

Overlast door exoten is kwalitatief beoordeeld op de hoeveelheid inzet die nodig is om de overlast niet te laten toenemen. Dit is beoordeeld aan de hand van:

- toegankelijkheid van het plangebied voor bestrijders en eventueel materieel;
- wijziging van vangstmethoden muskusratten;
- vestigings- of verspreidingsmogelijkheden van de twee exoten.

nulmeting

Grote waternavel is gebaat bij hoge nutriënten gehalten en aanwezigheid van rottend organisch materiaal afkomstig van bijvoorbeeld microalgen of plantaardige of dierlijke afvalstoffen. Op deze nutriëntrijke plaatsen concurreert de grote waternavel met kroos. De Krimpenerwaard vormt met haar nutriëntrijke wateren een aantrekkelijk habitat voor grote waternavel. In het plangebied komt grote waternavel ook op een aantal plekken voor en heeft het vanwege het groeiende probleem in Nederland de aandacht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Bestrijding vindt plaats door de plant zo goed mogelijk met wortel en al uit de watergangen te verwijderen en af te voeren.

Zoals hierboven is beschreven komt de muskusrat voor in de Krimpenerwaard (afbeelding 8.11). De bestrijding vindt voornamelijk plaats door het zetten van vallen en fuiken. De muskusrattenvangers gaan hiervoor te voet, per boot of per quad de watergangen langs om de vallen en fuiken te zetten en te controleren.

afbeelding 8.11. Muskusratten in de Hillekade: sporen en vallen



[Bron: Barend de Jong, 2009].

nulalternatief

Ten opzichte van de nulmeting zal de toegankelijkheid van de watergangen in het plangebied voor de bestrijding van grote watervanavel en muskusratten niet significant wijzigen. Een aandachtspunt vormt de mogelijke ontwikkeling van natuurlijke oevers in de natuurgebieden. Bij de aanleg wordt het ecologisch evenwicht tijdelijk verstoord. Van die verstoorde balans maakt de grote watervanavel dankbaar misbruik [Pot, 2000]. Bovendien kan hij langs natuurvriendelijke oevers makkelijker overwinteren, omdat daar door de aanwezige begroeiing de vorst minder diep de grond ingaat. Daarnaast vormt natuur een betere habitat voor muskusratten dan de huidige landbouwgronden.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

Voor de bestrijding van beide exoten geldt dat de toegang tot het gebied ten opzichte van de nulmeting door de aanleg van natte natuur bemoeilijkt zal worden. Daarnaast is de evenwichtsverstoring bij die aanleg gunstig voor de grote watervanavel. Dit biedt op korte termijn meer kansen voor de vestiging dan in de nulmeting en autonome ontwikkeling (nulalternatief) en vraagt daarmee om meer inzet voor de controle en bestrijding. Op langere termijn zal de waterkwaliteit verbeteren. Dit is ongunstig voor de grote watervanavel die juist gebaat is bij voedselrijke wateren. Het is echter onduidelijk in welke mate dit de groei en vestiging van grote watervanavel zal tegengaan en of daarmee de bestrijdingsinzet zal afnemen.

De muskusrat is gebaat bij de natuurontwikkeling. Het vele water en de verschillende habitats op korte afstand van zowel nat als meer droog zijn ideaal voor deze exoot.

Samen met de bemoeilijkte toegang tot de watergangen zal de inzet voor muskusrattenbestrijding toenemen ten opzichte van de nulmeting. Daarnaast is van belang dat de nieuwe natuur het gebied aantrekkelijk maakt voor otters en bevers. Wanneer deze dieren het gebied intrekken, is aanpassing van de muskusrattenbestrijding nodig om bijvangsten van de otter en bever te voorkomen. Dit kan door het vervangen van de klemmen door vangkooien en door het gebruik van speciale ringen in de keelopening van fuiken om het inzwemmen door otters en bevers te voorkomen. Dit vraagt wel om extra inzet. Met name door het gebruik van de vangstkooien. Om te voorkomen dat gevangen dieren verhongeren moeten deze kooien namelijk vaker gecontroleerd worden.

alternatief 'Groeind Veen'

Voor 'Groeind Veen' geldt hetzelfde als voor 'Grutto en Otter', met dat verschil dat er een nog gunstiger habitat ontstaat voor de muskusrat (meer natte natuur). Daarnaast zal op termijn de waterkwaliteit niet verbeteren (wellicht zelfs verslechteren) door nalevering van fosfaat als gevolg van vernatting (zie paragraaf 5.3) wat gunstig is voor de grote waternavel. Hiermee neemt de inzet voor de bestrijding van de beide exoten, en daarmee de overlast, meer toe ten opzichte van de nulmeting dan dat het toeneemt in de voorgenomen activiteit.

conclusie

De ontwikkeling van natuurlijke oevers in de autonome situatie vragen om meer inzet voor de controle en bestrijding van grote waternavel en muskusratten. Onduidelijk is echter of dit ook een significant effect heeft op de overlast. Daarom is gekozen voor een score van '-/0'.

De voorgenomen activiteit scoort duidelijk negatiever dan de nulmeting door met name een verslechterde toegankelijkheid van de watergangen en het ontstaan van een gunstiger habitat voor de muskusrat. Ook de mogelijke intrek van de otter en/of bever en de daarmee gepaard gaande wijziging van de vangstmethode zorgt voor een lastiger bestrijding en daardoor extra overlast. Overlast door grote waternavel kan met name op korte termijn worden verwacht doordat het systeem verstoord wordt bij de inrichting. Op langere termijn kan een verbeterende waterkwaliteit de overlast wel wat afremmen. Onduidelijk is echter in welke mate. Het totaaleffect op overlast is beoordeeld met '-/--'. Verwacht wordt dat de effecten van de verschillen tussen de subalternatieven binnen deze range vallen. Daarmee krijgen zij dezelfde beoordeling.

Omdat de hoeveelheid natte natuur sterk toeneemt en de waterkwaliteit in Groeind Veen niet zal verbeteren, maar mogelijk zelfs verslechterd, wordt dit alternatief ten opzichte van de nulmeting negatiever beoordeeld op overlast door exoten dan de voorgenomen activiteit. De beoordeling komt daarmee uit op '--'.

8.11.4. Verstoring door recreanten en verkeer

Verstoring door recreanten wordt veroorzaakt door betreding van het gebied, recreatieafval, licht, geluid en beweging. In hoofdstuk 3 is per alternatief aangegeven in welke mate recreatief medegebruik mogelijk is. Bijlage 11 'verstoringssafstanden recreatie' gaat hier in meer detail op in. Hieruit blijkt dat er een verschil bestaat in de mate van verstoring van wandelaars, fietsers, kanoërs en auto's. Hoe voorspelbaarder de beweging en hoe minder het geluid des te kleiner de verstoring.

Daarnaast speelt de hoeveelheid verkeersbewegingen een rol. Zo vormen wegen met een intensiteit van meer dan 3.000 voertuigen per jaar een barrière voor diverse diersoorten als de otter, bever, kikkers en padden [LNV, 2001]. Voor andere soorten, zoals vlinders, geldt dit pas bij een intensiteit van meer dan 10.000.

Verstoring is kwalitatief beoordeeld aan de hand van:

- de hoeveelheid recreatie en verkeer;
- het aantal wegen en fiets-, wandel- of kanoroutes;
- het areaal verstoringgevoelige natuur.

nulmeting

In de nulmeting is er relatief weinig verstoringsgevoelige natuur, maar is de recreatiedruk wel hoog (zie paragraaf 7.2). Daarbij voldoet het aantal fiets-, wandel- of kanoroutes niet aan de vraag.

In 2006 maakten zo'n 5.000-15.000 voertuigen per jaar gebruik van de N210 (Krimpen aan de IJssel-Schoonhoven) en de N207 [Bergambacht-Gouda; provincie Zuid-Holland, 2007]. De verkeersintensiteit van het onderliggende netwerk is lager dan 10.000 voertuigen per jaar, maar wel hoger dan 3.000. Beide kritische intensiteiten (3.000 en 10.000 voertuigen per jaar) worden op de provinciale wegen dus voor het overgrote deel overschreden.

De N210 wordt op het moment van het schrijven van dit inrichtingsMER vervangen door een nieuwe weg. Daarbij wordt een faunapassage aangelegd onder de weg door.

nulalternatief

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zal het areaal natuur licht toenemen tot 35 % van het plangebied. Niet alle natuur is even verstoringsgevoelig en positief is dat de nieuwe natuur niet altijd in de buurt van wegen of recreatieroutes ligt. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 neemt de recreatiedruk wel toe, maar worden er geen nieuwe recreatieroutes gerealiseerd. Tevens is ingeschat dat de hoeveelheid verkeer zal toenemen [provincie Zuid-Holland, 2004 en 2005], maar is grootschalige nieuwe infrastructuur ter verbetering van de ontsluiting niet aan de orde. Alleen bij Gouda wordt een nieuwe randweg aangelegd die ook deels door de Krimpenervaard komt te liggen. Hierbij zal ook een faunapassage worden aangelegd. De kritieke grenzen van verkeersintensiteit zijn in de nulmeting al grotendeels overschreden. Mogelijk dat met een toename van de verkeersintensiteit op bepaalde wegen de 10.000 grens wordt overschreden wat nadelig is voor vlindersoorten.

voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'

In de voorgenomen activiteit neemt de hoeveelheid natuur flink toe tot 100 % van het plangebied. Ook hier is niet alle natuur even verstoringsgevoelig. Net als in de autonome situatie neemt ook de recreatiedruk en het aantal verkeersbewegingen toe. Aan de andere kant worden er voor recreatie meer paden aangelegd en routes uitgezet. Positief is dat men bij de inrichting van het gebied rekening zal houden met de verstoringsgevoeligheid van de diverse te ontwikkelen natuurdoeltypen (zie hoofdstuk 7.2). Vooral de weidevogelgebieden zullen ontzien worden bij de aanleg van nieuwe routes. Zo is de toegang tot deze gebieden in het broedseizoen beperkt of zelfs verboden. Verstoring wordt zo tot een minimum beperkt. Het mogelijke fietspad op de grens van het plangebied (100 meter achter de bebouwing langs de IJsseldijk) grenst weliswaar aan kruidenrijk grasland, maar zou een beperkte verstoring kunnen hebben op de verderop gelegen weidevogelgraslanden. De mate van verstoring is onder andere afhankelijk van het ontwerp, intensiteit van gebruik en eventuele verlichting van het fietspad.

alternatief Groeiend Veen

Het verschil tussen Groeiend Veen en de voorgenomen activiteit is dat er minder verstoringsgevoelige natuur wordt gerealiseerd (weidevogelgebied) en dat er dus minder verstoring verwacht wordt.

conclusie

Omdat het areaal verstoringsgevoelige natuur relatief laag is en in het nulalternatief maar licht toeneemt en daarbij ook niet altijd op verstoringsgevoelige locaties ligt, zal de verkeers- en recreatiegroei ten opzichte van de nulmeting in het nulalternatief maar een lichte stijging van de verstoring tot gevolg hebben. Dit is beoordeeld met '-/0'.

De grote toename van het areaal verstoringsgevoelige natuur in de alternatieven Grutto en Otter en Groeiend Veen vergroot ook de kans op verstoring van de natuur. Door de afstemming tussen natuur en recreatief medegebruik wordt de verstoring voor de alternatieven Grutto en Otter en Groeiend Veen echter tot een minimum beperkt. Dit is beoordeeld met '-/0'.

In het alternatief Groeiend Veen is minder verstoringsgevoelige natuur gepland dan in de voorgenomen activiteit Grutto en Otter en kan recreatie beter gestuurd worden. Ten opzichte van de nulmeting scoort Groeiend Veen daarom minder negatief dan Grutto en Otter. De inschatting is echter dat de beoordeling daarmee niet significant zal veranderen. De beoordeling is daarmee gelijk aan het nulalternatief en de voorgenomen activiteit, een '-/0'.

tabel 8.21. Effectentabel Natuur (kwalitatief)

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	autonome ontwikkeling	voorgenomen activiteit 'Grutto en otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			sub 1	sub 2	sub 3	
aantasting actuele natuurwaarden	0	0/+	+	+	+	0/+
invloed op Vogel- en habitatrictlijngebieden ten noorden en zuiden van de Krimpenerwaard	0	0	+	+	+	+
overlast door exoten	0	-/0	-/--	-/--	-/--	--
verstoring door recreanten en verkeer	0	-/0	-/0	-/0	-/0	-/0

8.12. Uitvoeringsaspecten

Bij de uitvoeringsaspecten wordt het transport van grond over de openbare weg beschouwd. Omdat het grondtransport uitgevoerd wordt met vrachtwagens en de wegen in het plangebied daar niet op ingericht zijn, wordt het transport van grond over de openbare weg als negatief beschouwd.

Transport van grond wordt geminimaliseerd als de grondbalans gesloten is. Daarom worden de grondbalansen van de verschillende alternatieven en het nulalternatief beschouwd. Zowel een overschot aan grond als een tekort leidt tot meer transport van grond over de openbare weg en wordt daardoor als negatief beoordeeld. Als een grondbalans gesloten is, is er ook transport van grond over de openbare weg. Maar omdat de grond weer in het plangebied gebruikt wordt, wordt de grond over een beperkte afstand vervoerd. Het transport van grond over de openbare weg blijft daardoor beperkt.

In de grondbalansen worden het graven van waterlopen, het plaggen in reservaatgebieden, het creëren van gronddammen en het saneren van slootdempingen beschouwd. Het maken van greppels op percelen wordt niet in de grondbalansen beschouwd omdat de grond die vrijkomt bij het maken van greppels verspreid wordt over het betreffende perceel.

In paragraaf 8.3 zijn de grondbalansen van de verschillende alternatieven beschreven. Hieruit volgt direct de beoordeling:

conclusie

In de huidige situatie (nulmeting) wordt als er geen bagger beschikbaar is voor het saneren van slootdempingen, grond van buiten de Krimpenerwaard aangevoerd. Er vindt daarom in de nulmeting grondtransport over de openbare weg en over grote afstand plaats. Dit transport van grond over de openbare weg in de nulmeting is per definitie neutraal ('0') beoordeeld. In het nulalternatief is er 1.040.000 m³ grond benodigd. Deze hoeveelheid zal vervoerd moeten worden over de openbare weg en van buiten het plangebied. Het nulalternatief wordt daarom negatief ('-') beoordeeld. In de subalternatieven van 'Grutto en Otter' is er waarschijnlijk sprake van een gesloten grondbalans. Dat neemt niet weg dat de grond nog steeds getransporteerd moet worden, maar over minder grote afstanden en bovendien zijn er meer mogelijkheden om de grond dichtbij de plek van herkomst te hergebruiken. De subalternatieven worden daarom positief ('+') beoordeeld. Bij het alternatief 'Groeidend Veen' zal grond van buiten het plangebied aangevoerd moeten worden. Het wordt daarom negatief ('-') beoordeeld.

tabel 8.22. Effectentabel Uitvoeringsaspecten

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	autonome ontwikkeling	voorgenomen activiteit 'Grutto en otter'	alternatief 'Groeidend Veen'
minimaliseer transport van grond over de openbare weg (grote vrachtwagens op kleine wegen)	0	0/-	+	-

8.13. Water

Het effect van de planontwikkeling op water is al bij het hoofddoel water beschreven in hoofdstuk 5. Hierbij zijn de effecten op het watersysteem en de waterkwaliteit beschreven. Deze paragraaf gaat in op de neveneffecten op het gebied van water, het betreft de effecten op gebieden van goede waterkwaliteit en aquatische natuurwaarden (Waterparels), grondwaterbeschermingsgebieden, verdroogde natuurgebieden (TOP-gebieden) en de wegzijging vanuit de Krimpenerwaard naar de Zuidplaspolder.

waterparels

In de Krimpenerwaard liggen twee waterparels: polder De Nesse en polder Berkenwoude. Beiden liggen binnen de begrenzing van het plangebied. Daarnaast is de polder Veerstalblok aangewezen als potentiële waterparel en zijn er binnen het plangebied nog vier blokboezems aangewezen als zoekgebied voor waterparels. Een waterparel dient te voldoen aan STOWA-klasse 4 voor waterkwaliteit, dit is bijna het hoogste ecologisch niveau [provincie Zuid-Holland, 2008d]. De effecten op de bestaande waterparels en de potentiële waterparels worden tezamen beoordeeld. Als er een positief effect verwacht wordt op de waterkwaliteit in deze gebieden, wordt er ook positief beoordeeld.

grondwaterbeschermingsgebieden

In de Krimpenerwaard liggen twee grondwaterbeschermingsgebieden. Deze bevinden zich echter buiten het plangebied. Enige hectaren van het plangebied liggen wel in de boringsvrije zone die rond deze beschermingsgebieden liggen. Het betreft het uiterst westelijke deel van het plangebied langs de Hillenkade (nabij de Loet) en de meest oostelijke strook van het weidevogelgebied bij Bergambacht [provincie Zuid-Holland 2008e]. Op deze delen mogen er geen boringsputten in gebruik zijn en mag de grond onder 10 meter onder maaiveld niet geroerd worden. Dit heeft geen effect op de ontwikkeling. Wel is het zo dat het omzetten van landbouwgronden in natuurgebieden op lange termijn een effect heeft op de grondwaterkwaliteit. Er zullen minder nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het grondwater terecht komen. Door het opzetten van het peil in de natuurgebieden zal bovendien de grondwaterstroming vanuit het plangebied iets toenemen. Het effect van het veranderen van landbouwgronden in natuurgebieden buiten de beschermingszone wordt daarom licht positief beoordeeld.

TOP-gebieden

In de Krimpenerwaard zijn enkele boezemlanden aangewezen als TOP-gebieden (zie bijlage 2). Het betreft een zone langs de Berkenwoudsche Hoge Boezem, langs de Molenvliet, langs de Beijersche Vliet, de Stolwijkse Vaart, enkele gebieden in de Berkenwoudse Driehoek en twee zones langs de Stolwijkse boezem [provincie Zuid-Holland, 2008d]. De totaal verdroogde oppervlakte is 61 ha [LNV, 2007]. De effecten op deze gebieden worden beoordeeld naar vernatting: een hoger peil in de TOP-gebieden wordt daarom positief beoordeeld.

wegzijging

Vanuit het noorden van de Krimpenerwaard vindt wegzijging plaats naar de Zuidplaspolder. In de Zuidplaspolder bevindt zich op dit moment een waterparel. Door de combinatie van de bodem en kwel komen daar allerlei specifieke plantensoorten voor [Twisk, 2007]. Kwel vanuit de Krimpenerwaard is dus wenselijk. Vaak is er voor de specifieke plantensoorten een minimale kwelhoeveelheid vereist. Een afname van de kwel wordt daarom negatief beoordeeld omdat het minimum dan wellicht niet langer gehaald wordt. Een toename van de kwel wordt licht positief beoordeeld. De minimale kwelhoeveelheid is weliswaar al behaald, maar lokaal kunnen er nog positieve effecten optreden.

Wel dient de vermeerdering van kwel extra uitgemalen te worden. Indien het landgebruik van de Zuidplaspolder verandert in stedelijk gebruik, dan is een toename van de kwel juist negatief. Voor deze m.e.r.-studie wordt echter uitgegaan van het voortbestaan van groene waterparel Zuidplaspolder.

nulmeting

De nulmeting wordt per onderwerp beschreven in de bovenstaande paragrafen. Er zijn twee waterparels en enkele TOP-gebieden aanwezig in het plangebied. Er liggen geen grondwaterbeschermingsgebieden in het plangebied, maar wel twee relatief kleine boringvrije zones. Er vindt wegzijging plaats naar de Zuidplaspolder, waardoor er in de Zuidplaspolder specifieke plantensoorten voorkomen.

nulalternatief

In het nulalternatief neemt de vermessing van het plangebied af door al een behoorlijke omzetting van landbouwgronden naar natuurgronden (van 2.074 ha naar 1.354 ha landbouw, zie tabel 3.1). Door het opzetten van het peil in de natuurgebieden neemt de fosforvrucht wel weer toe, maar dit gebeurt in slecht 14 % van het gebied. De totale nutriëntenvrucht neemt hierdoor af en de waterkwaliteit in het plangebied neemt dus toe. Door het nemen van maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) neemt de waterkwaliteit van KRW-waterlichamen verder toe. Van de waterparels is echter alleen de polder Berkenwoude aangewezen als KRW-waterlichaam.

Er zijn geen directe effecten op de grondwaterbeschermingsgebieden. De waterkwaliteit blijft vrijwel hetzelfde en het grondwater dat toestroomt naar de waterwinning ook. Neutrale beoordeling.

De verdroging in het gebied wordt aangepakt via inrichting van de natuurgebieden en peilbesluiten. Daarnaast loopt er een landelijke actie van provincies, Unie van Waterschappen, Rijk, VEWIN, terreinbeheerders en Land- en tuinbouworganisaties om voorstellen te maken voor droogtebestrijding [website provincie Zuid-Holland, december 2008]. Voor de Krimpenerwaard wordt vooral een effect verwacht van het aanpassen van de peilbesluiten. Door het realiseren van aparte peilgebieden voor deze natuurgebieden wordt het namelijk mogelijk hogere peilen toe te staan in de verdroogde gebieden. Dit kan in slechts 40 % van de nieuwe natuurgebieden. De waterstanden zijn mogelijk niet optimaal omdat er nog wel rekening gehouden wordt met de omringende landbouwgebieden (uitstraling grondwatereffecten). De beoordeling is licht positief.

De wegzijging naar de Zuidplaspolder neemt iets toe doordat in een deel van de nieuwe natuurgebieden het peil wordt opgezet (14% van het plangebied). In de gebieden die landbouwgrond blijven, neemt de wegzijging af doordat het peil met de bodem mee daalt. De totale kwelhoeveelheid in de Zuidplaspolder blijft hierdoor naar verwachting gelijk, dit wordt neutraal beoordeeld.

voorgenomen activiteit ' Grutto en Otter'

In het alternatief ' Grutto en Otter' neemt de waterkwaliteit fors toe door het omzetten van landbouwgronden in natuurgronden, door het afplaggen van de gronden en door het beperken van inlaat van water. Hierdoor draagt het alternatief bij aan de realisatie van nieuwe waterparels en het behoud van de bestaande waterparels. Dit wordt zeer positief beoordeeld.

Er zijn geen directe effecten op de grondwaterbeschermingsgebieden. Wel neemt de grondwaterkwaliteit op lange termijn toe door de verbetering van de water- en bodemkwaliteit (afplaggen). Dit wordt licht positief beoordeeld.

De verdroging van de TOP-gebieden wordt tegengegaan door het opzetten van het peil in het gehele plangebied. Het peil mag in droge perioden echter 15 cm dalen, maar de drooglegging zal, wanneer de definitief gewenste drooglegging is bereikt, altijd kleiner zijn dan de huidige drooglegging. Daarom wordt dit effect positief tot zeer positief beoordeeld.

Door het opzetten van het peil neemt de kwelhoeveelheid in de Zuidplaspolder naar verwachting iets toe, dit wordt positief beoordeeld.

alternatief 'Groeiend Veen'

In het alternatief 'Groeiend Veen' neemt de waterkwaliteit naar verwachting licht toe door het omzetten van landbouwgronden in natuurgronden en door de inlaat van water met een goede kwaliteit. Er wordt echter niet afgeplagd. Hierdoor draagt het alternatief beperkt bij aan de realisatie en behoud van waterparels. Dit wordt als licht positief beoordeeld.

Er zijn geen directe effecten op de grondwaterbeschermingsgebieden. De waterkwaliteit neemt wel licht toe waardoor de grondwaterkwaliteit ook iets toeneemt. Dit wordt licht positief beoordeeld.

De verdroging van de TOP-gebieden wordt tegengegaan door het opzetten van het peil in het gehele plangebied tot 15 cm onder het maaiveld. Het peil mag niet wegzakken. Dit wordt zeer positief beoordeeld voor de verdrogingsbestrijding.

Door het opzetten van het peil neemt de kwelhoeveelheid in de Zuidplaspolder naar verwachting iets toe, dit wordt positief beoordeeld.

conclusie

Het nulalternatief wordt neutraal tot positief beoordeeld. De voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter' scoort het beste op het neveneffect 'water'. Vooral de effecten op de waterparels en de TOP-gebieden zijn zeer positief. Bij het alternatief 'Groeiend Veen' neemt de waterkwaliteit slechts licht toe, waardoor het effect op de waterparels gering is. Wel is het effect op de TOP-gebieden zeer positief.

tabel 8.23. Effectentabel Water

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	autonome ontwikkeling	voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'	alternatief 'Groeiend Veen'
effecten op en bijdragen aan waterparels	0	0/+	++	0/+
grondwaterbeschermingsgebieden	0	0	0/+	0/+
verdroging TOP-gebieden	0	+	+/++	++
wegzijging	0	0	+	+

9. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

9.1. Overzicht hoofddoelen

Tabel 9.1 geeft het totaal overzicht van de effecten op de hoofddoelen.

tabel 9.1. Tabel effecten op hoofddoelen

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	nulalternatief	voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeidend Veen'
			subalter- natief 1 'directe realisatie en peil- fixatie'	subalter- natief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld- daling'	subal- ternatief 3 'in- groei- model'	
landschap en cultuurhistorie						
behoud en ontwikkeling van ka- rakteristiek verkavelings- en slo- tenpatroon	0 zeer kenmerkend redelijk zeldzaam gaaf redelijk vervang- baar	0	-	0/-	0/-	-
behoud en ontwikkeling van cul- tuurhistorische landschapsele- menten en gebouwde monu- menten	0 zeer kenmerkend niet zeldzaam gaaf redelijk vervang- baar	0/+	-	0/+	0/-	-
behoud van openheid	0 zeer kenmerkend zeldzaam gaaf redelijk vervang- baar	0/-	-/--	0/-	0/-	-/--
water en bodem						
bodemdaling na 25 jaar in cm en reductie in % ten opzichte van het nulalternatief	n.v.t.	13,4	4,7 (65 %)	5,2 (61 %)	7,6 (43 %)	0,9 (93 %)
bodemdalingsnelheid na 25 jaar in cm/jaar en reductie in % ten opzichte van het nulalternatief	n.v.t.	0,6	0,1 (83 %)	0,3 (50 %)	0,5 (17 %)	0,03 (95 %)
beoordeling robuustheid water- systeem	0	-	++	++	++	+
terugdringen vermessing	0	0	+	+	+	0/+
bereiken van KRW doelen	0	0/+	+	+	+	0/+
natuur						
totaal oordeel natuurkwaliteit:	0	0/+	+/++	++	+/++	+
realisering robuuste Groene Ruggengraat c.q. het opheffen van knelpunten	0	0/+	+/++	++	+/++	+

beoordelingscriterium	nulmeting (huidige situatie)	nulalternatief	voorgenomen activiteit 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peil-fixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld-daling'	subalternatief 3 'in-groei-model'	
optimaliseren ontwikkelingsbeheer	0	0	+/++	++	+/++	0/+
recreatie						
natuur- en recreatieve beleving	0	0/+	+	+	+	+
kansen voor uitbreiding bestaande recreatieve routes en voorzieningen	0	0/+	+	+	+	++

9.2. Analyse beoordeling hoofddoelen

Kijkend naar tabel 9.1 met de hoofddoelen dan zien we dat de projectalternatieven op drie van de vier hoofddoelen positief scoren. Alleen op het thema landschap en cultuurhistorie zijn er negatieve scores te zien ten opzichte van de huidige situatie en het nulalternatief. Binnen het thema landschap is duidelijk dat het subalternatief 2 'directe realisatie met peil volgt maaiveld-daling' het minst negatief scoort. Met name 'groeierend Veen' en subalternatief 1 veranderen het bestaande landschap het meest ingrijpend. Nu zijn het juist deze twee alternatieven die de bodemdaling het beste tegengaan.

Op grond van de effectbeschrijvingen uit dit milieueffectrapport blijkt dat de keuze voor een alternatief moet worden gebaseerd op de afweging tussen beperking van de bodemdaling enerzijds en het behoud van het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden anderzijds. Deze afweging is inzichtelijk gemaakt in twee afbeeldingen 9.1 en 9.2. In de afbeeldingen 9.1 en 9.2 zijn de alternatieven op de x-as gerangschikt naar de mate waarin zij de bodemdaling remmen. Links staat de Autonome Ontwikkeling (AO), het nulalternatief, die de bodemdaling het minste remt en rechts 'Groeierend Veen', die de bodemdaling het meeste remt. De drie subvarianten van 'Grutto en Otter' liggen tussen deze twee uitersten in.


Ten aanzien van het aspect natuur zijn er twee benaderingen ten aanzien van natuur mogelijk:

1. natuur die hoort bij het cultuur(historische) landschap met bijbehorende natuurwaarden, zoals dat begin vorige eeuw in de Krimpenerwaard aanwezig was;
2. natuurlijkheid: daarbij wordt gesteld dat hoe minder menselijke beïnvloeding, hoe natuurlijker en hoger de natuurwaarde.

De eerste benadering, weergegeven in afbeelding 9.1 kent een hoge waarde toe aan de natuur die hoort bij het cultuur(historische) landschap met bijbehorende natuurwaarden, zoals dat begin vorige eeuw in de Krimpenerwaard aanwezig was¹⁴. Deze benadering is conform het hoofddoel voor landschap en cultuurhistorie zoals dat in het toetsingskader is geformuleerd. Kenmerkend is dat de natuurwaarden in het cultuur(historische) landschap zijn ontstaan onder menselijke beïnvloeding, zoals ontwatering, (maai)beheer en beperkte bemesting. Op de y-as is in afbeelding 9.1 kwalitatief weergegeven hoe de alternatieven ten opzichte van elkaar scoren op het aspect 'natuurwaarde conform het historisch referentiebeeld'.

¹⁴ Het getoonde afwegingsmodel is natuurlijk een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo wordt er vanuit gegaan wordt dat direct na realisatie de maximale natuurwaarden aanwezig zijn (initiële hoge score), terwijl daar in werkelijkheid nogal wat tijd over heen zal gaan. In die tijd is sub 1 al meer naar Groeierend Veen toe gegroeid en zal daardoor dus nooit het niveau van sub 2 halen en sub 3 zal uiteindelijk een hoger niveau halen dan het initiële niveau van sub 1.


afbeelding 9.1. Afweging van de alternatieven voor de doelen remmen bodemdaling en natuurwaarde conform het historisch referentiebeeld



In afbeelding 9.1 is te zien dat het nulalternatief het laagst scoort, omdat het areaal aan natuur slechts 30 % is van het natuurareaal in de andere alternatieven. Daarna scoort 'Groeidend Veen' laag, lager dan de drie subalternatieven van 'Grutto en Otter', omdat er in dit alternatief meer moeras ontstaat ten koste van de cultuurhistorisch waardevolle graslanden en omdat de voedselrijkdom van deze graslanden te hoog is. Van de drie subalternatieven van 'Grutto en Otter' scoort subalternatief 2 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveld daling volgt' het hoogste op deze invulling van het begrip natuurwaarde. Subalternatief 1 scoort initieel even hoog als subalternatief 2, maar door de peilfixatie, gaat dit subalternatief op den duur lijken op 'Groeidend Veen', waardoor de moerasnatuur toeneemt en de natuurwaarde gaat afwijken van het historisch referentiebeeld. In subalternatief 3 'ingroeimodel' wordt de gewenste natuurwaarde later bereikt dan in subalternatief 2, omdat aan het begin slechts een deel van de gewenste peilopzet wordt ingesteld. Hiermee scoort subalternatief 2 dus beter, omdat de natuurwaarden sneller worden gerealiseerd. Bovendien wordt in subalternatief 2 de bodemdaling in de eerste periode na realisatie meer geremd dan in subalternatief 3. Het verschil in bodemdaling tussen de subalternatieven verdwijnt wanneer in subalternatief 3 de gewenste drooglegging is bereikt. Uit deze beschouwing wordt geconcludeerd dat subalternatief 2, 'directe realisatie waarbij het peil de maaiveld daling volgt', het beste scoort op de natuurwaarde van het cultuurhistorisch referentiebeeld en tevens een substantiële reductie van de bodemdaling geeft ten opzichte van het nulalternatief.

In de tweede benadering wordt uitgegaan van het begrip natuurlijkheid. Daarbij wordt gesteld dat hoe minder menselijke beïnvloeding, hoe natuurlijker en dus hoe hoger de natuurwaarde. Dat betekent dat de natuurwaarde die ontstaat bij peilfixatie hoog wordt gewaardeerd, omdat dit natuur oplevert met een hoog natuurlijkeheidsgehalte. In afbeelding 9.2 is de score van de alternatieven op het aspect natuurlijkheid op de y-as weergegeven (de x-as is gelijk gebleven).

afbeelding 9.2. Afweging van de alternatieven voor de doelen remmen bodemdaling en natuurlijkheid



Op deze natuurlijkheidsschaal scoort alternatief 'Groeind Veen' in eerste instantie het hoogste. Echter, op den duur zal subalternatief 1 'directe realisatie met peilfixatie' beter scoren dan 'Groeind Veen'. Dit wordt veroorzaakt doordat in subalternatief 1 bij de inrichting meer dan 600 ha wordt afgeplagd. Hierdoor wordt de fosfaathuishouding van subalternatief 1 beter dan van 'Groeind Veen'. Bovendien komt er meer grond beschikbaar dat benut kan worden bij de herinrichting en vooral ook voor de sanering van slootdempingen in de Krimpenerwaard. De subalternatieven 2 en 3 zijn vanuit milieuoogpunt op de langere termijn minder gewenst dan subalternatief 1 (meer bodemdaling en lagere natuurlijkheid).

9.3. Overzicht nevendoelelen c.q. neveneffecten

Tabel 9.2 toont het overzicht van de effectbeoordeling van alle beschouwde effecten in dit milieuraapport. De beoordeling tussen de thema's verschilt behoorlijk. Op sommige thema's scoren de alternatieven slecht (infrastructuur en wateroverlast voor de lintbebouwing bijvoorbeeld). Op andere thema's scoren de alternatieven zeer goed (luchtkwaliteit bijvoorbeeld). Echter, per thema scoren de alternatieven meestal na genoeg gelijk. Dat wil zeggen dat de effecten weinig onderscheidend zijn tussen de alternatieven. Deze kleine verschillen zijn niet doorslaggevend voor de keuze van het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief. Een aantal belangrijke neveneffecten worden hieronder samengevat.

De landbouw scoort het best in de huidige situatie. De landbouw scoort het slechtst in de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeind Veen'. In deze alternatieven wordt het gehele plangebied omgezet in natuur en worden de peilen verhoogd ten behoeve van natuurontwikkeling en het voorkomen van bodemdaling. Hierbij zijn er nog wel mogelijkheden voor particulier natuurbeheer, met name in het alternatief 'Grutto en Otter'.

De kans op een toename van het aantal muggen en knutten zal in de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeind Veen' door vernatting van de percelen toenemen ten opzichte van de nulmeting. Of dit ook leidt tot overlast voor bewoners en recreanten is afhankelijk van de (detail)inrichting.

Toename van overlast treedt namelijk voornamelijk op wanneer een voor muggen geschikte leefomgeving (zoals ondiep stilstaand water) in de nabijheid van bebouwing liggen (in ieder geval bij minder dan 60 m). Onder mitigerende maatregelen wordt hier op teruggekomen.

De overlast door exoten, zoals de muskusrat, neemt in het nulalternatief mogelijk toe.

De ontwikkeling van natuurlijke oevers vragen om meer inzet voor de controle en bestrijding van grote waternavel en muskusratten. De alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeind Veen' scoren negatiever dan de nulmeting door met name een verslechterde toegankelijkheid van de watergangen en het ontstaan van een gunstigere leefomgeving voor de muskusrat. Ook de mogelijke intrek van de otter of bever en de daarmee gepaard gaande wijziging van de vangstmethode zorgt voor extra overlast. Overlast door de grote waternavel kan met name op korte termijn worden verwacht doordat het systeem verstoord wordt bij de inrichting. Op de langere termijn zal deze overlast afnemen als gevolg van de verbetering van de waterkwaliteit.

Ten aanzien van de kosten is er een groot verschil tussen het nulalternatief (autonome ontwikkeling) enerzijds en de alternatieven 'Grutto en Otter' en 'Groeind Veen' anderzijds: de kosten voor inrichting en aanpassing van infrastructuur van 'Grutto en Otter' en 'Groeind Veen' zijn bij benadering twee keer zo hoog als de kosten die in het nulalternatief moeten worden gemaakt. Bij de ontwikkeling van de alternatieven was de verwachting dat het subalternatief 3 'ingroeimodel' substantieel lagere kosten zou geven dan de andere subalternatieven van 'Grutto en Otter'. Uit de kostenberekeningen blijkt dat de kostenverschillen klein zijn en de onzekerheden in deze planfase nog groot (circa 30 %), omdat een inrichtingsplan nog ontbreekt. De kosten zijn daarom niet onderscheidend voor de keuze van een subalternatief.

tabel 9.2. Overzicht nevendoelen c.q. neveneffecten

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeind Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
archeologie kans op verstoring archeologische waarden	0	0/-	0	0	0	+
bodem benodigde gerijpte bagger (m ³)		520.000	0	0	0	520.000
van buiten het gebied aan te voeren vaste grond		0	0	0	0	310.000
gesloten grondbalans	0	0	++	++	++	-
mogelijkheden voor saneren slootdempingen	0	0	++	++	++	0
problemen van op de kant zetten van bagger	0	0	-	-	-	-
infrastructuur gevolgen peilverhoging op wegen, bruggen, kabels en leidingen	0	0/-	--	--	-	--
kosten contante waarde van investeringen en onderhoud	13	22	62	62	59	64

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveld daling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
landbouw mogelijkheden voor medegebruik van natuurgebieden door particulieren en agrariërs	0	0	+	++	++	0/+
opbrengstderving door vernatting	0	0/-	-	-	0/-	-
schade door ganzen en onkruid	0	0/-	-	-	-	-
ziekte bij vee door vernatting (onderscheid in natuurgebied en landbouwgebied)	0	0/-	-	-	-	-
muggen en knutten overlast door muggen	0	0/-	--	-	-	--
wateroverlast voor lintbebouwing	0	0	--	-	0/-	--
vernieuwend ondernemerschap	0	0	+	+	+	0
bedrijventerrein Veerstaalblok effecten van natuurontwikkeling op realisatiemogelijkheden	0	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
milieu						
externe veiligheid	0	+	0	0	0	0
atmosferische depositie	0	0/+	+	+	+	+
geluid (invloed op provinciaal stiltegebied)	0	0/-	-	-	-	-
lichthinder	0	0/-	-	-	-	-
luchtkwaliteit (fijnstofafvang, CO ₂ uitstoot door veen)	0	0/+	++	+	+	++
natuur						
aantasting actuele natuurwaarden	0	0/+	+	+	+	0/+
invloed op Vogel- en habitatrictlijngebieden ten noorden en zuiden van de Krimpenerwaard	0	0	+	+	+	+
overlast door exoten	0	-/0	-/--	-/--	-/--	--
verstoring door recreanten en verkeer	0	-/0	-/0	-/0	-/0	-/0
uitvoeringsaspecten minimaliseer transport van grond over de openbare weg (grote vrachtwagens op kleine wegen)	0	0/-	+	+	+	-

beoordelingscriterium	nulmeting	nulalternatief	alternatief 'Grutto en Otter'			alternatief 'Groeierend Veen'
			subalternatief 1 'directe realisatie en peilfixatie'	subalternatief 2 'directe realisatie, peil volgt maaiveldddaling'	subalternatief 3 'ingroeimodel'	
water						
effecten op en bijdragen aan waterparels	0	0/+	++	++	++	0/+
grondwaterbeschermingsgebieden	0	0	0/+	0/+	0/+	0/+
verdroging TOP-gebieden	0	+	+/++	+/++	+/++	++
wegzijing	0	0	+	+	+	+

9.4. Voorkeursalternatief

Aangezien de neveneffecten niet doorslaggevend zijn voor de keuze van het voorkeursalternatief, is de belangrijkste afweging bij de keuze van een voorkeursalternatief die tussen de natuurdoelstellingen enerzijds en het tegengaan van bodemdaling anderzijds. Om de bodemdaling zoveel mogelijk te remmen zal gekozen moeten worden voor peilfixatie. Het gebied en de daarbij horende natuur worden dan nat (veel moerasnatuur). Om de natuurwaarden van het historische cultuurlandschap te behouden, zal een zekere drooglegging gehandhaafd moeten worden. Omdat de bodemdaling dan doorgaat, zijn regelmatige peilaanpassingen noodzakelijk. Overigens wordt de bodemdaling in het alternatief 'Grutto en Otter' belangrijk verminderd ten opzichte van de huidige situatie en het nulalternatief.

Op grond van de gekozen natuurdoelstellingen, wordt geadviseerd om alternatief 'Grutto en Otter', waarbij na het realiseren van de gewenste drooglegging, de maaiveldddaling wordt gevolgd, aan te wijzen als voorkeursalternatief. Hiermee wordt namelijk de hoogste natuurwaarde gerealiseerd vanuit het voor de Krimpenerwaard gekozen cultuurhistorische perspectief op natuur en er wordt ook een substantiële vermindering van de bodemdaling behaald. Daarnaast worden de beste omstandigheden gerealiseerd voor particulier natuurbeheer en medegebruik door agrariërs op gronden van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Binnen het voorkeursalternatief moet nog gekozen worden tussen de subalternatieven 2 en 3. In subalternatief 2 worden de natuurdoelstellingen eerder in de tijd gerealiseerd en wordt de bodemdaling in de eerste periode sterker geremd dan in subalternatief 3. De kosten zijn in subalternatief 2 echter ook hoger, met name vanwege maatregelen die genomen moeten worden voor ophogen van wegen en bruggen en waterstaatkundig isoleren van bebouwing. Deze kosten variëren per peilvak. De keuze tussen de subalternatieven kan dus ook per peilvak verschillend zijn. Voor het bestemmingsplan, waaraan dit MER gekoppeld is, is deze keuze niet noodzakelijk, omdat er geen verschil is in ruimtelijk eindbeeld, alleen in de wijze waarop dit gerealiseerd wordt en de tijdstermijn waarbinnen de doelstellingen voor natuur en het remmen van de bodemdaling bereikt worden. Daarom zal de keuze tussen deze subalternatieven, per peilvak, worden gemaakt in het kader van het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard. Het onderzoek naar de optimale combinatie van peilopzet en kostenreductie per natuurpeilvak is uitgevoerd in het kader van het watergebedsplan voor de Krimpenerwaard. Hierbij is ook in detail per natuurpeilvak gekeken naar de optimale drooglegging voor natuur. Op basis van deze twee onderzoeken zijn keuzes gemaakt voor de peilstrategie in de natuurpeilvakken, die hebben geleid tot een keuze voor directe peilopzet (subalternatief 2 in dit MER) of een combinatie tussen peilopzet en 'ingroeien' (en dus een combinatie tussen de subalternatieven 2 en 3 in dit MER).

9.5. Meest Milieuvriendelijk alternatief

Doordat het waterpeil in het voorkeursalternatief de bodemdaling blijft volgen, wordt de bodemdaling niet gestopt. Dit brengt ons automatisch op de keuze van subalternatief 1 van 'Grutto en Otter' als het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).

Binnen dit subalternatief wordt op lange termijn een hoge natuurwaarde gerealiseerd met een hoge natuurlijkheid, maar minder passend binnen het cultuurhistorisch landschap van de Krimpenerwaard. Dit wordt gecombineerd met een grotere afname van de bodemdaling, omdat het peil gefixeerd wordt. Bovendien scoort dit subalternatief 1 beter dan 'Groeiend Veen' ten aanzien van de nutriëntenhuishouding, omdat er afgeplagd wordt en maaisel wordt afgevoerd. Tevens komt hierdoor ten opzichte van het alternatief 'Groeiend Veen' veel meer grond vrij die benut kan worden voor de sanering van slootdempingen; een belangrijk milieuprobleem in de Krimpenerwaard.

Tenslotte wordt opgemerkt dat een keuze voor het nulalternatief (Autonome Ontwikkeling) niet past binnen het nationale (natuur)beleid. De keuze voor het nulalternatief betekent namelijk dat de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de Groene Ruggengraat niet gerealiseerd zullen worden en dat de bodemdaling niet zal worden geremd.

9.6. Leemten in kennis en evaluatieprogramma

In de hoofdstukken met de effectbeschrijvingen zijn op verschillende plaatsen leemten in kennis gesignaleerd. Sommige kennisvragen zijn belangrijk voor het uitwerken van de uitvoering van de natuurontwikkeling. Deze kennisvragen dienen door nader onderzoek te worden beantwoord, voordat met de uitvoering daadwerkelijk kan worden begonnen. Het gaat daarbij om het gebrek aan voldoende gegevens om:

- een goed beeld te krijgen van de aanwezige fosfaten in de bodem om te bepalen waar afgeplagd moet worden. Op basis hiervan kan de invulling van de natuurdoelen in detail bepaald worden;
- de effecten op de waterkwaliteit in te schatten, omdat een goede water- en stoffenbalans ontbreekt.

In de systeemanalyse is wel ingegaan op de ontwikkeling van graslanden na uitvoering van maatregelen, maar er is behoefte aan bovengenoemde gegevens om het inrichtingsontwerp verder te detailleren ten behoeve van het Integraal Inrichtingsplan. Die detaillering heeft in dit milieueffectrapport niet plaatsgevonden, omdat dit pas kan als de inrichting meer gedetailleerd bekend is (iteratief ontwerp- en onderzoeksproces). Bovendien blijken de bovenstaande onderzoeksvragen niet onderscheidend voor de alternatieven, omdat alle alternatieven te maken hebben met dezelfde onzekerheid. Aanbevolen wordt wel om gedetailleerde kaarten op het niveau van natuurdoeltypen te laten maken voor het Integraal Inrichtingsplan.

Bij het thema bodem en water is er een vraag ten aanzien van de effectiviteit van onderwaterdrainage en de gevolgen op de waterkwaliteit en de waterbehoefte. Om deze effectiviteit te onderzoeken is een lang lopend onderzoek nodig. Dit onderzoek is inmiddels opgestart in het kader van het onderzoeksprogramma 'Waarheen met het Veen?'. Bovendien zijn er plannen om in de Krimpenerwaard een pilot met onderwaterdrainage te starten.

Tevens is in dit MER geconstateerd dat de gebruikte gegevens van de maaiveldhoogten onnauwkeurigheden bevatten. In het kader van het watergebiedsplan voor de Krimpenerwaard wordt inmiddels gebruik gemaakt van het meer nauwkeurige AHN2 [Actueel Hoogtebestand Nederland, 2009]. Deze meer nauwkeurige gegevens zullen ook benut worden voor de inrichting van de natuurgebieden en de toekomstige peilbesluiten in de Krimpenerwaard.

In dit MER is alleen een inschatting gegeven van de mogelijke gevolgen van peilopzet in het plangebied op omliggende landbouwgronden. Wanneer er peilbesluiten worden genomen voor de nieuwe natuurgebieden, zal dit nader onderbouwd moeten worden.

Het goed functioneren van de Groene Ruggengraat is mede afhankelijk van de wijze waarop omgegaan wordt met knelpunten in de Groene Ruggengraat, zoals infrastructuur. In het kader van het Urgentieprogramma Randstad, waar de realisatie van de Groene Ruggengraat onderdeel van is, worden door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht al deze knelpunten onderzocht, haalbare maatregelen voorgesteld en gewerkt aan een programmering om deze maatregelen te realiseren.

De kostenberekeningen die in dit MER zijn uitgevoerd voor de verschillende alternatieven, zijn zeer globaal en slechts bedoeld geweest om de alternatieven goed met elkaar te kunnen vergelijken. In het watergebiedsplan worden de kosten voor de watermaatregelen voor het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. In het integraal inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard worden de kosten voor de watermaatregelen ook opgenomen en worden alle kosten voor de overige inrichtingsmaatregelen nader uitgewerkt.

evaluatieprogramma

Aanbevolen wordt om geen aparte meetstrategie op te zetten, maar om de evaluatie te combineren met de bestaande plancycli van het watergebiedsplan. Deze zijn hieronder beschreven.

Monitoring en evaluatie in het kader van het Watergebiedsplan:

Het hoogheemraadschap stelt een monitoringsplan op waarin onder andere onderstaande watergerelateerde aspecten opgenomen worden. Deze aspecten worden door het hoogheemraadschap gemeten en/of geregistreerd. Om de effecten van de maatregelen goed te kunnen meten, start de monitoring met een nulmeting. De nulmeting wordt uitgevoerd voor de uitvoering van de eerste maatregelen. De uitwerking van het monitoringsplan is als maatregel in de kostenraming opgenomen bij het watergebiedsplan. De ontwikkeling van de (terrestrische) natuurwaarden en realisatie van de natuurdoelen binnen de natuurgebieden worden door de beheerder van de natuurgebieden (Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) gemonitord.

grondwaterstanden

Verspreid over de Krimpenerwaard worden ongeveer twintig peilbuizen geplaatst waar de grondwaterstand wordt gemeten. Op een deel van de locaties worden ook diepe peilbuizen geplaatst tot in het eerste watervoerende pakket. De peilbuizen worden in raaien geplaatst langs de gradiënt van kwel naar wegzijging.

maaiveldddaling

Het beperken van de maaiveldddaling is één van de doelen van het Veenweidepact Krimpenerwaard en een belangrijk aandachtspunt in het watergebiedsplan. Daarom is het goed om de maaiveldddaling mee te nemen in het monitoringsplan. Verspreid over de Krimpenerwaard zal op 15 tot 20 locaties de maaiveldhoogte periodiek worden gemeten. De meetlocaties moeten verdeeld zijn over de natuurpeilgebieden en landbouwgebieden. Daarnaast moeten de locaties representatief zijn voor het zuiden, midden en noorden van de Krimpenerwaard ofwel gebieden met een geringe, middelmatige en sterke maaiveldddaling. Tevens moet gelet worden op een verdeling over de peilgebieden en bemalingsgebieden. In de natuurpeilgebieden is het doel om te bepalen in welke mate de maaiveldddaling wordt beperkt als gevolg van het (hogere) flexibele natuurpeil. De metingen in de landbouwgebieden zijn enerzijds bedoeld als referentie voor de metingen in de natuurgebieden en kunnen anderzijds gebruikt worden bij de toekomstige herziening van het peilbesluit.

waterkwaliteit (waterkwaliteitsmeetnet)

HHSK heeft een (recent) monitoringsplan voor de waterkwaliteit. In onderstaande tabel staan het aantal meetlocaties daarvoor binnen de Krimpenerwaard. Deze meetpunten worden 1x per 3 jaar gemeten, waardoor na 6-7 jaar (3 meetmomenten) een ontwikkeling kan worden aangegeven.

tabel 9.3. Aantal meetlocaties per functie

(toekomstige) functie	fysisch- chemisch	ecologisch*
stedelijk	16	2
landbouw	31	10
natuur	17	7

*) Voor de Kaderrichtlijn water (KRW) worden de waterlichamen ook nog ecologisch bemonsterd. De natuurgebieden die waterlichaam worden, zullen daardoor uitgebreider ecologisch worden bemonsterd.

De bestaande monitoring is bedoeld voor de generieke informatiebehoefte van het hoogheemraadschap. Het Veenweidepact Krimpenerwaard is een 'project' van dusdanige omvang (oppervlakte, type maatregelen en tijdsduur) dat het merendeel van de verwachte waterkwaliteitseffecten zichtbaar moet worden via de reeds geplande monitoring. De volgende aanvullingen zijn echter zinvol om te monitoren:

1. de ontwikkeling van de fysisch-chemische kwaliteit in de natuurgebieden;
2. nauwkeuriger informatie voor het sturen van de waterkwaliteit door middel van peilbeheer.

evaluatie

In een evaluatieplan wordt de voortgang van de uitvoering van het watergebiedsplan geëvalueerd. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de planning en eventuele knelpunten bij de uitvoering. Daarnaast worden de resultaten van de monitoring gebruikt om de effecten van de maatregelen inclusief de peilbesluiten te beschrijven. De evaluatie betreft zowel de agrarische en stedelijke gebieden als de natuurgebieden.