


A photograph of two waders, likely snipe or similar ground-dwelling birds, standing in a wetland area with tall grasses and water. The birds have long, straight bills and mottled brown and grey plumage. One bird is in the foreground, facing right, with its bill slightly open. The other bird is behind it, also facing right. The background is a soft-focus view of the wetland environment.

Vernatting: wat zijn de gevolgen, in het bijzonder voor het leefgebied van de weidevogel? Wat is “de stand van de wetenschap”

Jelle Loonstra - Altenburg & Wymenga





Veiligheid

Vernatting

**Voedsel
Bereikbaarheid**

Veiligheid

- Te hoog waterpeil kan zorgen voor verruiging graslanden door vermindering bewerkingen. → **Ongeschikter voor weidevogels**
- Hoog waterpeil kan gebied afsluiten voor grondpredatoren als Steenmarter. → **Geschikter voor weidevogels**
- Variatie in waterpeil i.c.m relif in bodem, geeft variatie in vegetatie. Meer schuilmogelijkheden voor kuikens → **Geschikter voor weidevogels**

Voedsel Bereikbaarheid




- Hoger waterpeil zorgt voor meer beschikbare wormen. → **Geschikter voor weidevogels**
- Hoger waterpeil kan leiden tot verzuring van bodem, gevolg verdwijnen van voedsel. → **Ongeschikter voor weidevogels**
- Hoger waterpeil, geeft lagere bodemweerstand. Meer gebieden geschikt om te fourageren. → **Geschikter voor weidevogels**

Voedsel Bereikbaarheid



- Seizoensverandering in waterpeil, zorgt voor verhoogd voedselaanbod kuikens. → **Geschikter voor weidevogels**
- Hoog waterpeil kan zorgen voor vertraging/verbreding voedselaanbod. → **Geschikter voor weidevogels**
- Te lang, te hoog waterpeil, zorgt voor vermindering in voedselaanbod. **Ongeschikter voor weidevogels**
- Variatie in waterpeil i.c.m. relief in bodem, geeft variatie in vegetatie. Verhoogde voedsel-bereikbaarheid → **Geschikter voor weidevogels**

De VRAAG: Hoe “nat” wordt het en waar!?



Hoogtekaart plangebied

Ga naar Instellingen